


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2435/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2435/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2435/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2435/A

A xxix Fuc

2435/A

Indice de la Bibliothèque de la


<i>apoplexia</i>	2. 1.	<i>apoplexia</i>	2. 1.
<i>apoplexia</i>	2. 10.	<i>apoplexia</i>	2. 10.
<i>apoplexia</i>	2. 11.	<i>apoplexia</i>	2. 11.
<i>apoplexia</i>	2. 12.	<i>apoplexia</i>	2. 12.
<i>apoplexia</i>	2. 13.	<i>apoplexia</i>	2. 13.
<i>apoplexia</i>	2. 14.	<i>apoplexia</i>	2. 14.
<i>apoplexia</i>	2. 15.	<i>apoplexia</i>	2. 15.
<i>apoplexia</i>	2. 16.	<i>apoplexia</i>	2. 16.
<i>apoplexia</i>	2. 17.	<i>apoplexia</i>	2. 17.
<i>apoplexia</i>	2. 18.	<i>apoplexia</i>	2. 18.
<i>apoplexia</i>	2. 19.	<i>apoplexia</i>	2. 19.
<i>apoplexia</i>	2. 20.	<i>apoplexia</i>	2. 20.
<i>apoplexia</i>	2. 21.	<i>apoplexia</i>	2. 21.
<i>apoplexia</i>	2. 22.	<i>apoplexia</i>	2. 22.
<i>apoplexia</i>	2. 23.	<i>apoplexia</i>	2. 23.
<i>apoplexia</i>	2. 24.	<i>apoplexia</i>	2. 24.
<i>apoplexia</i>	2. 25.	<i>apoplexia</i>	2. 25.
<i>apoplexia</i>	2. 26.	<i>apoplexia</i>	2. 26.
<i>apoplexia</i>	2. 27.	<i>apoplexia</i>	2. 27.
<i>apoplexia</i>	2. 28.	<i>apoplexia</i>	2. 28.
<i>apoplexia</i>	2. 29.	<i>apoplexia</i>	2. 29.
<i>apoplexia</i>	2. 30.	<i>apoplexia</i>	2. 30.
<i>apoplexia</i>	2. 31.	<i>apoplexia</i>	2. 31.
<i>apoplexia</i>	2. 32.	<i>apoplexia</i>	2. 32.
<i>apoplexia</i>	2. 33.	<i>apoplexia</i>	2. 33.
<i>apoplexia</i>	2. 34.	<i>apoplexia</i>	2. 34.
<i>apoplexia</i>	2. 35.	<i>apoplexia</i>	2. 35.
<i>apoplexia</i>	2. 36.	<i>apoplexia</i>	2. 36.
<i>apoplexia</i>	2. 37.	<i>apoplexia</i>	2. 37.
<i>apoplexia</i>	2. 38.	<i>apoplexia</i>	2. 38.
<i>apoplexia</i>	2. 39.	<i>apoplexia</i>	2. 39.
<i>apoplexia</i>	2. 40.	<i>apoplexia</i>	2. 40.
<i>apoplexia</i>	2. 41.	<i>apoplexia</i>	2. 41.
<i>apoplexia</i>	2. 42.	<i>apoplexia</i>	2. 42.
<i>apoplexia</i>	2. 43.	<i>apoplexia</i>	2. 43.
<i>apoplexia</i>	2. 44.	<i>apoplexia</i>	2. 44.
<i>apoplexia</i>	2. 45.	<i>apoplexia</i>	2. 45.
<i>apoplexia</i>	2. 46.	<i>apoplexia</i>	2. 46.
<i>apoplexia</i>	2. 47.	<i>apoplexia</i>	2. 47.
<i>apoplexia</i>	2. 48.	<i>apoplexia</i>	2. 48.
<i>apoplexia</i>	2. 49.	<i>apoplexia</i>	2. 49.
<i>apoplexia</i>	2. 50.	<i>apoplexia</i>	2. 50.
<i>apoplexia</i>	2. 51.	<i>apoplexia</i>	2. 51.
<i>apoplexia</i>	2. 52.	<i>apoplexia</i>	2. 52.
<i>apoplexia</i>	2. 53.	<i>apoplexia</i>	2. 53.
<i>apoplexia</i>	2. 54.	<i>apoplexia</i>	2. 54.
<i>apoplexia</i>	2. 55.	<i>apoplexia</i>	2. 55.
<i>apoplexia</i>	2. 56.	<i>apoplexia</i>	2. 56.
<i>apoplexia</i>	2. 57.	<i>apoplexia</i>	2. 57.
<i>apoplexia</i>	2. 58.	<i>apoplexia</i>	2. 58.
<i>apoplexia</i>	2. 59.	<i>apoplexia</i>	2. 59.
<i>apoplexia</i>	2. 60.	<i>apoplexia</i>	2. 60.
<i>apoplexia</i>	2. 61.	<i>apoplexia</i>	2. 61.
<i>apoplexia</i>	2. 62.	<i>apoplexia</i>	2. 62.
<i>apoplexia</i>	2. 63.	<i>apoplexia</i>	2. 63.
<i>apoplexia</i>	2. 64.	<i>apoplexia</i>	2. 64.
<i>apoplexia</i>	2. 65.	<i>apoplexia</i>	2. 65.
<i>apoplexia</i>	2. 66.	<i>apoplexia</i>	2. 66.
<i>apoplexia</i>	2. 67.	<i>apoplexia</i>	2. 67.
<i>apoplexia</i>	2. 68.	<i>apoplexia</i>	2. 68.
<i>apoplexia</i>	2. 69.	<i>apoplexia</i>	2. 69.
<i>apoplexia</i>	2. 70.	<i>apoplexia</i>	2. 70.
<i>apoplexia</i>	2. 71.	<i>apoplexia</i>	2. 71.
<i>apoplexia</i>	2. 72.	<i>apoplexia</i>	2. 72.
<i>apoplexia</i>	2. 73.	<i>apoplexia</i>	2. 73.
<i>apoplexia</i>	2. 74.	<i>apoplexia</i>	2. 74.
<i>apoplexia</i>	2. 75.	<i>apoplexia</i>	2. 75.
<i>apoplexia</i>	2. 76.	<i>apoplexia</i>	2. 76.
<i>apoplexia</i>	2. 77.	<i>apoplexia</i>	2. 77.
<i>apoplexia</i>	2. 78.	<i>apoplexia</i>	2. 78.
<i>apoplexia</i>	2. 79.	<i>apoplexia</i>	2. 79.
<i>apoplexia</i>	2. 80.	<i>apoplexia</i>	2. 80.
<i>apoplexia</i>	2. 81.	<i>apoplexia</i>	2. 81.
<i>apoplexia</i>	2. 82.	<i>apoplexia</i>	2. 82.
<i>apoplexia</i>	2. 83.	<i>apoplexia</i>	2. 83.
<i>apoplexia</i>	2. 84.	<i>apoplexia</i>	2. 84.
<i>apoplexia</i>	2. 85.	<i>apoplexia</i>	2. 85.
<i>apoplexia</i>	2. 86.	<i>apoplexia</i>	2. 86.
<i>apoplexia</i>	2. 87.	<i>apoplexia</i>	2. 87.
<i>apoplexia</i>	2. 88.	<i>apoplexia</i>	2. 88.
<i>apoplexia</i>	2. 89.	<i>apoplexia</i>	2. 89.
<i>apoplexia</i>	2. 90.	<i>apoplexia</i>	2. 90.
<i>apoplexia</i>	2. 91.	<i>apoplexia</i>	2. 91.
<i>apoplexia</i>	2. 92.	<i>apoplexia</i>	2. 92.
<i>apoplexia</i>	2. 93.	<i>apoplexia</i>	2. 93.
<i>apoplexia</i>	2. 94.	<i>apoplexia</i>	2. 94.
<i>apoplexia</i>	2. 95.	<i>apoplexia</i>	2. 95.
<i>apoplexia</i>	2. 96.	<i>apoplexia</i>	2. 96.
<i>apoplexia</i>	2. 97.	<i>apoplexia</i>	2. 97.
<i>apoplexia</i>	2. 98.	<i>apoplexia</i>	2. 98.
<i>apoplexia</i>	2. 99.	<i>apoplexia</i>	2. 99.
<i>apoplexia</i>	2. 100.	<i>apoplexia</i>	2. 100.

A XXIX Fuc

2435/A

1. 10	1. 10	Reinhold	1. 10
1. 11	1. 11	Reinhold	1. 11
1. 12	1. 12	Reinhold	1. 12
1. 13	1. 13	Reinhold	1. 13
1. 14	1. 14	Reinhold	1. 14
1. 15	1. 15	Reinhold	1. 15
1. 16	1. 16	Reinhold	1. 16
1. 17	1. 17	Reinhold	1. 17
1. 18	1. 18	Reinhold	1. 18
1. 19	1. 19	Reinhold	1. 19
1. 20	1. 20	Reinhold	1. 20
1. 21	1. 21	Reinhold	1. 21
1. 22	1. 22	Reinhold	1. 22
1. 23	1. 23	Reinhold	1. 23
1. 24	1. 24	Reinhold	1. 24
1. 25	1. 25	Reinhold	1. 25
1. 26	1. 26	Reinhold	1. 26
1. 27	1. 27	Reinhold	1. 27
1. 28	1. 28	Reinhold	1. 28
1. 29	1. 29	Reinhold	1. 29
1. 30	1. 30	Reinhold	1. 30
1. 31	1. 31	Reinhold	1. 31
1. 32	1. 32	Reinhold	1. 32
1. 33	1. 33	Reinhold	1. 33
1. 34	1. 34	Reinhold	1. 34
1. 35	1. 35	Reinhold	1. 35
1. 36	1. 36	Reinhold	1. 36
1. 37	1. 37	Reinhold	1. 37
1. 38	1. 38	Reinhold	1. 38
1. 39	1. 39	Reinhold	1. 39
1. 40	1. 40	Reinhold	1. 40
1. 41	1. 41	Reinhold	1. 41
1. 42	1. 42	Reinhold	1. 42
1. 43	1. 43	Reinhold	1. 43
1. 44	1. 44	Reinhold	1. 44
1. 45	1. 45	Reinhold	1. 45
1. 46	1. 46	Reinhold	1. 46
1. 47	1. 47	Reinhold	1. 47
1. 48	1. 48	Reinhold	1. 48
1. 49	1. 49	Reinhold	1. 49
1. 50	1. 50	Reinhold	1. 50

[illegible]



55350
DE MEDENDIS

SINGVLARVM HV,

MANI CORPORIS

partium à summo capite ad imos usque

pedes passionibus ac febribus Libri

Quatuor, nunquam antea

in lucem editi.

~~LEONHARTO EVCHISTO,~~

Scholæ medicæ Tubingensis pro-

fessore publico, autore. *cum hinc in sup.*

HIPPOCRATIS COI DE

medicamentis purgantibus Libellus iam re-

cens in lucem editus.

HAC AQUA, NON

EX
QVI BIBERIT



SIT ET IN AETERNVM

Ph. S. p. i.
Cavens

VENETIIS Apud Andream Arriuabenum ad
signum Putei. M. D. X LI.

IOACHIMVS CAMERARIVS
ad Lectorem.

Cuncta licet veterum perlustres, cuncta nouorū,
Quæ celebrant artem scripta Machaoniam,
Forte sit ut liber magis admirabilis alter,
Huic nullum inuenies utilitate parem.
~~Futurus~~ in quo te vera ratione medendi,
Nec fallente tuas instruit arte manus.
Nunc poteris ex his (in quo sunt omnia) plane
Non modo quid sapias discere, sed qd agas.

ILLVSTRISSIMO PRIN-
CIP IAC DOMINO ALBERTO
Marchioni Brandenburgēsi, Stetinæ, Po-
meranię, Cassuborū , & Sclauorum
duci, Burggraui Norimbergē
si, ac Rugię Principi, Domi-
no suo Clementiss. ~~Et~~
~~thantus~~ Fuchsius.
S D P.



Nno abhincvno, Illustrissime
Princeps, id ipsum à me stu-
diosis qbusdā efflagitantibus
medendi quādā rationē per-
breuem admodum cōscripsi,
nō ī hoc sanē ut Galeni quos
ea de re posteritati religt opti-
mos ac absolutissimos, aliorūq̃ Gręcorum com-
mētarios medicinę initiatis de manibus excute-
rē, si quidem hoc instituto quid absurdius ine-
ptiusq̃ aut dici aut excogitari posset? sed ut iis q̃
prolixitate ac difficultate operū Galeni reliquo-
rumq̃ Gręcorum deterrentur, & hoc nomine ad
Arabes, atq̃ ineptissimā barbarorū medicorum
turbā deficiunt, consulerē, ac quasi uiam ad Gale-
ni, qui cæteros omnes superauit scripta facilius
assequenda struerē. Nihil enim æque optanius,
atq̃ ut iis nostris cōmentariolis adiuti melioris
medicinę studiosi, gradū faciant ad ea cognoscē-
da, quę plenius de curandi ratione Galenus tra-
didit.

*Scribendi
methodus
hanc occa-
sio*



ii didit.

Veterum
medendi
rationem
hoc tempo
re exerce
ri prorsus
nō posse.

didit. Perfectū nāq; habemus quā pauci ad
modum sint hodie medicinā exercentes, qui ex
Galenī optimi sanē auctoris, p̄scripto curādi indi
cationes scrutentur, quū unusquisq; fere sibi pe
culiarē quem in medendo sequatur auctore, eūq;
non raro pessimū, proponat, huncq; si mordicus
teneat, ut ne latū quidē unguem ab illius decretis
discedat. Quā quidē ratione fit, ut quāplurima
quotidie errata inter medendū admittāt, qui syn
cero iudicio destituti temere quosuis sectantur,
q̄ facile declinarēt, si ex Galenī magis quā eius
furinæ indoctorum hominū sententia & consilio
ægrotis mederi uellent. Proinde ut tandē ab erro
re suo, ac temerario instituto deducerentur, atq;
adeo ad frugē bonā redirent, neq; haberent quod
subinde desid. æ suæ & ignorantix prætenderēt,
hanc medendi rationē ex Galenī, & hunc magna
ex parte sequentiū Aetii & Pauli monumentis cō
flatam, edere uoluimus. Speramus. n. illam his q̄
ad ueterum medendi rationem propius accessu
ri sunt, adiūmēto, & ut Græci dicūt πρὸ οὐλοῦ, futu
rā esse. Nam ut hanc penitus attingant, utcūq; ēt
an itātur, hoc p̄sertim tempore, fieri minime pōt.
Quin. n. uetere curandi ratio duabus potissimū
rebus constet, nempe p̄ceptis, quæ unde curan
di indicationes petendæ sint mōstrant, ac morbos
pellentibus medicamentis, eam quidem quæ in
dicationes docet, hac etiā tempestate perfectissi
mē consequi licebit, alter uero, quæ medicamē
ta inquirat nequaquam. Multa enim cum simpli
cia

E P I S T O L A

cia tum cōposita quibus illi in profligandis mor-
 bis usi, esse cōstat, quæ omnium quotquot hodie
 uiuunt cognitionem subterfugiunt, atq; adeo in
 usum reuocari haud possunt, ita ut necessitate q̄-
 dā cōpellamur, loco illoꝝ nostratibus & usitatis,
 iis maxime quorum & forme & facultates nobis
 cognitæ sunt, uti. Quod sanè mecum ipse repu-
 tans, ueterū medendi rationi semper eam etiam
 q̄ hodie usitata est, quoad eius fieri cōmodè po-
 tuit, in iis meis de curādi ratione Commentariis
 cōiunxi. Qui n. has temere separant, haud dubie
 omnia perturbant, ac cœlum terrę niscēt. Quod
 itaq; ad curādi indicatiōes attinet, ueteres & Græ-
 cos planè imitatus sum quod illi eas præ ceteris
 omnibus rectissime tradiderint. Quare nemo
 miretur, quod ab Arabum ac recentiorū practi-
 corum, ut uocāt, placitis multis in locis discesse-
 rimus. iudicio enim id ipsum, nō errore factum.
 Nam cum hoc planè nostrum sit consilium, ut
 rerum medicarum studiosos à barbaris & ineptis
 autoribus ad optimos, atq; adeo eos qui pristi-
 nam medendi rationem syncerissime docent, re-
 uocemus, studio ac data opera eas quas illi præ-
 scribunt curandi indicationes, utpote erroneas,
 & à ueritate prorsus abhorrentes contempnimus.
 Pleraque etiam ex Galeni & reliquorum Græ-
 corum sententia, quæ nemo fere nostrorum me-
 dicorum usurpare audeat, etsi cum magna laude
 & egrotantium salute illis ueteres usi sint, inse-
 rere studuimus, ut hac ratione nostros etiam, quo-



iii iisdem

I. Aph. 6.

Medico-
rum nostri
seculi blā-
ditia no-
tantur.

iisdē confidentius uterentur, inuitarem. Nā cum tantopere ab iis quibus ueteres feliciter usi sunt abhorrent, sit ut interea paucos, imo propē nullos, magnos morbos curent. Parum certe memores illius Hippocratici, summis morbis summa exquisita remedia optima esse. Neque interim etiā animaduertunt, quā male passim ob illas suas blāditias ac assentationes audiāt, quod scilicet mācipiorum ritu, ut Galenus inquit, contra planē quā ueteres illi medici ab Aesculapio oriundi, qui tanquā duces militibus, & reges subditis, imperare agris uoluerunt, agrotis pateāt, & obsequantur. Verum metum hunc haud dubie incutit, neque enim cum illis exposulātibus actorū suorum rationē reddere ualent, tā sunt prorsus omniū eorum quę tradunt Galenus & ueteres medici Græci, ignari, adeoque malunt cū multis temere errare, quā ueterum probe excogitatis remediis uti. Cæterum quod ad alterā partē, quę medicamēta docet spectare uidetur, ea tñ in iis de Medendi ratione libris produximus, quorum hodie est in officinis frequens usus, & quibus nos sæpe, idēq non sine magno egrorū cōmodo, usi sumus. Quapropter usitata & cognita officinis uocabula, parū tamen latina interdum admiscere coacti sumus, ne si latinis perpetuō uteremur, ab iis non intelligeremur. Vnice tamē cauimus exotica, p̄ciosa, & paratu difficilia medicamēta, quod plurima illorū, eo quod neque illis qui uendunt, neque etiā iis qui emunt,

E P I S T O L A

emunt, satis cognita sint adulterina esse verendū
 sit. Mercatores ēt in iis extrudēdis (tanta est illoꝝ
 insatiabilis auaritia) maxime student, vt primū
 deteriora vendāt. quod dū faciunt, interea ēt quę
 bona sunt, diutius retēta carie ac vermibus exesa,
 deteriora euadūt. Pharmacopolę aut penē oēs, nō
 minus q̃ illi, quęstui inhiantes, ac pecuniam par
 ce & restrictę erogantes, non nisi pessima emunt.
 Et quū ēt in hoc genere reperiantur viri aliquot
 boni, tū q̃a magna ex parte indocti sunt, & melio
 ra ignorant, vřitata dūtaxat, quę vt plurimū adul
 terina sunt, ad conficienda medicamēta sua cōpa
 rant. Quapropter stolidorū & indoctorū medicorū
 consiliū pbare nō possum. qui in exercēde medē
 di rōne nullis ferē medicamētis, nisi ea quę illoꝝ
 compositionem cōstituunt à quatuor orbis par
 tibus petita sint, vtūtur. Neq̃ enim intelligunt, q̃
 periculosum sit ea usurpare medicamēta, quę nec
 ipsi, nec qui eadem vendunt ac preparant Sepla
 sarii satis perspecta habeāt. Quod vero illis vtat
 tur, non fit alia ratiōe, nisi quod eos autores à qui
 bus in medēdo toti pendent, vřos esse vident, nō
 magnopere laborātes qualia sint, aut vnde allata.
 Qui igiř sapiūt, nostratibus, & paratu facilibus,
 cognitisq̃ potius q̃ peregrinis, paratu difficili
 bus, & incognitis vtentur, quod eorūde quem in
 abigēdis morbis obtinēt effectus, vt plerunq̃ est
 exoticorū, dubius esse nō possit. Quod non eo di
 co, quasi peregrina & aliunde ad nos delata medi
 camenta in vniuersum omnia ex officinis exter

Medico
 rum quo
 rumdam
 huius æta
 tis stolidi
 tas.

✠ iiii nuan.

mināda putē, in quo sane errore malefanos quo
 dam nostri seculi medicellos uersari cōpertū ha-
 beo, cum multa sint eiusmodi, quibus etiā si no-
 stratia singula perspecta haberemus, carere sine
 magno ægrorum incōmodo non liceret. qualia
 sunt aloe, casia fistularis, myrobalani, scāmōnia,
 & id genus non pauca, Sed eorū dūtaxat damna-
 mus studiū, qui contemptis nostratibus pro-
 pe oībus, ea tātū usurpāt, quæ plane exotica sunt,
 & neq; ipsis, neq; aliis cognita. Memini. n. me ali-
 quot nostri tēporis medicorum, qui in magno
 habebantur precio, uidisse cōpositiones ex eius-
 modi medicamentis cōcinnatas, quorum nuda
 solūmodo extarent nomina, atq; adeo quæ nec ip-
 si, nec Seplassiar ii nouissent, aut unquā uidissent.
 Nec cur id facerent potui satis diuinare, nisi for-
 te ambitione ducti, ceteris quod peregrina & ne-
 mini nota proferret doctiores uideri uoluerint,
 aut hac rōne cauere, ne suis alii quoq; in meden-
 dis egris uterentur. Quid multa? exoticis ac pre-
 ciosis parce admodum utendū esse, neq; tñ om-
 nibus, sed iis duntaxat quæ nobis iā multo usu
 & experientia comprobata sunt iudicamus. Atq;
 cōstat plerosq; esse, qui utcunq; etiam sæpiusq;
 moniti, in uiam redire nolint, quos certe nō ma-
 gnopere curamus. neq; enim illis hanc methodū
 exarauimus, sed iis potius qui cādido animo ad
 ueterem medendi rationē spirant. Dignum siqui-
 dem est, ut qui ueritatis lucem intueri dedignā-
 tur, in perpetua errorum caligine detineantur.

Tibi

EPISTOLA

Tibi uero colēdissime Princeps, duas potissimū ob causas hos meos de medendī rōne libros dedicare constitui. Primū, qđ illis ex nominis tui auspicio & claritate nōnihil autoritatis & gratiæ accedere posse sperē. Quis enim est qui nesciat, qđ celebris, quamq̃ nobilis sit Marchionū Brandenburgensium apud oēs nationes familia: neq̃ id sane alio nomine, qđ ob multas, easq̃ egregias uirtutes, & res domi militiæq̃ prudenter & feliciter gestas. Nā ut reliqs prēteritis a proauo tuo a quo tibi nomen inditū est, exordiar, quis unq̃ Principū illo prudentior, & ad res bene gerēdas aptior ac fœlicior? quis deniq̃ facundior? q̃s cōstantior? quis bellicosior? Hincq̃ adeo factū est, ut a Pio secundo Pōtifice Romano, uiro eximio ac doctissimo, mirificē laudatus sit, atq̃ Teutonicus Achilles dici meruerit. Sed missas facio alias multas & insignes illius optimi Principis uirtutes, quas si singulas cōmemorare uellem, uereor ut epistola capere possit. Ad auum itaq̃ meum olim clementissimū Principē uenio, quem ēt ob singularem belli peritiā, alias que multas cum corporis tum animi dotes Maximiliano, prudentissimo ac optimo Cæsari, constat fuisse charissimū, adeo ut illius ductu bella q̃ plurima non solum in Germania, uerū etiam Italia fœliciter gesserit. Nec a suis maioribus degenerauit parens tuus charissimus Cassimirus, Princeps pp singularem prudentiam, animi moderationē, rerum deniq̃ bellicarū mirificam peritiā, diutius nūque

Dedicatio
nis causa.

Marchio-
num.
Branden-
burg. i. obi-
us fami-
lia.

Albertus
Marchio
Elector.

Federia-
chus
Marchio.

Marchio
Cassimi-
rus.

Albertus
Marchio,
dux Borus
fia.

Humani
tas.

nūq̃ usum lōgiori uita dignus. Hoc enim super
stite, uix unquā Turca inhumanissimus Christia
ni nominis hostis Vngariā sic totā inualisset atq̃
occupasset. Neque. n. dubitasset se (tāta erat illius
magnanimitas, & rebus etiā penē desperatis con
stātia) uiribus eius quantum uis magnis ac potē
tissimis, Cæsarum adiutus auxiliis, opponere. Ve
rum ē medio sustulit Deus Opt. Max. tantum
Heroa, quo Turcæ ministerio nostra delicta gra
uius puniret. Quid hic de patruo C. T. duce Bo
russiae referā? uerum de hoc præstat nihil quā
pauca dicere. Tantę enim illius Principis sunt
uirtutes, ut absolutum aliquod optimi principis
exēplar, quod tu in primis, aliq̃ omnes principes
sequi deberent, dici queat. Quum itaque is sit
ut strę familię splendor, qui fieret ut patrocinio
tuo freti ii nostri labores, non aliquā apud studio
sos inirent gratiā? Dein has meas uigilias C. T.
nuncupare uolui, ut aliqua saltem ratione animū
studium, & uoluntatē erga te meam declararem.
Nam etsi, ut olim, tibi assistere quotidie, exclusus
locorum interuallis, haud possim, tamen non mi
nor est quā cū pręsens essem amor erga te me
us. Neque enim non possum te summē diligere,
si uirtutes quas in te sitas esse perspectum habeo,
mecum expendo. Siquidem ut aq̃eris ab om
nibus, facit imprimis inmensa illa humanitas.
quæ in te puero adhuc elucebat, & quam quis
que ipso etiam statim conspectu, nedum con
gressu animaduertebat. Nulla enim res est quæ si
bi non

EPISTOLA

bi non solum subditorum, imò aliorum etiam
 omnium animos ac beneuolentiã sic conciliat,
 ac ipsa humanitas lenitas, & mansuetudo. Qua
 propter in principe unice detestãda est inhumani-
 tas, ut q̃ efficiat, ut à Cyclope illo Homerico non
 multum absit, & cõfestim inuidiã comitem ha-
 beat. Humanitatis nanque opinione amissa, pro
 monstro planè ac portento habetur, ut cunq̃, au-
 ro, gemmis, & serico ornatus incedat. Sed præstat
 nũc alias tuas uirtutes prosequi, quãdo omnibus
 constet, Marchiones Brandenburgenses comita-
 te reliquos omnes Germaniæ principes supera-
 re. Inter plurimas uerò alias primum occurrit no-
 bis immensa tua & in Deum & in hoĩes pietas,
 quã olim dum uiueret Christophorus Pistorius,
 uir ob præcipuã eruditionẽ perpetua memoria
 dignus, aĩo tuo magno studio instillauit. Quæ
 una sanè certissima testis est, animum tuum à cru-
 delitate & tyrannide alienissimum esse, ad igno-
 scẽdum uero promptissimũ. Huic accedit, quod
 æquitatis sis amantissimus, neq̃, ut multi hodie so-
 lent principes, minus in delicta potentum ac di-
 uitum quàm infimorum ac pauperum esse ani-
 maduertendum putes. Neq̃ omittendum hoc,
 quod animum tuum non contentus generis ma-
 xima nobilitate, humanioribus etiam literis exco-
 lere uolueris, in quibus cõusq̃ prouectus es, ut
 subinde ad historias, quẽ te indies magis atq̃ ma-
 gis oblectabunt, atq̃ simul instruent, per ocium
 respicere queas. Neq̃ dubito quin in studiis ma-
 iores

Christo-
 phorus
 Pistorius.

iores progressus facere uoluisses, nisi breui admo-
 dum tpe binos tibi pceptores fata ipsa surripu-
 sent. Vicunq; uero impeditus studiorū thorum
 cursum prout instituēdas absolūere haud potue-
 ris nihilominus tñ doctos maximo fauore pse-
 queris, eosq; unice colis, ductus haud dubie
 quorū dā sapiētissimorū Principū exēplo, quos ui-
 des doctrine amore & conseruatione illustrius no-
 men q̄ finium ditionisq; imperii p̄pagatione si-
 bi peperisse. Verū ut tādē laudādi finē faciā, mit-
 to multas alias tuas excellentes uirtutes, ne illas
 adulandi magis, q̄ reliquos a d easdē excitādi stu-
 dio cōmemorasse uidear, atq; hoc unū nōneo, ut
 p̄gas subinde cōstanter amare doctos, tue rēq; ad-
 uersus sycophātas studia ipsa, nec unquā ab hoc
 laudatissimo instituto pestes illas aulicas, inuenso
 in oēs doctos odio flagrātes, te auocare sinas, nec
 cōmittas unquā, ut Sirenibus istis, utcūq; suauiter
 canētib; aures accōmodes, sed doctorū & pru-
 dentiū potius usus cōsilio, imperii tui habenas
 gubernas. sic enim nō solū stabilietur tuū iperū.
 uerumēt apud posteros omni p̄sus inuidia care-
 bis, ac celebri fama uere illustris euades. Accipe
 igitur, Illustris Princeps, solita clementia nostras
 has uigilias, atq; ex iis salubria pcepta ad p̄fligā-
 dos morbos excerpe, quo salubriter uiuere q̄as.
 Dignissimus etenim es nō mō p̄sp̄era, sed cōstā-
 ti & p̄petua bona ualetudine, ut amplissimæ
 tuæ ditioni diutissime præesse, ac Christianæ rei
 publicæ prodesse queas. Vale. Tubingæ. XII.
 Calend. Iunii. Anno M^o D. XXXIX.

RERVM HOC IN LIBRO ME

morabilium per Capita & Pa

ginas Index.

LIBRI PRIMII.

D E Alopecia & Ophiasis.	Cap. I. Pag. 1.
De dolore capitis.	2.4
De dolore capitis ex calore.	3.5
De dolore capitis ex frigore.	4.8.
De dolore capitis ex siccitate.	5.9
De dolore capitis ex plenitudine.	6.10
De dolore capitis ex biliosis humoribus.	7.13
De dolore capitis ex pituitosis humoribus.	8.15
De cephalæa.	9.17.
De hemicrania.	10.19
De uertigine.	11.21
De phrenitide.	12.24
De lethargo.	13.28
De caro.	14.31
De cathoca & catalepsi.	15. Ead.
De apoplexia.	16.32
De resolutione.	17.34.
De morbo conitiali.	18.38.
De incubo.	19.42
De melancholia.	20.43
De conuulsione.	21.50
De tremore.	22.53
De destillatione.	23.54
De lippitudine, siue ophthalmia.	24.56
De suffusione.	25.59
De aurium dolore.	26.61

I N D E X

De parotidibus.	27.64
De sanguinis ex naribus eruptione.	28.65
De dolore dentium.	29.68
De aphtis.	30.70
De foetore oris.	31.72

LIBRI SECVNDI

D E columelle inflammatione.	1.75
De angina.	2.76
De tussi.	3.79
De asthma.	4.82
De pleuritide.	5.85
De peripneumonia.	6.88
De euento sputo.	7.89
De empyemate.	8.94
De tabe.	9.96
Decordis palpitatione.	10.99
De syncope.	11.101
De lactis defectu.	12.105
De lactis redundantia.	13.106
De lacte in grumos conuerso.	14.107
De inflammatione mammarum.	15.109

LIBRI TERTII.

D E imbecillitate uentriculi.	1.111
De inflammatione uentriculi.	2.114
De appetitu canino.	3.115
De bulimo.	4.118
De inflammatione uentriculi.	5.120
De singultu.	6.122
De cholera.	7.124
De diarrhoea.	8.127

I N D E X

De lienteria.	9.131
De dysenteria.	10.133
De tenesmo.	11.137
De colori doloribus.	12.139
De ileo.	13.145
De lumbricis.	14.147
De hæmorrhoidibus sedis.	15.152
De procidentia ani.	16.154
De rimis ani.	17.158
De imbecillitate iocinoris.	18.158
De obstructione iocinoris.	19.151
De inflammatione iocinoris.	20.163
De ictero.	21.166
De aqua inter cutem.	22.171
De anasarca.	23.173
De ascite.	24.176
De tympanite.	25.177
De intemperie lienis.	26.178
De lienis inflammatione.	27.181
De lienis obstructione.	28.184
De renib. cruentam urinā excernentibus.	29.185
De inflammatione renum.	30.187
De calculo renum.	31.190
De renum ulceribus.	32.195
De diabete.	33.197
De uesicæ calculo.	34.200
	(dem. 35.202
De sanguinis ex uesica eruptione, & grumis eius	
De inflammatione uesicæ.	36.203
De stillicidio urinæ.	37.205
De difficultate urinæ.	38.207

INDEX

De suppressione urine.	39.207
De ulceribus uesicę.	40.208
De his qui re uenera uti non possunt.	41.210
De seminis profluvio.	42.214
De exulceratione pudendi.	43.216
De ramice.	44. Ead.
De suppressis mensibus.	45.219
De redundantibus mensibus.	46.223
De uteri suffocatione.	47.226
De uteri procidentia.	48.228
De mola.	49.231
De inflammatione uteri.	50.232
De sterilitate remouenda.	51.234
De difficili partu.	52.238
De ischiadicis.	53.242
De podagra & arthritide.	54.246

LIBRI QVARTI.

DE MEDENDIS FEBRIBVS

D E diaria.	1.252
De diaria exobstructione meatuum.	2.258
De synocho cum putredine.	3.260
De continuis febribus.	4.263
De ardente febre.	5.266
De exquisita tertiana intermittente.	6.269
De tertiana notha.	7.273
De quartana.	8.275
De quotidiana.	9.278
De hectica febre.	10.280

FINIS.

LEONHARTI FVCHSII

DE MEDENDIS SINGVLAR

rum corporis partium à sum-
mo capite ad imos usque
pedes passionibus.

LIBER

PRIMVS.

De Alopecia & Ophiasis.

Cap. I.



ΑΩΓΕΚΙΑ passio est, quæ La-
tinis Alopecia dicitur. Fit ubi
in capite areas deciduus capil-
lus efficit. Sic appellatam hanc
passionem ferunt, quod vulpi-
bus frequenter accidat. Siquidē
αλωπηξ Grecis uulpes est. Οφια-
σις nomē latinū non obtinuit:
passio est, q̄ capitis partē lēsam

Alope-
cia quid.

Ophiasis
quid.

serpentis modo, quæ Grecis οφίς est, glabrā ostendit.
Arabes & Barbari medici primum passionis genus
uoce parū deprauata Alopiciam, alteraz uero Tyriā
uocant qua uoce oēs serpentes, potissimum autem
uiperas, intelligunt. Vtrūq; genus propter uitiatos
humores contingit. Quemadmodum enim plantę
aliquę ob humoris alieni ab ipsarum natura attra-
ctionem: sic etiam capilli propter humorū ex qui-
bus nutriri cōsueuerunt prauitatez, corrumpuntur.
Quales autem sint uitiati humores, ex colere cutis
capitis dignosces. Aliquibus enim mutata albidior
apparet, aliquib. nigrior, aut pallidior. Candida pi-
tuitam, atra melancholiam, pallida bilem flauam si-
gnificat. Ad uitiosi humoris speciem certius agno-
scendam, non leue etiam adiuumentum p̄cedens ui-
ctus ratio conferet: p̄sertim intelligenti, qui nam
A ciborum

Causę.

Digno-
scendo-
rum suc-
corum
nota.

Leonharti Fuchsi

Chratio.

Purgatio.

*Catapotia
ex aloë.*

*Apophleg-
mausmi*

ciborum pituitę, qui nam atrę bilis, 7 flauę succum colligant. In primis itaq; totius corporis purgationem adhibere oportet, aut pharmaco pituitam ducente exhibito, aut quod bilem flauam aut nigram trahit, coniectura redundantis humoris, ut diximus, ex colore cutis facta. Nam si is albidior quàm pro naturę habitu sit pituitosi humoris purgationez exhibebis: si pallidior, eiusmodi bilis purgationem, non secus atq; si nigrior conspicitur, quę nigrā detrahent bilem offeres. Pituitosos humores Hiera ex colocynthide purgare cōsuevit, quam describit Paulus lib. 7. Cap. 3. sub nomine Hierę Archigenis. Hiera etiā simplex, quę lib. 7. Ther. meth. 7 lib. 2. de Cōpo. medicamen. secundum locos cap. 1. à Galeno describitur, mirifice confert: aliquādo elleboro nigro adiecto, ubi atrę bilis humorem expurgare uolueris aliquando scammonia, si flaua bilis purganda erit. Quin 7 ex aloë catapotia commodē sic patientes purgare solent. Habent autem hęc, colocynthidis partem unam, aloës 7 scammonię utriusque partes duas, cum succi absinthii parte una: conficiantur ex drachma una catapotia undecim, 7 deuoranda prębeantur. Vfus hodiernis diebus. Hierę picrę triplex est. primus, sub specie pulueris in uino aut iure gallinaceo aut alio conuenienti liquore assumpti. datur ex pharmaco hoc drachma una. Alter sub forma catapotiorum, qui tritissimus esse solet. Tertius sub eclegmatis specie, quod etiam in officinis pręparatum habetur. Ceterum post totius corporis purgationez apophlegmatismis, masticatoria hodie uocant, pituitam è capite detrahere pręstat. Hęc autē ex sinapi, hyssopo, staphysagria, pipere, origano, pyrethri radice, cubebis, 7 similibus conficiuntur, in hunc uel similem modum. ꝛ. Piperis longi, nucis myristicę, muscatam appellant, añ. 3. s. se. staphysagrię, pyrethri. añ. 3. ii. sinapi, origani, añ.

añ. 3. i. trita in puluerem cum melle, aut cum cera quantum satis est, in formam lupinorum redigantur, quarum una ad horę ferè unius medietatem commanducetur. Possunt etiam prædicta contusa in sacculum ex subtili panno confectus reponi, et deinceps commanducari. Post hæc ad localia medicamenta accedendum erit, quę discutiendi, attenuandiq; vires habeant, inter quę calidissimum est euphorbium. Eo autem minus calidum thapsia, post thapsiam uero sinapi et nasturtium. Post hæc succedunt sulphur, nitrum, uterq; elleborus, erucę semen, oleumq; laurinum. Quin et pix. liquida, murium stercus, anserinus adeps, sed magis ursę, amigdalę amarę totę ursę, herinacei terrestres cutis, et thus aceto acerrimo subactum. Ante iam commemoratorum medicamentorũ usum capillos nouacula tollere oportet, deinde patientem cutem per linteolum neque asperum, neq; molle nimis confricare, ac uidere ad quantum ruborem per huiusmodi frictionem peruenit. Si enim per modicam frictionem statim rube fiat, morbum sanatu facilem iudicabis. Si uero uix post longam atq; multam frictionem rubescat, difficilem tum passionem, tum curationem ominaberis. Porro ad hunc qui sequitur modum medicamenta compones. ℞. Seminis erucę, nasturtii, nitri. añ. 3. i. s. thuris in aceto acri et forti macerati. 3. i. sulphuris uiui. 3. i. adipis anserini, ursini. añ. 3. i. olei laurini. 3. iii. misce, fiat linimentum, quod illinatur assidue. Aliud paulo ualidius. ℞. Euphorbię, thapsię, añ. 3. i. ellebori utriusq; añ. 3. s. se. nasturtii, erucę, amygdalarum amararũ cum corticibus usta rum añ. 3. i. sinapi. 3. s. olei nardini et laurini añ. 3. ij. cerę quantum satis est, formetur unguentum, quo caput assidue illinatur. Sunt autem hæc præscripta sub calido aere flatu carente, et in sole adhibenda. Si uero hyems fuerit, necesse erit ut in hypocausto,

A ii aut

Localia.

Capilli radendi.

Linimentum.
Unguentum.

Quo in loco applicanda.

aut balneo adhibeatur. Pre omnib. uero animaduertere oportet, ne in fortium medicamentorum admotione curis ultra quam conuenit concaleſcat: id quod tum ex colere ipſius, tum digitorum tactu deprehendes. Color namq; rufus magis apparebit, & digitorum tactu ſatis calidam cognosces. Horum itaque animaduersionem habere oportet. periculum enim, iterum atq; iterum repetito eorum uſu, cute exuri. Quare ad molliora tranſeundum eſt. Plura autem paratu facilia medicamenta habet Galenus lib. 1. de Compo. medica. ſecundum locos cap. 1. Ceterum cum morbus ex uitiatu humoribus procreatus ſit, neceſſe erit ut tota uiſtus ratio ſit ex cibis & potu boni ſucci. De quibus Galenus in peculiari de ijs libello conſcripto conſulendus erit. De alijs paſſionibus capillorum & cutis capitis abſe ſcribit Gal. lib. 1. de Compo. medi. ſecundum locos: quas nos hic conſultum pretermiſimus, quando raro admodum in his curandis medicorum opera requiratur.

De dolore capitis.

Cap. II.

κεφαλαλγία.

Cauſa.

Nota.

Kεφαλαλγία latine dolorem capitis ſonat, & euſpotiſſimum, qui non inueteratus eſt, non curando an per ſe accidat, aut alterius affectus ſymptoma ſit. Barbari medici Sodaſ nominant. Huius autem due potiſſimum cauſe ſunt. Nunc enim ex ſola intemperie ſimplici citra humorum complexum nunc uero ex humorum copia accidit. Vehementiſſimi autem capitis dolores ſunt, ob caliditatem & frigiditatem: moderati ob ſiccitatem. Humiditas ſui ipſius reſpectu nullum plane dolorem inducit, niſi calori, aut frigori, aut humorum copie adiuncta ſit. Similimodo humoribus uel in toto capite, uel in aliqua tantum parte redundantib. calidis quidem ac frigidis uehementior, ſiccis uero moderatior dolor inuadit, ſi tamen ſiccitas abſq; manifeſta caliditate fuerit.

De Medend. Morbis Lib. I.

cit. Humidi autem, quantum in ipsorum ratione est, nullum prorsus dolorem afferunt, multitudine tantum grauant, si citra obstructionem sint. Cum obstructione enim moderata, moderatè dolorifici: cum forti, uehementer dolorosi sunt. Vt autem ordi ne omnia tractentur, et rectius assequantur, propria iuxta singulos affectus capitis dolores, pcreantes auxilia describemus, initiū à calida intemperie sumētes.

De dolore capitis ex calore.

Cap. III.

Per calorem hic intelligimus, intemperiem calidam nude qualitatē. Hec autem potissimum generatur ex solis ardore. omnes enim homines in sole estiuo diutius uersantes, capite incalescunt. Ex motu immodico, balneis, flammę uicinitate, ira, furore, calidis affectibus, odoramentis, cibo calido et acri, cepis uidelicet, alliis et porris. Qui ex ardore caput dolent, eorum cutis tactu calida est, et primo statim manus iniecta aridior apparet, oculi rubent, frigidis tum perfusionibus tum inunctionibus gaudēt, et iuuantur. Euitandus aer calidus, nullū perflatū recipiens, et calidis uaporibus refertus. Deligendus contra is, qui natura frigidus, aut qui nostra arte sic pparatus sit ex floribus ac germinibus frigida facultate pditis p areā proiectis, et humi fuis, rosis nimirū, uiolis, nymphaea, quā Nenuphar hodie nomināt, uitium capreolis, ruborum ramis, et similibus. Aqua etiam frigida de uasis in uasa transfusa aērem refrigerare ualet. Cibi sint natura frigidi, lactuca, portulaca, ptisana hordei, aut alica eiusdem, oua sorbilia, panis ex aqua, pulli columbarū cum omphacio (agre stam uocant) cocti. Pilces petrosi et lac amygdalarū cum fursurib. decoctum. Potu uero aqua utendum est, nisi quibusdam uentriculus propter aque potus subuertatur: tum enim prestat uti uino aquoso, et bene diluto, aut aqua in qua cinnamomum decoctum

A i i i est,

Causa.

Signa.

Victus.
Aer.

Cibus.

Potus.

Somnus .
Excremen-
torum ex-
pur gatio .
Exercitia .
Animi af-
fectus

Curatio .

Adhibitio
medica-
mentorum

est, cui intybi domestici (endiuiā appellant) sirupus,
et acetosus simplex, aut oxyracchara admixta sit.
Ceterum somni ac quietis cura in primis habenda
est. coitum euitet; alui excrementa ac lotium non re-
tineat, sed ab iis sese suo tempore exoneret. Exercita-
tiones, frictiones, balneaq; fugiat. Iram, furorem,
aliasq; animi perturbationes corpus excalfacientes,
prorsus non admittat. Vitandus igitur clamor, con-
tentio, omnisq; mentis perturbatio et percussio. In
bona autem animi habitatione et firmitate degen-
dum. Dolorem autem capitis è caliditate curant, ea-
que refrigerandi facultatem citra manifestam adstri-
ctionem obtinent. Optima uero censenda, quæ te-
nuium partium substantia prædita sunt. Quapropter
in principio quidem nihil præstantius, quam oleo
rosaceo probè apparato caput perfundere. Proxi-
mum à rosaceo chamæmelinum locum habet, in his
corporibus, quibus uehementem frigiditatem indu-
cere ueremur: qualia sunt faminarum, et eunucho-
rum, ac puerorum, et quicumq; carne molli præditi,
albumq; habentes colorem. Sed si uehementer infri-
gidari oporteat, semperuiui succum, aut lactuce, aut
psyllii, aut polygoni (corrigiolam appellant) adii-
cere conuenit. Quin et solani aliquando succum, et
pampinorum, et uuarum immaturarum adiacere lice-
bit. Vetus autem hodie sicut olim etiam obtinuit, ut
prædictis medicamentis parum aceti, ut nimirum ma-
iorem et penitus penetrantem uim induat medica-
mentum, admisceatur in hunc modum. R. Olei rosa-
cei. ℥. ii. aque rosaceæ. ℥. i. s. aceti. ℥. s. misce. Aliud.
Aquarum semperuiui, lactuce, solani. añ. ℥. ii. aquæ
chamæmeli. ℥. i. s. aceti. ℥. i. misce. In iis medicamen-
tis lintheolum tingito, iuxtaq; frontem ubi pilosa
eius pars desinit, et iuxta tempora imposito. Occi-
put hoc medicamento tangi haud debet: neq; enim
citra molestiā refrigerantia sustinet, propterea quod
isthic

isthic principium medullę spinalis existat. At finci-
 put ob laxitatem coarticulationis iuxta coronales
 futuram, et ob ossium tenuitatem et raritatem, fa-
 cile tum caliditatem tum frigiditatem omnium que
 adhibentur medi. intrò distribuit. R efrigeranda au-
 tem quęcunq; adhibetur medicamēta, in aqua uehe-
 menter frigida collocata: quę si nō adsit, niuem aut
 glaciem uasculo circumpones. Eodem sanē modo
 oleis aliis uti licebit, ut est cotoneorum, uiolaceus, et
 nymphę, nenupharinum hodie nominant. Interdū
 adicere mucilagines, ut uocāt, seminis psyllii, et co-
 toneorum, ac linimentum conficere in hunc modus
 R. Mucilaginis se. cotoneorū, mucilaginis se. psylli-
 lii. añ. 3. iiii. succi portulacę. 3. ii. olei rosacei. 3. i. mi-
 sce, fiat linimentum. Cum adiectione cere, et aliorū
 medi. unguēta efficies in eum modū. R. Vnguenti po-
 puleon. 3. i. oleorum uiolarū, et rosacei. añ. 3. iiii. florū
 nymphę aridoz, rosarum rub. añ. 3. i. cere quantus
 satis est: fac unguentum, quod illinatur fronti et tem-
 poribus. Proderunt etiā embrochę ex rosis, uiolis
 floribus nymphę, folijs salicis, hordeo excorticato
 portulacę, uitis, ac similibus. Si somnū cōciliare uo-
 lueris, adde papaueris lactucęq; folia. Hęc quidē, ut
 diximus, inter initia morbi remedia congruent. Po-
 stea uero mitigantia ac maturantia medicamenta re-
 primentibus miscere opz, in hunc modū. R. Florum
 rosaz, uiolarū añ. M. s. folioz salicis herbaruz came-
 meli, meliloti, añ. M. i. se. maluz. 3. iiij. hordei excorti-
 cati. 3. i. Coquātur oīa in aquę lib. ij. usq; ad tertie
 partis consumptionez, fiat embroca. Tandē ex discus-
 soriis medicamentis quippiā addendum, paulatim de-
 tractis iis q̄ repellunt. Hactenus de iis q̄ extrinsecus
 corpori adhibetur. Intra corpus assumi possunt usi-
 tata hodie medicamēta, Iuleb uiolarum, rosaz, con-
 seruę eorundē, confectio quam manū CHR ISTI ap-
 pellāt, et alia eiusmodi, qbus alterādi inest facultas.

A iiii De

Linimen-
tum.Embro-
cha.

*Causa.**Signa.**Vitius.**Curatio.*

Per frigus intellige intemperiem frigidam nude qualitatis, citra alicuius humoris frigidi confluxum. Hec contrahitur ab ambiente nos aere frigido, potissimum si quis aperto capite in hoc uersetur. Cibus et potu frigidis, precipue autem frigide aque potione, et in ea natatione. Frigidorum medicamentorum improvida admotione. Signa dolentium caput ob frigiditatem, contraria sunt eis que ex calore oriuntur. Tangentibus enim caput nullus sentitur calor, incontracta minimeque arida et decolor ipsorum facies existit. Oculi neque rubent, sed contra subhumido pallore deformantur. Frigidis neque gaudent, neque iuuantur. Caveat aërem frigidum, uersetur in calido. Lactis usus in cibo caueat, ac piscium, aliorumque que comesta refrigerare possunt. Ovis forbilibus, carnibus perdicum et phasianorum similiūque uestatur. Dandum uinum tenuium partium, quod tantum abest ut noceat, ut etiam plurimum conducat, quod nimirum calefaciendi extenuandi que facultate preeditum sit. Motu corporis utatur, gestationeque in equo. Somnus illi confert mediocris, ideoque plus uigilandum illi erit quam dormiendum. Lauacra calida prosunt. Animi perturbationes, tristitiam, graueque cogitationes euitet. In admouendis autem medicamentis cerebri natiuum temperamentum considerandum erit, quod tale est, ut neque uehementer calida, neque etiam uehementer frigida ferat medicamenta. Conuenit autem in hoc omnibus, quod oleum rutaceum calidum, sincipiti (ut supra dictum est) adhibitum, perfecte hominem liberare possit. Si uero uehemetiori calefactione sit opus, piper aut euphorbium ad oleum coniiciatur, aut aliquid olei de piperibus, uel euphorbii rutaceo oleo ammisceatur. Conueniunt etiam haud secus atque rutaceum, laurinum, itemque

De Medend. Morbis Lib. I.

itemq; irinum oleum, quibus non solum frons, uerū etiam facies ⁊ nares inungendę erūt. Prędictis oleis alia quędam medicamenta calida adicere licebit, atq; unguentum hunc in modum cōficere. ℞. Oleo rum irini, rutacei. añ. 3. s. maioranę, betonicę, piperis. añ. 3. i. euphorbii gr. v. cereę quod satis est, fiat unguē tum. Neq; parum proderunt embrochę ex floribus meliloti ⁊ camomillę, maiorana, origano, betonica, sambuco, saluia, foliis laurinis, stichade, ⁊ simili bus in aqua decoctis. In eundem usum sacculi adhi beri possunt, sic confecti. ℞. Foliorum lauri, serpili, maioranę. añ. M. s. florum rosmarini. M. i. rutę. p. i. gariophyllorum, stochados arabicę. añ. 3. i. pulegi, calamenti. añ. 3. i. s. teratur singula, ⁊ fiat sacculus ca piti adhibendus. Imponatur autem capiti, calefa ctus in latere, acetoq; prius irrigatus. Nec alienum ab instituto erit, si quis pomum a liquod odoriferuz in hunc modum composuerit. ℞. Styracis calamitis. 3. ii. gariophyllorum, maceris, ligni aloęs. añ. 3. s. lauē dulę. 3. ii. gallię moschatę. 3. i. s. moschi, ambre gr. iii. Terantur omnia subtilissimę, ⁊ cum aqua maio ranę ⁊ stacte, (storacem liquidam uocant) quod la tis est, fiat pomum. Intra corpus adhiberi possunt, eclegma diacori, confectio dianbre, diamoschi dul cis, dianthos, syrupus de stochade, ⁊ alia calida me dicamenta, quorum singulatim facere mentionem superuacaneum erit.

Vnguen tum.

Sacculus.

Pomum.

De dolore capitis ex siccitate.

Cap. V.

Per siccitatem accipe intemperiem siccam nude qualitatis, quę potissimum ex immodica corpo ris uacuatione, siue ea per medicamēta, siue aē rem ambientem, famem, coituz, exercitia, animiq; p turbationes acciderit, euenire solet. Deprehenditur si pauca aut nulla penitus ex naribus excremēta ef fluxerint, oculi concaui fuerint, plurimumq; uigila uerint.

Cause.

Signa.

Vicius.

uerint. Verſetur in aëre humido, ueſcaturq; cibis hu-
meſtantibus, ⁊ boni ſucci, uitellis nimirum ouoruꝝ,
teſtibus gallorum, eorundemq; iure, phaſianis, perdi-
cibus, ⁊ aliis quæ plurimum nutrire poſſunt. Vinuꝝ
bibat tenue ⁊ aquoſum, ſomno utatur largiori. Ca-
ueat motum corporis, ac quiete potius otioq; uta-
tur. Coitum, famem, ſitim, ⁊ omnia quæ exiccare
poſſunt, fugiat. Lauacra quæ humeſtare ualent, ut
iunt, Galeno lib. 3. de tuend. ualetu. autore, dulcium
calefactarum aquarum, ſi tepidiores fuerint, non pa-
rum proderunt. Letetur, atq; omnem animi pertur-
bationem ⁊ percuſſionem uitet. In hoc morbo capi-
ti adhibendum erit oleum uiolaceum, amygdali-
num, quod ſciſicet ex dulcibus confectum eſt amyg-
dalis. Inungendum uero iis non ſoluꝝ ſinciput, imò
etiam naribus inſtillanda erunt. Non temere iam di-
ctis oleis pinguedines ammiſcentur, ad eum modũ.

Curatio.

Linimen-
tum.

℞. Oleorum uiolacei, nymphae (nenupharinum no-
minant) añ. 3. iii. pinguedinis uituline, galline, buty-
ri recentis, ſalis experti, añ. 3. ii. miſce, fiat Linimentũ.
Neq; à ratione alienuꝝ erit, ſi aliis, nempe farina hor-
dei, uiolis, aut nymphaea, adiectis, unguenta ⁊ empla-
ſtra confeceris. Proderit etiam, embrochas ex uio-
lis, ſimilibuſq; herbis cõpoſitas adhibere. Intra cor-
pus ea exhibenda erunt, quæ tabidis conueniunt, de
quibus ſuo dicemus loco.

De dolore capitis ex plenitudine.

Cap. VI.

Plenitudo.

HAtenus de curatione doloris capitis quæ ex
nuda qualitatũ intemperie prouenit, egimus.
iam de eo qui ex plenitudine oritur, uerba fa-
ciemus. Plenitudinem autem uocamus, id quod Græ-
ci πᾶντος καὶ πληθύναν, quæ nihil aliud, niſi quum
quatuor humores ex æquo aucti ſunt, aut cum ſan-
guis ſolus abundat. Idem enim eſt, quando ſynce-
rus ſanguis inuenis contineri non poſſit, quin ali-
quid

quid bilis, uel pituitę, aut serosi humoris illi com-
 mixtum sit. Hoc itaq; aucto, ut reliqui etiam omnes
 humores increſcant, neceſſe eſt. Atq; hinc eſt, quod
 recentiores hunc capitis dolorem ex ſanguine no-
 minauerint. Fit ab iis quę plenitudinem in corpore
 procreare poſſunt, hoc eſt, quę omnes ex æquo hu-
 mores abundare efficiūt, ut ſunt cibi & potus copio-
 ſi & boni ſucci, neglectio exercitiorum, balnei, ludo-
 riſ, & aliarum uacuationum naturalium & artificia-
 lium. Facies & oculi rubent, uenę tenduntur, adeo
 ut non maiores duntaxat, ſed etiaſ parę, quę prius
 ſenſum effugiebāt, nunc uiſu comprehendātur. Pul-
 ſus magnus & uehemēs. Vrina ſubrufa ac craſſa. Ve-
 nę temporuſ pulſant. Dolor capitis grauatiuſ. Ver-
 ſetur in aëre frigido & ſicco. Vitet carnes, oua ſorbi-
 lia, & alia quę copioſe nutrire poſſunt. Utatur ptifa-
 na hordeacea, aut alica hordei. Oleribus frigidis, in-
 tybo (ſcarioſam & endiuiam uocant) portulaca, & ſi-
 milibus ueſcatur. Fugiat uinum, bibat aquam deco-
 ctionis cinnamomi, aut hordei. Exercitetur medio-
 criter, fricetur, frequenti utatur balneo, ita tamen ut
 corpus prius uacueſ, & eger minime febricitet. Som-
 nus ſit mediocris. Gaudeat & letetur, animiq; omnis
 perturbatio abſit. Primum omnium curandı ratio
 a ſanguinis miſſiōe aſpicietur, ac uena in cubito ex-
 teriore, quam humeralem & cephalicaz hodie uocāt,
 eiſ partis in qua dolor potillimum eſt incidatur:
 quod nimirum hæc uena capiti ſit continuata, atq;
 adeo non ſolum in contrarium auellere, uerum etiaſ
 euacuare partem affectam poſſit. Id quod non ſo-
 lum Galenus, uerum etiaſ Razes lib. 9. ad Alman-
 ſorem Cap. 1. faciendum ſuadet. Quod ſi ætas, aut
 uirtus imbecilla uenę ſecandę conſilium intertur-
 barint, cucurbite affigendę erunt, non quidem ca-
 piti, ſed membri ei continuatiſ, & cum eo ſocietate
 habentibuſ. Sic enim Galen. lib. 13. The. meth. ca. 13.

Cauſe.

Signa.

Viſus.

Curatio.

Vena ſec-
tio.

ita

Localia.

Decoctum
purgans.

ita scribens : Generandis adhuc passionib. minime
iis partib. que laborare incipiunt, sed que iis sunt co
tinuatę, cucurbita imponi debet, auellendi in con
trarium causa. Post hec refrigerantia ⁊ ad stringen
tia medicamēta capiti adhibeantur, de quibus abun
de supra in cap. 3. dictum est. Alius etiam ut aperta
sit, medicus diligēter curet: ideoq; si spōte sua excre
menta corporis nō deiecerit, hoc uel simili decocto
purgetur, quod. ℞. Florum boraginis, buglos
se, uiolarum, rosarum. an. M. s. se. quatuor commu
nium frigidorum maiorū excorticatorum. an. 3. ij.
myxorum (sebesten appellāt) prunorum damalceno
rum an. numero. xii. passularum, tamarindorum.
an. 3. i. corticum myrobalanorum luteorum, (citri
nos hodie nominant) cęruleorum (Indos appellant)
cepuorum (chebulos uocant) empeliticorum (embla
cos nuncupant) beletzicorum (belliricos corrupta
uoce dicunt) an. 3. iij, glycirrhizę rase, liquiritiam ap
pellant. 3. i. fumi terre, adianti, capillum Veneris no
minant. an. M. 1. tamaricis (tamariscum uocant) he
mionitidis, scolopendriam dicunt. an. 3. ij. foliorū
senę, polypodii. an. 3. s. agarici. 3. ij. s. zingiberis. 3. s.
decoquantur singula in aqua fontana sufficiēti, do
nec medietas eius consumatur. Dein coletur, ⁊ sac
charo sufficienti dulcescat, clarificeturq; cum albu
minib. oui, ⁊ fiat potio depurata. de qua eger in au
rora. 3. iij. bibat. Quod si ualidius requirat medica
mentum, tum prestitit in. 3. iij. iniicere rhabarba
rū in puluerem redacti. 3. i. spice. 3. s. Aut in iis dissol
uere casę fistularis. 3. i. s. aut mellis acrii, mannam
uocat. 3. i. Aut eclegmatis diaphenico. n. 3. iij. In eun
dem usum exhibebis iyrupū uiofaceum, ⁊ oxyfacha
ram nominata. Post hec adhibenda capiti sunt me
dicamenta que reliquias morbi discutere ualent, ut
est althę semen, fœnum gręcū, chamęmeli melilotiq;
flores. Olea deniq; chamęmelinum, anethinum, ⁊
similia.

similia. Ex quibus linimenta, unguenta, emplastraq;
componi possunt, admodum in precedentibus capi-
tibus monstratum.

De dolore capitis ex biliosis humoribus. Cap. VII.

Fit ab omnibus iis, quæ corpus præter naturam
calefaciunt & exiccant, adeoq; bilem flauam
procreant, ut sunt uehementia exercitia, ira,
uictus ratio ex biliosis cibis constans, uita curiosa,
& similia. Signa in hoc similia sunt ei qui ex calore
oritur, maior tamen in hoc morsus, & faciei pallor.
Interim etiam oris amaritudo, oculorum siccitas,
linguæ & narium est. Aetati etiam uigenti, & tempera-
turis calidioribus, uictuq; solite, & his qui flauam
coaceruant bilez, hæc passio præcipue accidere solet.
Moretur in aëre frigido & humido, qui arte etiam,
ut supra ostensum est, confici potest, si pauimentum
ædium assidue humore aspergatur: aut flores ac ger-
mina, quæ frigide humideq; facultatis sint, per areas
proiciantur. Cibi in uniuersum humidi & boni suc-
ci sint. Vescatur lactucis, portulaca, piscibus paruis
& saxatilibus. Potus sit dilutus, aqua decoctiois cin-
namomi. Vino prorsus abstineat. Quiescat, & som-
no utatur largiore. Balneum quoq; illi temperatum,
& unctiões conferat. Gaudeat, & omnes animi per-
turbationes fugiat. Curandi ratio à biliosi humo-
ris euacuatione, non ut loquuntur barbari, digestio-
ne auspicianda. Neq; eni; tenues humores, qualis est
bilis flaua, quando quidem mobiles sunt, uacuatio-
ni inepti esse possunt: atque adeo ut præparentur nō
indigent, ueluti in cap. 11. libri secundi Paradoxorū
monstrauimus. Vacuatur autem biliosus humor per
absinthii cremorem, aut per aloē, & per hierampi-
cræ per se datā, aut catapotia ex aloē confecta. Ne-
que absurdum erit, si quis decoctum purgans, cap. 6.
descriptum exhibeat, atq; in eo dissoluat. 3. iii. ecleg-
matis

Cause.

Signa.

Victus.

Curatio.

*Biliosi hu-
mores nō
egent præ-
paratione*

*Dilutum
rhabarba-
ri.*

*Bolus.
Clyster.*

Localia.

matris de succo rosaceo, aut de psilio uocati. Proderit etiam rhabarbari dilutum (infusionem hodie nominant) in hunc modum compositum. ℞. Rhabarbari selecti. ʒ. ii. spice. ʒ. i. concidantur minutatim, et macerentur in succis intybi domestici. cassutę (cuscutam appellant) buglossi (borraginem nominant.) añ. ʒ. i. uini optimi. ʒ. s. Durent horis duodecim in infusione, dein ualide exprimantur et colentur, adiectis eclegmatum de succo rosaceo, de psilio. añ. ʒ. i. s. misce, fiat potio. Vti etiam licebit catapotiiis aureis, alephanginis, de rhabarbaro, de hiera simplici nominatis, et similibus. In delicatis non temere quis hoc bolo utetur. ℞. Scammonię preparatę. ʒ. i. maceris, cinnamomi, mastichis. añ. gr. iii. conserue uiolarum, nymphę. añ. ʒ. i. sacchari quod satis est, fiat bolus. Proderit etiam clysteribus uti in hunc modum confectis. ℞. Maluę, althęę, intybi utriusq; domestici, hoc est, endiuę et scariolę, uiolarum. añ. M. i. hordei integri. ʒ. i. se. quatuor communius frigidorum minorum. añ. ʒ. iii. Coquantur singula in aqua fontana ad tertię partis consumptionem, et colentur. ℞. Colaturę lib. i. medullę casię fistularis. ʒ. i. hierę picrę. ʒ. s. olei uiolacei. ʒ. iii. uitellos ouorum numero. ii. salis. ʒ. i. s. misce, fiat clyster. Post biliosi humoris uacuationem, ea medicamenta quę caput refrigerare ac roborare possunt adhibeantur, qualia multa Cap. 3. huius libri commemorata sunt. Quod si uero uigil supra modum æger fuerit, sinciput oleo nymphę, et de papauere inungendus erit. Adiciere etiam interdum necesse est prædictis parum opii, ut scilicet somnus hac ratione concilietur. Galenus in eum usum trigoni pastillum, quem describit Paulus libro. 7. Cap. 12. commendat, ut eo frons inungatur.

De

De dolore capitis ex pituitosis humoribus. Cap. VIII.

Generatur ab omnibus quæ pituitam in capite procreant, ut est aër frigidus et humidus, cibi iisdem qualitatibus præditi, pisces, lac, olera, fructusq; item ocium, somnus à plenitudine, et similia. Dignoscitur, si caput grauatur, facies alba ac tumida fuerit. Si denique æger somno facile tentatur, piger est sensibus minime uiget, et excrementis capitis redundat. Aër egrotum ambiens, calidus et siccus sit natura, aut arte per odora menta aliqua, cinnamomum nimirum, thus, gariophyllos, agallochon (lignum aloës nominant) præparatus. Caribus uescatur assis, et odoramentorum accessione conditis. Vinum tenuium partiu3 confert. Motus mediocris, et alia quæ supra Cap. 4. monstrata sunt. Ratio curandi à pituosi humoris extenuatione et incisione auspicanda erit, in quem sanè usum mel rosaceum, oxymeli simplex, compositum, scylliticum, syrupus de stochade cum succis hyssopi, betonicæ, maioranæ, et saluie cōueniunt. Vel si usus syruporum et succorum displicuerit, hoc decocto uti licebit. ℞. Radicuz fœniculi, petroselini, apii. añ. ʒ. i. radicis pœoniæ. ʒ. ii. seminum anisi, fœniculi, sileris mōtani, seseli Gale. uocat, añ. ʒ. iii. stichadis arabici, origani, serpilli, maioranæ, calamenti, betonicæ, saluie, añ. M. s. cinnamomi selecti, maceris, añ. ʒ. i. s. Decoquantur iuxta artem in aqua sufficienti, usq; ad medietatis consumptionem. colētur, et colatura saccharo quod satis dulcescat, atq; subinde cum oui albimine depuretur. Adde syrupi de hyssopo, oxymelitis simplicis, añ. ʒ. iii. misce, fiat potio. Preparatis ac extenuatis iam humoribus pituitosis, reliquuz est ut purganti medicamento euacuentur. In quem usum pderunt pilule de hiera cōposita, coctiæ, et sine quibus esse nolo. ℞. Masse pilulari coctiarum. ʒ. i. s. pil. de hiera

Causæ.

Signa.

Aer.

Curatio.

Præparatio.

Decoctum.

præparans
pluult am.

purgatio.

Pillule.

de hiera composita .3. r. alephanginarum .3. s. agari-
 ci trochiscati. 3. ii. myrobalanorum cepulorum
 (chebulos hodie nominant.) 3. r. turbit optimi.
 3. s. stichados arabici, zingiberis, añ. gr. v. masti-
 chis gr. vii. granorum pæonię numero. iii. casto-
 rei gr. iiii. cum succo lauandule fiant pilule pro
Clyster. singulis drachmis numero. xi. Conferunt etiam cly-
 steres, non solum propter euacuationem eorum, que
 in intestinis continentur, sed etiam ob reuulsionem
 eorum que ad caput feruntur. In quem usum prædi-
 ctum decoctum præparans componentia medicame-
 ta conducent, si colature. 3. xii. recipiantur, et in ea
Capitis dissoluantur benedictę laxatiue. 3. s. eclegmatis Indi
Purgatio. 3. iii. diaphenicon. 3. ii. mellis rosacei. 3. i. oleorum lau-
 rini, rutacei. añ. 3. i. s. sal is gemmę uocatę. 3. r. misce,
 fiat clyster. Toto uacuato corpore, ea que caput ex-
 purgare possunt adhibenda erunt, ex quorum nume-
 ro sunt apophlegmatissimi, de quibus cap. r. abunde
 dictum est. Purgatur etiam caput per ea medicamen-
 ta, que hodie Caputpurgia uoce barbara nominat.
 Conficiuntur ex succo maioranę, bliti, brassicę, et hu-
 iusmodi. Gargarismi etiã hoc nomine adhiberi pos-
Gargaris- sunt ex succis hyssopi, betonicę, origani, hiera picra,
mi. et oxymelite confecti, uel in hunc modum. R. R. adi-
 cis pyrethri, piperis logi. añ. 3. r. s. se. staphysagrię. 3. s.
 maioranę, pulegii, hyssopi, origani, betonicę. añ. M.
 s. Decoquantur singula in aqua idoneę quantitatis
 donec tertia eius pars absumatur. Colature adice
Sternuta- mellis rosacei. 3. r. s. oxymelitis scyllitici. 3. s. misce.
mentum. fiat gargarismus. Sternutamentorum etiam hoc lo-
 co usus erit, sic confectorum. R. Maioranę. 3. r. nigel-
 lę. 3. s. gariophyllorum, piperis albi, cubebarum. añ.
 3. i. nucis myristicę, struthii (adisi uocat) castorii, el-
 lebori albi. añ. 3. s. misce, fiat puluis. Ditiorebus adhi-
 ciendũ aliqd moschi et ambreg, cuiusq; scilicet gr. ii.
 Naribus etia adhibere odoriamenta calida cõuenit,
 aut pomum

Aut pomū aliquod odoriferum conficiendum erit,
 quale suprà cap.4.commemorauimus. Errhina etiā,
 (Nasalia appellant,) narib.indíta commodant.ur.℞.
 seminis staphysagrie,pyrethri,piperis albi.añ.3.s.ni-
 gelle, struthii,añ.3.ii.ellebori albi.3.s.redigātur sin-
 gula in puluerem, & cuz resina terebinthina fiant Na-
 salia. Post capitis purgationem cōueniunt inunctio-
 nes, embroche, sacculi, & similia medicamenta, suprà
 cap.4.producta, quibus discutiendi inest facultas. In-
 tra corpus exhibentur cubebe saccharo obducte, cō-
 fectiones diambre, diamoschi, aromatici rosacei, dia-
 cumini, theriaca, Mithridati antidotus, diacori, con-
 serue maiorane, rosmarini, betonicę, & eiusmodi. Po-
 tissimum uerò hæc confectio.℞.specierum aromati-
 ci ros. diambre, diamoschi dulcis, añ.3.ii.specierum
 eclegmatis de gemmis, dianthos.añ.3.i.cubeborum,
 maceris, añ.3.s.agallochi (lignum aloes uocant,) ga-
 riophyllorum, se.fœniculi, añ.3.s.cinnamomi electi.
 3.ii. stichados arab.3.s.sacchari candidissimi. 3.vi.
 in aqua florum pæonię & lauandule dissoluti, fiat cō-
 fectio in rotulis aut morsulis. Hic practicarum, ut
 uocant, scriptores inserunt caput de dolore capitis
 ex melancholicis humoribus, præter tamen necessita-
 tem, cum omnia quę hic ab iisdem dicuntur, rectius
 in cap. de melancholia sint transferenda.

Errhina.

Morsula.

De cephalæa

Cap.IX.

KΕφαλαία, diuturnus & egrè cedens capitis do-
 lor Græcis appellatur, qui ex parua occasione
 maximas exacerbationes habet, adeò ut neque
 strepitus neqz uocem uehementiores, neqz splēdidū
 lumen, neqz uini potionē neqz caput replentia odo-
 ramenta, neqz motum tolerare possint, sed in quiete
 & tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere cu-
 piāt, ut quibus ueluti à malleo feriri caput uideatur.
 Quidam etiam uelut contundantur aut distendantur.

κεφαλαία
quid.

B tur

*Causa.**Signa.**Victus.**Curatio.**Vene se-
ctio.*

tur ea quę circa caput sunt sentiunt, non paucis ue-
ro usq; ad oculorum radices dolor progreditur. Ha-
bet aut hic affectus aliquando quide; cōtinuos do-
lores, aliquando uero exacerbationes, et interualla
siue ordinata, siue inordinata. Quidā etiam ex eis ce-
rebrī mēbranas dolitant, quidā uerō mēbranam tā-
rum caluariam ambientem. Fit ex uaporum aut hu-
morū calidorum uel frigidorum multitudinē, intra
caluariā uel extra contenta. Dolores cum grauita-
te, humorum multitudinē significant: cu; mordaci-
tate uerō, aut humorū aut uaporum acredinem: cu;
pulsu autem, inflātionem: cum tensione uerō, siq-
dē citra grauitatem et pulsū fiat, flatus tenuis et uē-
tosi multitudinē demonstrant: cū pulsu uerō, mē-
branosi corporis inflātionem. Si uero cum graui-
tate distentio fiat, humorum multitudinē intra mē-
branas contentam. Et dolores quidem in superficie
hērentes, membranę os calugē ambientis affectum si-
gnificant. Qui uero in profundo sunt, cerebri mem-
branarum. Quibuscunq; enim affectus intra calua-
riam est, his usq; ad oculorum radices dolores pro-
cedunt, p̄p̄ea quōd oculorum tunice ex cerebri mē-
branis habeant ori. Si uero humor putrefactus ca-
lidior fiat, cum febris caput dolitant. febricitant aut
omnino et qui ex inflammatione dolent. Victus rō
ex superioribus de capitis dolore Capi. petēda erit.
Curatio, si humorū aut uaporū multitudo causa
fuerit, a uacuatione totius corporis auspicabitur. A
sanguinis quidem missione, si totius corporis pleni-
tudo fuerit. Incidenda uero uena primū cubiti ex-
terna, eiusdem quide; lateris, humeralem nomināt.
Et si amplius sanguis redundare uideatur, etiam ex
naribus aperta uena, quantum satis esse uidebitur,
detrahere conueniet. Si uero caput tanquāz imbeci-
lum, ad se sublato humores ac uapores excipiet, ma-
teriam in totū corpus reuellere opz, atq; ita particu-
le

le affecte mederi. Per purgatoria itaq; medicamenta
 & clysteres, quoz omniuz in superioribus capitibus
 copia habetur, ligaturis extremitatū, & pluribus ifer-
 naruz partiu; frictionibus reuulsio fiat: precipue at
 hiera, cuius uiz (ut Cap. I. diximus) exacues, exhibē-
 da est. Ceteruz post totius corporis uacuationē, ca-
 put uacuātib; uteris, apophlegmatismis nimirū, si
 pituite est abundantia, & aliis medicamentis quę na-
 ribus indūtur, cap. 8. come. Deinde ea quę robur ad-
 dere possunt, admoūēda. Repellit igitur oleū ex oli-
 uis immaturis expressuz, & rosacell, p se & cum aceto,
 aliaq; quorum in precedentibus facta est mētio. Ad-
 hibenda uero remedia tepida quidē, ubi frigidior &
 crudior fuerit humoruz multitudo: frigida aut, ubi
 calidior & biliosior extiterit. Post hęc, discutientia
 medicamenta adhibēda erunt, ueluti est oleū chamæ-
 melinū, anethinū, & similia suprā producta. Si uero
 crassior sit humor multitudo, serpillū, aut pulegiū
 comaz, aut calaminthen, aut mentā oleo incoquēdo
 multitudinē euacuabis. Eadē hęc ēt robur parti affe-
 ctę addunt, quapropter usq; ad perfectam curatio-
 nem eis uti conuenit. Omniuz porro longe maxime
 discutit, & perfecte corroborat, uerbenaca recta (uer-
 benam appellant) uiridis. imō & arida cuz radicibus,
 & simul cum serpillo, oleo incocta. Reliqua quę ad
 curationē cephalę scitu necessaria sunt, ex iis quę
 antea de dolore capitis dicta sunt discēs.

De hemicrania.

Cap. X.

Hemicrania ē passio dolorifica, q̄ circa dimidiā
 capitis partē, aliqñ dexteraz, aliqñ sinistraz ptin-
 git, & iuxta suturā secundū longitudinē eius ex-
 tensa; terminatur. Hęc ut plurimū p circuitus exacer-
 batur, ac qbusdā extra caluariā, quibusdā in pfun-
 do capitis, aliis circa tēpōz musculos dolor sentit.
 Fit ex uapōz aut humorz siue multoz, siue calidoz,
 B ii siue

Hemicra-
nia quid.

Causę.

Signa.

sive frigidorum per uenas, uel arterias, uel per utraq;
influxu, quum scilicet ea sola que intra caluam con-
tinentur, hoc est, cerebrum eiusq; membranę, quod
in ipsis redundat, foras protrudunt: aut cum inter-
dum partes corporis infra caput posite, uitiatos ua-
pores aut humores sursum mittunt. Notę quibus hu-
mores multi, calidi aut frigidi deprehenduntur, ex
præcedentibus capitibus petende sunt. Quo autem

Victus.

in loco capitis passio fuerit, ex iis que in Cap. de ce-
phalæa dicta sunt, cognosces. Quibus hoc adicien-
dum erit, si membrana caluam ambiens patitur, tum
adeo uehementer dolere, ut neq; manuum conta-
ctum facile ferant, ita ut ne cutis quidem ipsa omni-

Curatio.

no à passione immunis sit. Victus ratio ex superio-
ribus de capitis dolore Capitib. petenda uenit. Præ-
cipue autem uitanda erunt, que uaporum copiam
sursum mittere possunt, ueluti cepe, allium, sinapi, ra-
phanus, & similia. Qui uero hemicraniam curare ag-
greditur, prius num uenę sectione, aut purgatione
eger indigeat, consideret. Si enim ob plenitudinem
passio orta fuerit, humeralis (quam hodie cephalicam uocant) uena, quę è directo partis patientis est,
incidenda erit. Sin uero propter unius humoris re-
dundantiam hemicrania inuasit, per convenientia
medicamenta is humor purgandus erit, ut superio-
ribus Capitib. monstratum est. Vniuerso corpore

Localia.

uacuato, ad capitis ac localia præsidia progredien-
dum erit, ac uel per digitos manus, uel linteum, dimi-
dia frontis pars, & ea maxime quę circa temporum
musculos est, confricando calefacienda, atq; id ante
accessionis irritationis uel tempus faciendum est. Post
exacerbationem uero medicamentis hemicranicis à
ueteribus medicis appellatis utendum: siquidem
multa caliditas in doloribus percipiatur, his quę
aliquid habent refrigeratorium; citra uero hanc, his
quę multum excalfaciunt. Vtrisque uero aliquid ex
iis,

his, quæ robur addunt, misceatur, quod adstricto-
riam uidelicet habeat facultatem. Optimum autem
in frigido affectu unguentum erit, quod. ℞. olei ane
thini, olei irini, añ. ʒ. s. piperis albi, serpilli, añ. ʒ. i
s. castorii. ʒ. i. euphorbii. ʒ. s. ceræ quod satis est, fiat
unguentum, quod dimidiæ frontis parti, et musculo
temporis illinatur. Nec parum cōfert oleum cui exi-
guum euphorbii commixtum sit, tepidum in aurem
infusum, ut. ℞. olei communis. ʒ. i. euphorbii. ʒ. i. mi-
sce, et gutta una in aurem instilletur. Quadam etiam
naturæ proprietate euphorbium aceto dilutum, ac
latere dextro dolente, sinistro, applicatum, et contra
sinistro dolente, dextro illitum, hemicranicis maxi-
me confert. Idem possunt lumbrici terræ triti, et co-
chlearum carnes lateri affecto illitæ. Sunt qui persi-
corum nucleos tritos, ac illitos parti patienti, mirifi-
cè prodesse tradant. Si uerò à calidis humoribus aut
uaporibus dimidiæ capitis partis dolor fit, ea auxilia
quæ suprâ de capitis dolore ex calore et biliosis hu-
moribus orto, memorauimus, conferent.

Vnguentum.

De uertigine. Cap. XI.

QUOD σκοτωμα Græcis est, hoc Latinis uertigo
dicitur. Hinc uehementer errant, qui inter se differre
tradunt. Barbari corrupta uoce Scotomiâ no-
minant. Est aut, ubi obtenebrationes hebetudinēsq;
oculis obuersantur, et omnia circumagi et rotari ui-
dentur. Oritur uerò interdum cerebro primogenia
passione laborante; interdum etiam, quum ori uen-
triculi consentit. Cerebrum autem patitur, cum cras-
sus ac lentus humor ipsum occupat, à quo uaporo-
sus spiritus ab imbecilli calore resolutus, in cerebri
partibus inordinatè mouetur. Ori autem uentriculi
consentit, quando propter excrementa uitiosa in eo
aceruata, ad ipsum cerebrum exhalatio uaporosa
fertur, spiritum animale in illo circumagens.

Σκοτωμα

Vertigo.

Cause.

B iii Qui

Signa.

Qui hac passione laborat, iis à quacunque leui occasione præ oculis tenebre apparent, adeò ut interdum cadant, maxime si aliquñ in circum rotetur. Si quidẽ ipsi ab una rotatione euenit id, qd aliis à pluribus accidere solet. Proinde hebescent siue aliũ quempia siue rotam, aut id genus aliud qdpiã, aut ipsos quoq; in aquis uortices circumagi uiderint. Visibilis enim spiritus rote agitate aliisq; iam dictis occurrens, eodem motu circumuehitur, atq; ita turbulentus, inæqualis, inordinatusq; humoris & spiritus motus redditur. Vbi ex primaria cerebri passione uertigo dependet, tum aurium sonitus, uehemens dolor, capitis, grauitasq; præcedunt: item olfactus, atque alterius cuiusque sensus à capite prodeuntis oblatio. Patiuntur autem tum potissimum, cum sub sole æstuauerint, uel aliam ob causam calefacto capite humores dissoluti circumaguntur. Vbi uero ab ore uentriculi oritur, stomachi morisionem, cardiogmon

Viſus.

Græci appellant, & nauseam præsentunt. Versetur in aëre puro ac lucido, fugiat crassum ac nebulosum. Cibis uescatur boni succi & concoctu facilib. statuq; omnino carentibus, carnibus perdicum, caponum, phasianorum, gallinarum, uitulinis: piscibus saxatilibus. euaporantia quæuis deuitet. Bibat uinum aquosum, album, tenuissimum, & non ualde antiquum, aut hydromeli. Exercitio utatur mediocri. Somnum diurnum fugiat. nocturno prolixiori utatur. Caueat sibi ab animi perturbationibus. Non intueatur res in gyrum actas, & rotatas, aut celeriter motas. neque in præcipitiis ambulet. hæc enim singula passionem exacerbare possunt. Vertiginosos in accessione quidem odoramentis, frictionibus, & id genus aliis excitare conuenit. Virium autem attestante robore, si nihil aliud obstitit,

*Curatio.**Vena sec-
tio.*

uena humeralis secanda est, siue principium morbi fuerit, siue etiam processerit. In sanguinis

nis autem missione obseruandum, ne plurimum confertim uacuetur, propterea quod à quacunque leui occasione æger facile concidat. Pluribus itaq; ablationib. per certa interualla utentes, congruam mensuram explebimus. Quod si uero sanguinis missionem quidpiã prohibuerit, alius subducatur, semper redundantì humiori medicamentum adaptando. Plurimum uero confert, primum uacuare per acrem clysterem, non solum propter eorum quæ in intestinis continentur uacuationem, ut suprà quoque diximus, uerum etiam ob reuulsionem eorum quæ ad caput feruntur, cuius sanè compositionem pete ex Cap. de Apoplexia. Premissis hisce uniuersi corporis euacuationibus, capiti localia remedia adhibenda sunt, nempe cucurbitulæ ad occipitium cum scarificatione. Postea apophlegmarismis, gargarismis et sternutamentis utendum est. In nares deinde anagallidis succus, aut cyclamini infundendus. Nitrum uero cum nigella tritum, et oleo antiquo mixtum, per nares egregie purgat. Deinceps æger ad balneum ducendus erit, ac capiti embrocha ex medicamentis discutiendi facultate prædictis composita, adhibenda. Quod si uero caput in balneo iupra modum incaluerit, rosaceo et aceto sepe fouendum est, ac refrigerandum. Si igitur ob hæc præsidia passio cessauerit, deinceps à ualidioribus abstinendum: sin persistiterit, capitis arterias in temporibus circa aures incidere oportet, uentre tamen prius aut medicamento, aut clysteri purgato. Qualiter uero incidendæ sint arteriæ, docet Paulus Aegineta lib. 6. Cap. 4. Neque absurdum erit cauterius hoc occipiti post aures adhibere, quod. R. C. a tharidum, abiectis capitibus, alis et pedibus. 3. 1. fermenti aeris. 3. 5. cum aceto et uino è sublimi ignis commercio distillato, subigantur, et admoueantur. Vertigo autem à uentriculi oris consensu, uomi-

purgatio

Localia,

Cauterius

B iiii tu

tu curari potest, qui hoc medicamento mouendus erit. ℞. Anethi. M. i. se. raphani, se. raparum añ. 3. ii. radicis raphani, 3. s. ebulliant in aqua sufficiens, donec tertia pars absumatur. Coletur, et 3. iii. colaturæ addantur oxymelitis scyllitici. 3. i. s. misce, datur à comestione. Proderunt etiam pilulæ stomachicæ, et similes. Dentur à cibo ea quæ uentriculi os constringunt, atque adeò ne uapores sursum ad caput ferantur, prohibent; ut sunt diacotonion simplex, cotionia ipsa, pyra adstringentia, et eiusmodi, de quibus omnibus suo loco plura.

De phrenitide.

Cap. XII.

phrenitis
quid.
Phrenitis
dis.
prima eius
species.

Secunda
species.

Phrenitis est cerebri, aut membranarum eius inflammatio, Galeno lib. 2. de Symp. causis autore. Sunt autem phrenitidis plurimæ differentia, tres tamen præcipuæ. Aut enim imaginatrix sola facultas læsa est, seruata illæsa ratio. id quod Theophilo medico cuius Galen. lib. de Sympto. diff. meminit, euenisse constat: qui quum alio qui prudenter se gereret, atque eos qui præsentis erant, exactæ nosceret, tibicines tamen quosdam arbitrabatur esse in angulo cubiculi, in quo decubebat, eosq; tibia canere, atque pulsare, et se illos uidere putabat alios quidem stantes, alios autem illic sedentes, atq; ita continenter canentes, ut neque noctu, neque interdiu quicquam remitterent. proinde assidue clamans, iussit eos à cubiculo expelli. Is uerò ubi conualuit, quicquid singuli eorum qui ipsum uisitabāt, uel dixissent uel egissent, narrabat. Hoc etiam pacto Galenus ipse laborauit, ubi per æstatem ardente febrili correptus erat, ut licet uidere lib. 4. de patienti. loc. cap. 1. Imaginatio autem læditur priore cerebri parte patiente. Aut ratio tantum patitur, salua imaginatione. Sic patiebatur phreneticus ille, cuius mentionem facit Galenus loco iam citato, et lib. 4. de Patientia.

timentibus loc. cap. 1. qui quum Romæ domi cum la-
 nifici puero contineretur, surgens à cubili uenit ad
 fenestram, per quam & ipse uideri, & prætereuntes ui-
 dere potuit. Itaque ex uitreis uasis singula ostendēs
 interrogauit, iuberentnè ut ea proiiceret? Illi uerò
 ridentes plaudentesque, ut ea proiiceret, rogabant.
 Tum ipse deinceps omnia arripiens, eiecit. at illi ma-
 gnis acclamationibus riserunt. Postea iuberentnè
 puerū quoq; proici, quum interrogasset, atque illi
 iussissent, ilico ipsum deiecit. Hic sanè singula uasa
 suis nomenclaturis probè nominauit. unde intelli-
 gi potest, neque imaginationē fuisse lēsam, neque no-
 minum memoriam deletam. Media uerò cerebri par-
 te patiente, ratiocinandi uis euertitur. Aut imagina-
 tio simul & ratio læduntur. Causa morbi est, uel san-
 guis exuperans, uel biliosus humor cerebrum occu-
 pans. Nonnunquam etiam ex bile perusta nascitur,
 quæ certe grauissimam phrenitidem contrahit. Fe-
 bris continua & amentia infestant, plurimāque parte
 somnus difficilis, & uigilię comitantur. Interdū quo-
 que somnus turbulentus accedit, ut consurgant æ-
 gri, exiliant, furibundè uociferent, uerba sine or-
 dine & sensu effundant, interrogantibusq; nihil cer-
 ti respondeant. Oculos habent cruentos, & sæpe per-
 fricant; interim aridos, interim lachrymantes. Lin-
 gua eorum est aspera, & ex naribus sanguis destillat,
 floccos festucasque colligunt. Pulsus ad hæc exiguo-
 os, languidos, & quadantenus duros habet. Spiratio
 magna & rara. Quibus sanguineus humor morbum
 fecit, ii cum risu insaniunt: Quibus flaua bilis, feroci-
 ter & tam immaniter sæuiunt, ut coërceri nequeant:
 omnium, quæ dicunt faciuntque obliuiscuntur. De-
 cumbat æger in loco tum aëris, tum luminis tempe-
 rati, ac uariis picturis libero, in quem amici quidem
 gratissimi ingrediantur, qui tamen non inopportunè
 interpellent, & nonnunquam blandè ac leniter allo-
 quantur

Tertia
 species.
 Causæ.

Signa

I. Præ. 27

Visus.

quantur, nōnunquā acerbius increpēt. Cibus primū
 esto ptisanæ cremor, aut alica hordei, aut panis me-
 dulla cū aqua, mulsa, aut melle rosaceo sepius lota.
 Oleribus uescatur itybo, lactuca et malua elixis, et si
 milibus, quæ refrigerare atq; humectare possunt. In
 inclinatione morbi pisces quoq; squamosi, et saxati-
 les dandi sunt. Mala et punica, cerasa q; si multus in-
 tus cōficiat feruor, offerēda. Potus sit aqua decoctio-
 nis cinnamoni, aut hordei, cui admixtus sit syrupus
 uiolaceus, rosaceus, aut nymphaeae, quæ nenupharinū
 uocāt. Hæc aut non confertim, hoc est copiose et cele-
 riter ingurgitāda, sed identidē parcius exhibeantur,
 neq; n. sitibundi admodū sunt, ut potū uehementer
 affectēt. Atq; hinc est qd Hippo. li. i. Prænotionū, et
 li. 6. Epid. par. 2. aph. 6. *ἡ ψυχὴ πότες* appellat. Vbi uero
 cōcoctionis notæ apparēt in lotio, et febris nō uehe-
 mens, sed lenior fuerit, atq; uires nō satis robuste, uī
 nū tenue et dilutū (quod ὁ λιγρότερον nomināt Græci)
 dandū. Quod tutius sit in his qui sani hoc bibere cō-
 sueuerūt, et uentriculū natura imbecillū et frigidum
 sortiti sunt. In quiete deniq; ægri quoad eius fieri li-
 cet cōtineātur: si diuites fuerint, à famulis: si n. paupe-
 res, uinculis. nā inordinata motio uires cōuellit. Ce-
 rerū ubi morbus se remiserit, gestatione corporis uti
 cōuenit. Balneū quoq; aquæ dulcis, si corpus squali-
 dū aridumq; fuerit, cōfert: modo tepida fuerint. cum
 enim humectēt et refrigerent, nō solū siccitatem, uerū
 etiā immodicas uigilias mentisq; alienationem unā
 cū febre profligare possunt. Nō sunt tñ nisi corpore
 prius uacuato, ut iam sepe monuimus, adhibēda. Of-
 ficiunt phreniticis supra modū animi p̄turbationes
 proinde nihil quod molestitiā inferat, aut bilem creat,
 cōmittendum est. Si uires ægri permittūt, sanguis pro-
 tinus mitti debet: quoniā non est salubrius aliud, ne-
 que pręsentius auxilium. Secūda aut cubiti uena, hu-
 meralis dicta, aut si ea delituerit, media, et quantum
 tulerint

Curatio.
 Venæ se-
 ctio.

valerint vires euacuandū. Non tamē usq; ad animi deliquiū, ut nonnulli arbitrantur, præstat enim minus demere quā oportet, ob plurimam uehementis motus agitationem, plurimūq; laborē quo egri afflētatur. Prospiciendū ēt, ne clam eger brachii uinculū soluat. Dein rectā in frōte uenā ēt incidere licebit, Quod si ętas uenę sectioni obstiterit, tū cucurbitule cum sacificatione occipitio ⁊ sping admonēde erūt quę ēt hoc noīe conferre solēt, quod ā capite humorū defluxū in contrariū auellūt. In hunc sanē usum præstat clysteribus uti, hoc mō cōpositis. ℞. Folioꝝ maluę, uiolarum, intybi (quod scariolā uocāt) lactuce. añ. M. i. hordei decorticati. ʒ. i. myxorū (sebesten nomināt) numero. xi. Decoquātur in aq̃ sufficiēti ad teetias. ℞. Colaturę lib. i. casię fistularis recēs extractę. ʒ. i. s. mellis rosacei. ʒ. i. olei uiolacei. ʒ. iij. salis. ʒ. i. s. misce, fiat clyster. Si uolueris ut ualidius purget, adiiciēda erit hierę picrę, aut eclegmatis de iucco rosaceo. ʒ. s. Auertēdi ēt ā capite humores, ligaturis extremitatū, frictionibus pedū cū sale ⁊ aceto, ac simil. Caput uero rosaceo, uel oxyrhodino tepidiorib⁹ irrigare oportet. Inflāmato enī cerebro uel mēbranis eius, frigiditas tuta nō est, sicut neq; uehēmēs caliditas. Frigiditas enī meatus cōstringit, neq; finit excrementa ē capite discuti: at ingēs caliditas feruorē cōgeminat. In hūc usum ēt conueniunt succi plantaginis, solani, ⁊ alia quorū suprà facta est mētio. Si passio uehementior fuerit, caput faciēq; assidue oleo in quo capita papauerū decocta sunt fouebis. C dorem quoq; naribus obiciemus, rosas, uiolas, flores nymphęę, caphurā (cāphoram hodie nominant) ac nares ipsas intus, uel frontē, ex iis aut similib. medicamētis illinemus. Nā sopire ac stupefacere principē facultatē opꝝ. cerebrū scz, qđ supra modū incaluit, refrigerando. Si uigilię ēt uehēmēter urgēt, quę somnū cōcilia re pnt, qualia multa quę suprà dicta sunt huc transferenda,

Auerſio.

Clyster.

Localla.

Somnifer.

Unguen-
tum.Embros-
cha.

Digestio.

ferenda adhibebimus. Conferet autem inter cetera hoc unguentum, quod. ℞. unguenti populeon. 3. ii. olei uiolacei. 3. i. ii. se. hyoscyami, corticis mandragore. añ. 3. s. opii gr. ii. croci. 3. s. aceti parum, cere albe quod satis est. Embrocha etiam hæc tepida capiti adhibenda, quæ. ℞. Florum uiolarum siccarum, rosarum, rubearum, nymphæ. añ. M. i. s. hordei excorticati 3. i. se. papaueris albi. 3. ii. se. lactuce. 3. iii. Decoquantur in aqua fontana sufficienti, et fiat embrocha. Postremum, ubi morbus iam resedit, mitiorque factus est, id quod tertio die ut plurimum accidere solet, digeneratione quæ reliquias morbi discutere possunt, medicamenta ad mouenda erunt. In quem usum priori embroche flores chamemeli, anethi et melilori admiscere licebit. Sunt qui gallinas aut catulos per medium fissos capiti apponant. Similiter sunt qui calidum pulmonem arietis, uel recens ex animali acceptum, uel aqua feruente calefactum ad moueant. Si diutinum autem iam malum fuerit, in oleo serpillum decoquere conuenit. Galenus lib. 11. et 13. Ther. meth. castoreo utendum esse phlegmone iam inclinante docet, quoniam non continuo locis circa cerebrum, sed ossibus interuenientibus occurrat. Inest autem ei medicamento et partium tenuitas, quod ipsum iis quorum per densa propugnacula transmitti uim oportet, est accommodum.

De lethargo. Cap. XIII.

Lethargus
quid.

Lethargos passio phrenitidi contraria est. est enim marcor, et in expugnabilis penè dormiendi necessitas. Hoc uitio correptis omnium rerum obliuio accidit, ut uerbis nulla suppeditetur materia: hinc etiam nomen nactum est. ληθην enim Græcis obliuio est, αργην autem captura, uel αργην iners: ut ληθαργος non sit aliud, nisi iners obliuio, uel morbus obliuionem inducens. Causa eius est pituita, quæ frigida

Causa.

frigore nimio et humiditate cerebrum imbuunt. Lethargicos comitatur febris lenta. putrescit enim humor pituitosus in hoc morbo, Galeno lib. 13. The. meth. teste, cum profunda in somnum delatione. Pulsus his magni rarique sunt, et undosi, spiratio nimis rara, et imbecillis. Somnolenti perpetuo sunt, desidiosi, ignavi. Vix et tarde quocunque modo interpellentur, respondent. Oculos quandoque ad uociferationem aperiunt, et denuo claudunt, ad soporemque reuertuntur. Omnium ueluti amētes obliuiscuntur. Oscitant crebro, et hianti ore aliquādiu persistunt, tanquam claudere id obliti. Ad meiendum uocati, porrectam matulam manu tenentes, meiēre obliuiscuntur. Deiciunt per aluum magna ex parte liquidiora. Nonnullis contra uenter indurescit. Urinam reddunt iumentis similem. Quidam ex eis tremiscunt, et sudoribus undiquaque madent. Cubile, in quo decumbit æger, splendidum, lucidum et tepidum sit, Cibi sint attenuantes, incidentes, exiccantes, qui condiantur apio, aniso, cymino, pipere et similibus. Ex auibus, montana auicula, pullus domesticus, perdix. Oleribus, porri, asparagi, petroselinum. Cremor auenę, uel alica eius cum oxymelite, uel salibus, uel pulegio, conueniunt. Potus sit hydromeli, aut uinum aquosum, tenue et album. Si uires permittunt, et nihil aliorum obstiterit, Galeno lib. 13. The. meth. autore, sanguinem statim ab initio mittere expedit. Sin minus, cysteribus acerbis alius eluenda. de quibus in cap. de apoplexia dicemus. Dein oxyrhodinum capiti admouendum. Nam repellendus à capite humor est, quisquis is fuerit, eodem Galeno teste. In quę usum etiam frictiones cum pyrhetto, pipere, sale, et aceto, ligaturęque extremitatū conferunt. Odoramenta quoque excitatoria admouenda, ueluti castoreum, funiculus extinctę lucernę, pix humida, bitumē, chalbanum, sulphur, sagapenum (serapinum uocant barbari) cornu ceruinum, abro-

Signa.

Vitus.

Curatio.

Localia.

Excitatio.

Tia.

ionum

tonū, & peucedā. Extrēa cruraq; ungere, nōtūquā
 pilos ēt in ipsis uehementius euellere oīs, q̄ excitent. Li-
 cebit ēt in acetothymū, pulēgiū, & origanū, aliāq; id
 genus incoq̄re, ac narib. egri adinouere, quo uapor
 ad cerebrū delatus crassitudinē humoris dissecet. Pa-
 latus ēt ualentibus & acris medicamētis, uerbi grā
 sinapi cū melle, antidoto Mithridati, theriaca, & pul-
 uere pyrethri inungendū. Conariq; opz, pituitā indi-
 dez affixaz digitis enicere. Ab his uero ēt sternutamē-
 tis utemur: & si admittantur, apoplegmatisimoz usus
 erit. At si iis affectus non discutitur, caput radendū,
 deinde fouendum est sale, milio, & similibus, per sac-
 culos adhibitis. Ad hęc sinapisimo uti in capite pro-
 dest, ex caricis & sinapi ex aceto contritis p̄fecto. Po-
 stea curcurbiulas occipiti affigere cū p̄surimo igne
 opz, circa primā & secundā uertebras. Castorio ēt ca-
 put illinendū. Quinet, ut Alexāder Trallianus li. i.
 Cap. 20. docet, idipsum potui dare cū oxymelle ex-
 pedit. Nā uno hoc medicamento nōnulli miserrime
 toto corpore ipediti, sanitati restituti sunt. Prēterea
 ad naturę excretiōes frequēter sollicitare oportebit,
 tuz clysteribus, tuz iis q̄ urinaz mouent. Pubez oleo
 rutaceo, cui sit adiectū paululū castorei, aspergere.
 Cēteruz ubi morbus inclinare inceperit, gestatio sta-
 tim p̄tinua utilis est, & balneuz, quod supra modū in-
 p̄ferre solet. Siquidez Alexāder Trallianus se cogno-
 uisse quēpiā scribit, qui lethargo grauissimio labo-
 rauerit, adeo ut se leuari non sentiret. Is post duode-
 uiginti morbi dies balneū ingressus, tantū sensit au-
 xilli, ut ā somno statiz exp̄gisceretur, aliosq; attente
 intelligeret, & ipse uerba expedite faceret, familiares
 oēs agnosces. Quod si uero estū balnei, ob uires im-
 becillas fere haud possit, saltē domi in solio aq̄ cal-
 de lauādus erit. Cauendū tñ, ne aqua caput egrotan-
 tis pfundatur. Smegmate aut mordaciore in balneo
 detergendus, ut uini fece usta, sinapi, pyrethro, pipe-
 lauri

Historia.

auri baccis, calce uiua, ⁊ fini. qb' duplū nītri addē.

De caro. Cap. XIII.

Karos est passio, quam sensuum uniuersarumq; motionū priuatio, spirandi facultate manente illēsa, ꝓsequitur. Arabes Subet appellant. Differt ab apoplexia, qđ in hac spiratio uehementer opprimatur, sic ut quis uel magno conatu uix spirare possit. In illo aut spirandi facultas, Gal. li. 4. de Patiē. loc. Cap. 2. teste, haud quaquā lēdatur. Distat ēt à lethargo, qđ lethargici interrogati rñdent, neq; oīno muti decūbunt. Caro uero laborātes, somni ꝓfunditate occupantur, ut si stimulentur, sentiant qđē, nihil tñ dicant, neq; oculos aperiant. Huius passionis frigidus ac crassus, aut oīno uiscidus humor cā est. Signa ex iis q̄ dicta sunt innotescunt. ꝓfunditate nāq; somni occupantur, oculi q̄ in hac passiōe ꝓpetuō cōniuent. Horꝝ uictus ⁊ curatio cū lethargicis ꝓuenit, ad maiorem tantū incisionē ⁊ attenuationēq; declinamus. Stomacho etiā q̄ calefaciant ⁊ corroborent medicamenta adhibenda, de qbus suo dicemus loco.

De catocha ⁊ catalepsi.

Cap. XV.

Kατοχή καὶ καταληψία Græcis, detentio ⁊ deprehensio Latinis dici pōt. Recentiores medici ꝓgelationē nominant. Est aut detentio subita ⁊ occupatio tū mentis, tū corporis, sensu ac motu priuati, egro in ea corporis figura ꝓmanēte, in q̄ fuerit correptus, siue sederit aut iacuerit, siue claulis siue aptis oculis fuerit. Fit haud sec' atq; ꝓora mala, à frigido pituito soq; humor cerebri posteriora potissimū molestante. Inuadit hoc mali hoīem subito, uoce ꝓterea sensuq; priuatur, nihil audit, nihil rñdet, respiratio nulla apparet, s; q̄si mortuus decūbit. Pulsus est paruus, languidus, ac uehemēter densus. Aluus ⁊ urina detinent, nō qđē siccitatis rōne (plurimo. n. humido eger abundat) s; ꝓꝓ insensibilitatē. Differt à caro, qđ

Caros

quid.

Subet.

Differen-

tia cari ab

apoplexia

Alethargo

Causa.

Signa.

Victus ⁊

curatio.

Catocha.

Congela-

tio.

Causa.

Signa.

catochę di

ut

Scrimen a ut in hoc palpebrę perpetuò clauduntur, sic in illa
caro. interdum aperte manent. **Viſus ratio** eadem est q̃
Viſus. lethargi. egros enim similiter nutrire cõfert, interim
 diebus singulis interim uno interposito. **Passio** sa-
 nè hæc periculosa est, si aut cibo aut potu erretur.
Curatio. Huic etiam malo, præsertim si facies rubescit, & uires
 ualide fuerint, sanguinis missione succurritur. Secan-
 da autem in cubito uena exterior superioruè. Cly-
 steribus etiam uenter soluendus erit, aliaq; omnia q̃
 de lethargi curatione suprà diximus, adhibenda.

De apoplexiâ. Cap. XVI.

Apople-
xiâ quid. **A** Poplexia est, ubi patiente cõmuni neruorū
 principio, omnes corporis particule motus si-
 mul & sensum amiserunt. Vel est priuatio sen-
 sus & motus in uniuerso corpore, cum functionum
 à uoluntatis imperio prodeuntium læsione subito
Causa. superueniens. Fit à frigido, crasso, lentoq; humore,
 uentriculos cerebri principalissimos una uice & cu-
 mulatim replente, quę nimie cruditates, ebrietatesq;
 frequentes potissimum procreant. Fit etia; ob casus
 aut ictum, cerebrum concutientes, atq; ut illuc con-
 fluant humores, efficientes. Aëris etia; frigidi occur-
 su, qui cerebri humiditates & supernacua coarctat, &
Signa. constringendo exprimit. Qui in hanc passionē in-
 cidunt, sensu omnino carētes, mortui uiuunt. Qua-
 propter clausis oculis instar dormientium decum-
 bunt, atq; stertunt. Interrogati, nihil respondent. Si
Apople-
xię magni-
tudo. stimulentur, nihil sentiunt. Discernitur uerò passio-
 nis magnitudo ex noxę, quam spirationi infert, ue-
 hementia: ubi enim naturalem ordinem plurimum
 egreditur, magnā: ubi autem paulū impeditenti est,
 paruam in cerebro noxam esse conicere op̃. Om-
Curatio. nium uero pessima spiratio putanda est, quę & inter-
 mittitur & magna cū uiolentia trahitur. Passio hæc
 nequaquam, aut raro curatur. Neq; enim temere ab
 Hip-

Hippocrate dictum est: Apoplexiam fortem soluere impossibile, debilez uero non facile. Qui eius discrimen effugerint, in diuturnam subinde passionem incidere solent, aut quibusdam membris, aut uniuerso corpore resoluti, sepe etiaz ratione uiolata. Qui igitur quoquo modo curationem recipiunt, iis statim sanguis ex utrisq; humerariis, modo plenitudo adsit, et uirium robur, detrahendus est. Alius deniq; clysteribus acribus ducendus, qualis est qui. ℞. Saluig origani, betonicę, rutę. añ. M. i. calamenti, hyssopi, pulegii, añ. M. s. se. feniculi, feseli (si ler montanum nominant) ammi, añ. 3. iii. centaurii minoris. M. i. polypodii. 3. vi. agarici. 3. iii. medullę colocynthidos. 3. ii. Decoquantur in aqua sufficienti, usq; ad medietatis consumptionem. ℞. Colaturę. 3. xiii. hierę picrę, benedictę laxatiuę, añ. 3. s. eclegmatis. Indi. 3. iii. mellis rosacei. 3. i. oleorum rutacei, costini, de castoreo, añ. 3. i. salis gemmę. 3. i. s. misce, fiat clyster. Comendatur etiam usus glandium (suppositoria nominant Barbari) ex colocynthide, agarico, elleboro, et similibus confectarum. ut. ℞. Pulueris colocynthidos, agarici, ellebori, añ. 3. ii. salis gemmę. 3. i. mellis cocti. 3. ii. fiant glandes longitudinis sex digitorum, appenso filo ut ad arbitrium extrahi possint. Post hæc totum corpus oleo copioso calido inungendum. Extremis etiaz corporis partibus ligaturę, et frictiones uehementes, cum decocto radicis iridis adhibendę. Cucurbitulę etiam humeris affigendę. Caput deniq; prius rasum, irrigandum oleo anethino, rutaceo, aut eo in quo prius serpillū, aut calmintha decocta sit. Naribus adinuenda ea quę odore suo excitant, uti est opopanax, castoreum, sagapenū, galbanumq; Sternutamentorum etiam ratio habenda erit, quę ex struthii (cōdifi appellant) ellebori albi, et castorei puluere naribus indito consent. Embrocharum etiam usus conueniet, quę ex chamęme

2. aph. 42

66

Clyster.

Glandes.

Remissio.

Odora-
menta.

Sternuta-

menta.

Embrocha.

C. li,

Empla-
strum.
rubrif-
icans.

Vomitus.

Vitius.

li, meliloti, saluie, pulegii, maioranę, origani, cala-
minthe & satireie decocto conficiuntur. Sinapismis
quoq; utendum (emplastra hodie rubrificantia uo-
cant) in hunc uel similem modum confectis. R. Olei
costini. 3. i. oleorum castorei, euphorbii. añ. 3. iii. sina-
pi. 3. ii. castorei. 3. i. sagapeni, euphorbii. añ. 3. s. aceti. 3.
i. s. cereę q. s. ad incrassandum, fiat emplastrum. Sarta-
go preterea, ut docet Razes, calefacienda, & capiti ca-
lida admouenda. Oportet autem & ori per uim aper-
to digitum uel pennam oleo irino madefactaz infer-
re, ut ea que insunt eiiciantur. Ceterum sedes etiam
iis que flatus educunt, ruta, cumino, nitro, & melle il-
linenda. Vbi passio se remiserit, cibis mollis, distri-
bui facilis, & succulentus assumetur. Si uox nondum
redit, & uires permittunt, cucurbitule occipiti cum
scarificatione affigantur. Si fieri possit, etiam hypo-
chondriis. Aegri deinde gestabuntur curru, lectica,
aut lecto pensili. Potus sit hydromeli. Post uigesimu
primum diem, egroti balneo credentur. Sed de reli-
qua curandi ratione in Capite sequenti plura.

De resolutione. Cap. XVII.

Resolutio
quid.

Causę.

I Αῤῥῶσις Gręcę, resolutio latine, est, Gale. lib.
3 de Patientib. lo. Cap. 10. autore, ubi alteru
latus, aut dextrum aut sinistru, sensum & mo-
tum amiserit. Interdum etiam in una duntaxat parte,
manu scilicet, crure, lingua, accidit. Quum uero per
resolutionem interdum sensus duntaxat, interdum mo-
tus, nonnunquam ambo simul pereant (cuius rei cau-
sam reddit Gale. lib. 1. de Symptomatu causis, Cap.
4.) neruorum resolutio potissimum dicitur, ubi mo-
tus deperditus est. Generatur quidem a multis cras-
sis & uiscidis humoribus, neruos obstruentibus, im-
pedientibusq; ne animalis facultas e principe parte
ad membra delabatur. Hac ratione refrigeratio ex ni-
ue, compressio neruorum corporum, resolutione
effi.

efficere possunt. Ad eius passionis notitiam non opus est multis indiciis. si enim motu pars aliq̃ corporis destituitur, resolutione affecta esse nemo non uidet. A qua uero causa factus sit morbus, partim ex egr̃i relatione, partim etiaꝫ ex notis suprà de dolore capitis ex pituitosis humorib. orto cōmemoratis, deprehendere licebit. Viētus ratio in uniuersum attenuatoria fr̃, et siccans. Versetur igitur eger in aēre calido et sicco, primisq; tribus dieb. tenuissimo utat̃ uictus, hoc est omnimoda mediam sustineat, aut solius melicrati exhibitione, aut ptisanę succo paucō contentus sit. Dein cibi boni succi, et concoctu faciles, affiq; exhibendi, auum potissimum carnes montanarum, et perdicū, oua sorbilia, amygdalę, et pineę. Utatur etiam fœniculo, petroselino, hyssopo, maiorana, saluia, et satireia. Vitet pisces, fructus, et omnia frigida et humida. Potus sit modicus, sitimq; quā possunt maximam sustineant. Bibant autem hydromeli, cui saluia aut cinnamomum admixtū sit. Aut utantur potione quę hodie Hippocras nominatur, sic confecta. ℞. Cinnamomi. ʒ. ii. zingiberis. ʒ. s. pipe ris longi, granorum paradisi, acori (galangā uocat Barbari.) añ. ʒ. i. cardamomi. ʒ. i. s. nucis myristicę, gal ryophyllorum, maceris. añ. ʒ. i. Decoquātur in aque fontanę lib. vi. quoad quarta pars, hoc est lib. i. s. fuerit absumpta. Refrigerata colentur et exprimantur, ac sacchari lib. s. dulcescat liquor colatus, et fiat portio. Vino nō utatur, donec morbus ex integro deficiat. aut si fieri uix possit, ut tanto tempore eger uini potione careat, detur qdē, at non nisi modicū, aquo sumq; et in morbi inclinatione. Motus et exercitiuz, si iis uti poterit, summē conferunt. Somnum fugiat diurnū, nocturnus sit mediocris. Gaudeat, et animi perturbationes euitet. Curandi ratio, si iusserit etas habit⁹ corporis, tēpus anni, et similia, a sanguinis missione auspicetur, potissimū si plenitudinis signa af-

Signa.

Viētus

Hippo-
cras.

Curatio.

C. ii fuerint.

fuerint. Oportet tamen ablationem esse moderatam,
 ne corpus refrigeretur, sanguisq; à partibus incolu-
 mioribus auferendus. Quibusdam uero dieb; post
 clyster. sanguinis missionem transactis, aluus primò clyste-
 rib; irritetur, huiusmodi aut similibus. ℞. Maluë, al-
 theë, mercurialis, camomillë, saluë, betonicë, añ. M.
 1. stichadis arabicë. 3. i. rutë, calaminthë, añ. M. s. se.
 fœniculi. 3. iii. Decoquantur in aqua, quoad tertia
 pars absumatur. ℞. Colature lib. i. benediçtë laxati-
 uë. 3. s. electu. Indî. 3. iii. mellis rosacei. 3. s. oleorum
 laurini, irinî, rutacei, añ. 3. i. salis. 3. i. s. misce, fiat ene-
 ma. Dein decocta & syrupos, pituitosos humores ad
 expulsiõnem preparantes, exhibebis, quorum copia
 præpara- suprà Cap. 8. habetur. Preparatis ad eduçtionem hu-
 mo- rum. moribus, quë illos euacuent propinanda medicamë-
 Purgatio ta erunt: qualia sunt, prætesea quë Cap. iam citato
 commemorauimus, pilulë azaiaret, arabicë, foetidæ,
 quibus nunq; non agaricum admiscendum erit. Nō
 autem semel, sed iterum atq; iterum purgandi sunt
 egri, diebus quatuor uel quinq; interpositis. Post
 Capitis purgatio purgationes uero, theriaca & Mithridati antidotus
 utilissima est. Post totius corporis euacuationem,
 sternutamentis, apophlegmatismis, gargarismis, odo-
 ramentis, & aliis Cap. 8. productis utendum. Capitî
 deniq; unde totius morbi radix exoritur, calida me-
 dicamenta illinenda erunt: ut sunt castoriû, peuce-
 dani radix, menta, bacçë lauri, irino oleo, cui parum
 aceti adiectum sit, incocta. Quod si itaq; aëris am-
 bientis frigiditas nō impediât, caput radatur, totûq;
 Discuti- usq; ad frontem inungatur. Ceterum ea etiã quæ
 ti- discutunt medicamenta, iis locis unde nerui ad pa-
 tientem partem sensum aut motum, uel utrunq; de-
 ferentes oriuntur, admouenda erunt, quemadmodû
 Gale. lib. 3. de Affec. lo. Cap. 10. eleganti historia de
 Pausania sophista docet. A leuioribus uero semper
 auspicandum, nempe ab oleo chamemelino, anethi-
 no,

no, de spica, liliaceo, et irino, quibus etiam membra ipsa affecta fouenda sunt, quæ etiam hoc nomine ut calefiant, linteis, aut pelle uulpina, et similib. operienda erunt. Aut cum decocto saluie, maioranæ, chamæmeli, hyperici, stichadis et rosmarini fouenda. Progre diendum deinceps ad ualentiora, oleum costinum, uulpinum, rutaceum, laurinum, de uermibus, de castoreo, de laterib. (quod philosophorum etiã nominant) et de euphorbio. Quibus interdum adiiciuntur unguenta Agrippæ, marciaton, arragon, et alia medicamenta simplicia calida, ut est betonica, saluia, rosmarini flores, radix acori (galangam nominant) uerbasculum odoratum (herbam paralysis uocant) ruta, calamintha, pyrethrum, piper, castoreus, et euphorbium, in hunc aut similem modum. R. Unguentorū arragon, marciaton. añ. 3. i. unguenti Agrippæ. 3. s. oleorum costini, uulpini. añ. 3. v. olei de uermib. 3. s. olei de castoreo. 3. i. s. pulueris betonicæ, piperis, saluie. añ. 3. i. castorei, euphorbii. añ. 3. s. radicis galangæ. 3. ii. cere quod sufficit. fiat unguentum. Vel sic. R. Oleorum costini. 3. ii. de piperibus. 3. i. s. olei de euphorbio. 3. ii. uini sublimati (aquam uite aliàs uocant.) 3. ii. s. succorū saluie, uerbasculi odorati, hoc est herbe paralysis. añ. 3. i. s. radicis galangæ. 3. iii. stichadis arabicæ, florum rosmarini. añ. 3. ii. pyrethri, piperis. añ. 3. i. euphorbii. 3. s. Contundantur contundenda, et omnia simul quoad uinū et succi absumantur, decoquantur. Dein exprimantur olea, et addatur cere quod sufficit, fiat unguentum molle in modum linimenti. Eadem etiam ratione emplastra componi possunt, in eum uel similem modum. R. Baccarum lauri, pyrethri, piperis. añ. 3. ii. galangæ. 3. i. stichadis arabicæ, betonicæ, sambuci. añ. 3. i. s. sinapi, nigellæ. añ. 3. i. euphorbii, castorei. añ. 3. i. olei costini. 3. i. s. de piperibus. 3. i. olei de euphorbio. 3. iii. cum cera et resina quod satis est, fiat emplastrum. Porro membris

Vn guentum.

Aliud unguentum.

Emplastrum.

C iii affe

Cucurbit.
in a.

Balnearum.

affectis cucurbitule sunt applicande, citra tñ scarificationem. Et si cucurbitulis idonea nō fuerint, uincinis imponendę. Post cucurbitulas prædictis unguētis & linimentis, sic tamen ut prius fricentur membra affecta, utendum. Neq; paruum utilitatem præstabit laconicum; & si haberi possunt thermæ sulphuræ, aluminosæ, & saluginosę supra modum cōferent, quales sunt in Germania nostra Badenię, Fering iuxta syluam Martianā, & Cellenses, quas, gestationes in curru, uehiculo, aut lectica pcedere debēt.

De morbo comitali. Cap. XVIII.

Epist. p. fia

Comitalis
morbus.

Causę.

Eπιληψία Græcis dicta est hæc passio, quod nimium sensum capitis, atq; mentem, pariter apprehendat. Comitalis autem, quod hac passione correpti, in comitiis maxime manifestabantur, comitiāq; quo die aliquis concidisset, interrumpebantur. Est autem, Galeno lib. 3. de Patientib. loc. Cap. s. teste, conuulsio omnium corporis partium, non perpetua, sed quę ex temporum accidit interuallis, cum mentis ac sensuum oblesione. Gignitur hæc passio trifariam. Primum, ubi cerebrum primogenia passione patitur. id quod fit, ubi crassus uiscosusq; pituitę uel atre bilis humor spiritus meatum in cerebri uentriculis obstruit, neruorum principio seipsus quatiente, quo excutiat id quod noxium est. A crasso autem humore hanc passionem induci, argumento est, quod & subito fit, & soluitur confestim. Secundo fit per consensum oris uentriculi male affecti, dū scilicet cerebrum excutere nititur, quicquid ad illud à stomacho eleuatur. Sic Galenus lib. s. Cap. s. de Patientib. locis, Grammaticum quendam iuuenē fuisse scribit, qui quoties uel nimis uehementer doceret, aut cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irasceretur, comitali passione corripiebatur: idq; non alia ratione, quàm quod os uentriculi, utpote quod facit

facile sentiebat, pateretur, ac deinde per consensum
 & totum cerebrum, & corpus uniuersum conuulsio-
 ne concutiebatur. Tertio fit, sed raro, cum à parte ali-
 qua ueluti quædam frigida aura sentiente egro ad ce-
 rebrum usq; ascendit. Hoc genus passionis comitia-
 lis, Galenus lib. 3. de Patientib. lo. Cap. 7. scribit se ui-
 disse in puero, qui tertiumdecimum ætatis annū age-
 bat. Cum enim adolescens etiamdum cum optimis
 eius tempestatis medicis conuenisset, ad idoneam in-
 ueniendam curationem, audiuit tum narrante pue-
 ro, affectum ipsum à crure initius capere, mox illinc
 rectà ascendere per femur, & imminentes illi lumbo's
 ac per latera ad ceruicem, donec ad cerebrum perue-
 niret; quod cum primum tangeret, ipsum haudqua-
 quam sibi constare. Præcedit hanc passionem corpo-
 ris animiq; status minime uoluntarius, tristitia, eo-
 rum quæ perceperunt obliuio, turbulente insomnio-
 rum imagines, capitis dolor, eiusq; repletio conti-
 nua, iracundia, pallor faciei, & lingue inordinatus
 motus. Quamprimum inuaserit malum, egri conci-
 dunt, conuellunturq; , stertunt, ac uociferantur in-
 terdum. Nonnulli tremunt, atq; circumaguntur.
 Sed peculiaris admodum morbi nota est oris spuma.
 Non desunt etiam, quibus urina & stercus præter uo-
 luntatem excernitur, nonnullis & genitura. Quibus
 ab ore uentriculi uitium oritur, palpitatio ipsius præ-
 cedit, turbatio & erosio. Ex inedia seu cibo tardius
 assumpto, excandescunt, & affliguntur. Occupat hoc
 passionis genus maxime pueros, eosq; adhuc paru-
 los, quod uidelicet humidior cerebri temperamen-
 to præditi sint: quam ob causam $\pi\alpha\iota\delta\acute{\iota}\mu\acute{o}\varsigma$, hoc est,
 infantilis seu puerilis morbus nominatur. In quibus
 acutissima est passio, statim iugulat, & crebris accessio-
 nibus, & symptomatum uehementia. Plerisq; autem
 longa esse solet. Nam si non pubertate, uel menstru-
 rum initio, uel puerperio solutus fuerit, sepe usq;

C iiii ad

stigma.

Pueri cum
passione
comitiali
corripiantur.

s. aph. 7.

uictus.

ad mortis diem prorogatur, nisi congruam medici-
curatione fuerit affecutus. Ratio uictus utilis est,
quæ incidit, et extenuat. Aëris itaque constitutio, in
quo eger uersetur, sit calida et sicca, potissimum si à
pituitoso oriatur humore. Capparitis esus mirifice p-
dest. Fugere oportet carnes omnes, præter auium mō-
tanarum: legumina, pisces, et uinum, præsertim anti-
quum crassum et copiosum. pro quo bibat hydrome-
li, aut uinum aquosum et dilutum, Exercitia profunt
et frictiones, sed capiti post omnes reliquas corpo-
ris partes adhibite. In balneo mora diuturna obest.

*Curatio
infantis**2. aph. 45*

Deuitet coitum liberaliorem, moderatus autem p-
dest. Somnus sit nocturnus et mediocris, caueat im-
pensè diurnum. Fugiat sinapi, allia, cepas, et eiusmodi,
potum statim à balneo, potissimum uini meracio-
ris. Si infans egrotus fuerit, non admodum medica-
mentorum præfidiis subuenire studebimus. nam æta-
te ad calidiorem siccioremq; statum uergente, et ui-
ctu moderatiore, sua sponte plerumq; morbus fini-
tur, Hippocrate quidem teste, qui sic scriptum reliquit:

Quicumq; iuuenes passione comitiali laborant, mu-
tatione maxime ætatis, et temporum, et locorum, et
uictum quoq; liberantur. Proinde solius nutricis
ratio habenda erit, ac lac illius emendandum, utq;
calidius et subtilius efficiatur conandum. Quapro-
pter nutrix boni succi cibus utatur, ante cibum exer-
ceatur, coitum uitet: à uiri siquidem consuetudine
lac odoris gratiam in deterius mutat, et humidius
efficitur, ac menstrua eliciuntur: et præscripta pau-
lo antè uictus ratione utatur. Capita tamen infan-
tium assidue oleo anethino, et irino inungenda, neq;
unquā uel calida aqua uel frigida lauanda, multo mi-
nus tota immergenda, madefaciendaq;. Dato etia;
ad elingendum mel deispumatum, ac collo suspen-
dito radicem pæoniæ uiridem. Qui post annos pue-
riles in passionem hanc prolabuntur, eorum partes

*Curatio a-
dultorum.*

con

onuulſe ac diſtracte inungi, irrigari, ⁊ in rectum di-
 gi debent. Deinde os aperiendum, cuneusq; denti-
 us interponendus, ac penna oleo irino illita, pitui-
 e extrahendæ gratia, uomitus prouocandus. Odo-
 ramentis etiam ſenſum excitare conuenit, peuced-
 a uidelicet, ruta, ⁊ bitumine. Perſeuerante exacer-
 ratione, medicus audacter ⁊ uiolenter illorum ma-
 illas diſtrahat, infundatq; in os caſtoreum cuꝝ oxy-
 nelite. Clyſterem etiam acrem excitatis iam iniicere
 oportet. Qui conualeſcunt, uiribus antea recreatis,
 uera Galeni, aut ex colocynthide purgandi ſunt.
 Hæc ſanè noui ⁊ acuti morbi comitialis curatio eſt.
 Deinceps quomodo inueterato ſuccurratur, trade-
 mus. Oportet egros diu aquam bibere, atq; initio cu-
 rationis, niſi quid prohibeat, ſanguinem ex uena po-
 plitis mittere. Interpoſitis quatuor aut quinque die-
 bus corpus reficere, ac medicamenta extenuantia p-
 pinare expedit, ſyrupum de abſinthio, de hyſſopo, de
 ſtichade, oxymeli ſcylliticum, decoctum hyſſopi, ra-
 dicis pæoniæ, ⁊ alia quæ ſuprà Cap. 8. commemora-
 uimus. Dein purgantibus medicamentis uacuandi
 ſunt, nempe pilulis cochiis, de agarico, ⁊ ſimilib. lo-
 co iam citato productis: idq; ſi pituitoſo humore
 paſſio orta fuerit, faciendum. Si uero ab atra bile cœ-
 perit, ea quæ humorem hunc uacuare poſſunt exhi-
 benda, quæ in Cap. de Melancholia reſenſebūtur.
 Vbi latis purgatus eſt æger, ad balneum ducendus.
 Tertio die hypochondriis ⁊ ſcapulis cucurbitulæ
 cū ſcarificatione affigendæ ſunt, tum quibuſdam die-
 bus corpori reficiendo interpoſitis, rursus hiera Ga-
 leni purgandus erit. Poſtea capiti ⁊ occipitio cucur-
 bitulæ adinouendæ. Sequenti die panis in mulla co-
 ctus, additis amygdalis amaris, aut ſerpyllo, aut cala-
 mintha, aut menta, aut ruta, cataplaſmatis inſtar ca-
 piti applicandus. Atq; id tribus diebus efficies. Mox
 caput deraſis capillis, peucedani ſucco in aceto dilu-
 to,

Curatio
 comitialis
 inueterati

Prepara-
 tio.

*Discutienda medica-
menta.*

*Curatio
epilepsie
ex stomachi
vicio.*

*Si a particula
cuiusdam
oritur mor-
bus.*

*Incubus
quid.
Causa.*

to, in quo serpyllum, aut iris incocta sit, perungen-
dus. Rursus in ierea corpore recreato, purgandus e-
ger erit. Quo peracto, sternutatoria, apophlegmatif-
mos, et ea que per nares purgant adhibebis. Tempore
interposito, si necesse uidebitur, clystere alius eluer-
da erit. Tandem unguenta, linimenta, et emplastra,
quibus discutiendi uis inest, applicanda: quorum in
precedenti Cap. mentio facta est. Quedam denique
sunt medicamenta, que nature quadam proprietate
comitiali morbo aduersantur: ut est radix pœoniæ,
uisus quercinus, cornu ceruinum, ossa humana co-
busta, et alia multa que recensentur à recentioribus.
Si uero ob passionem primariæ stomachi passio cõ-
mitialis contingat, sollicitudo habenda est, ut eger p-
be concoquat. Panis igitur diligenter confectus, ex
uino antiquo tenui et albo, cum aliquo eorum que
leniter adstringunt temperato, circa horam tertiam
diei assumendus. Item hieram picram bis ternè singu-
lis annis dare expedit, ut copiosè cum de stomachi
morbis agetur, dicemus. Vbi autem ex particula qua-
dam hæc passio inuadere percipitur, siue ea manus, si-
ue pes fuerit, fune excipiendi debet que superposita
est. Cum remittit, peracta totius corporis inanitiõe,
prius inunctionib. exal facere corpus oportet. Dein
de medicamenta q̄ rarefaciunt, et malam temperaturã
partis, unde malus oritur, emendant, apponenda. Suc-
cedente etiam tempore sinapismis locus irritandus
erit. Post q̄ theriaca, et nãlia balnea locũ obtinent.

De incubo.

Cap. XIX.

Eπιάτης Græcis passio, quam Latini incubum et
incubones nominant, ubi aliquis noctu se grã-
di mole opprimi, inuadiq; ab alio credit. Fit
id uitii ex crapula, et continua uentriculi cruditate,
unde uapores crassi et frigidi eleuati, cerebri uentri-
culos replent, prohibentes facultates cerebri per ner-
uos

os diffundi. Comitatur eo detentos difficilis mor-
 is, torpidus in somno sensus, suffocationis imagi-
 natio, et ueluti ingruentis alicuius occupatio. Ad-
 ge uox suppressa, aut incerta indiscretaque editur.
 Quidam ita in anib. imaginibus afficiuntur, ut in se
 rassatos audire credant. Cum plurima tandem an-
 ietate attenuato spiritu et discusso, atque apertis me-
 mbus, repente excitantur. Occurrendum igitur huic
 malo per initia. Nam perseverans, et assidue inuadens
 rarius aliquod malum, ut apoplexiam, morbum
 comitalem, aut maniam preñunciat ac inducit, cras-
 so humore in uentriculis cerebri sensim collecto.
 Viſtus itaque sit tenuis, et qui flatus minime generet.
 Vino non utatur, nisi aquoso. Somnum fugiat diur-
 num, nec statim a comestione cubitum eat: atque ut sum-
 natim dicam, totus victus talis sit, qualis est eorum
 qui comitali morbo laborant. Curandi ratio, si
 plenitudo fuerit, totius corporis a sanguinis detra-
 ctione auspicianda. Cubiti autem uena exterior se-
 ctanda est. Sin cacochymia affuerit, purgationibus
 corpus uacuandum. Si tamen pituita redundet, humores
 extenuantibus medicamentis ad purgationem prepa-
 randi sunt. Purgato corpore localia adhibere medi-
 camenta oportet, ut in precedentibus monstratum est. Suc-
 currit eisdeque semen peronie nigrum. Danda uero sunt
 potui grana quindecim, trita ex aqua. Caput et fo-
 uendum anethino oleo calido, et pileo tegendum, dum
 cubitum eunt. Intra corpus exhibenda, que caput cor-
 roborant: aromaticum rosaceum, diamoschi dulcis co-
 sectio, plirisarcoticon, diabre, diathos, et eiusmodi.

De melancholia. Cap. XX.

Melancholia mentis est alienatio, seu desipien-
 tia, sine febre. Fit interdum quidem uniuersa
 in uenis sanguine melancholico effecto, ob
 commune sane uitium, cerebro quoque ipso simul lesa.

Nonnulli

Signa

Viſtus.

Curatio.

Localia.

Melancholia quid.
Causa.

Nonnunquam uero, quando reliqui corporis sanguis prorsus innocuus est, solus autem is qui in cerebro contentus est, alteratur. Idq; bifariam cōtingit. Aut enī aliunde in ipsuz deriuatur, aut in ipso melgenita est, quum uidelicet internus calor aut flauabilem, aut crassum atrumq; sanguinem superassauit. Interdum etiam ob inflammata & male affecta circa uentriculum hypochondria prouenit, quę modo auram quandam maligniorem, modo substantiæ humoris partem ad cerebrum sursum transmittunt.

Quemadmodum enim aliqui frequenter eleuata a uentriculo fuliginosa quadam aut fumosa exhalatione, aut omnino crasso uapore quidpiam suffusio ni simile præ oculis obici sentiūt: sic ascendente ad cerebrum melancholica exhalatione, tanquam fuligine aut fumo, melancholica symptomata circa mentem accidunt. Atq; adeo tres sunt in uniuersum melancholię species. Vna, quando totum corpus melancholico sanguine abundat. Altera, quando idem cerebrum ipsum solum occupat. Tertia, quando hypochondria ipsa primo male affecta, in consensum cerebri ducunt: & hæc melancholię species hypochondriaca & flatuosa dicitur. Communia omnium, iuxta hoc Hippocraticum: Si timor atq; mœsticia longo tempore habentes perseuerent, ex eo atra bilis significatur. Item alii se credunt animalia bruta esse, & uoces ipsorum imitantur. Sic Galen. lib. 3. Cap. 5. de Patientib. loc. scribit fuisse quendam, qui se gallum esse putauit: ideoq; gallos cantare audiens, ut hi alarum, sic ille brachiorum plausu latera quatiens, gallo-
rum sonum imitatus est. Alii uasa fictilia & testas se esse arbitrantur, atq; idcirco obuiatib. ne collidantur cedunt. Hi mortem expetunt, illi eandem expauescunt. Nonnulli semper rident, Democritumq; agūt: aliqui Heraclitum, semper plorantes. Alii putant se numine affatos esse, & uaticinantur futura. Peculiariora

Tres melancholię species aut differentię.
Signa cōmunia.
6. aph. 23
Melancholicorum uarię imaginēs.

Signa Peculiariora

res.

autem notę illorum he sunt Qui ex totius corporis consensu melancholia laborat, iis gracilis corporis habitus niger, hirsutus, et ex toto melancholicus, uel natura, uel ex acquisito per sollicitudines quęcumque, aut uigilias, aut prauorum ciborum esus, aut heroidum, aut menstruorum suppressionem. At qui hypochondriis uitium contraxerunt, eos sanę cruditates, acidi ructus, ardor, hypochondriorum grauitas arguunt, hypochondria quoque sursum conuelluntur, et nonnunquam inflammatione conflictantur, idque potissimum circa mali exordium. Deinde ubi ipsum accreuerit, atque bilis comitantur symptomata, quę utique concoctione, uel excretionem, uel multis flatibus, uel uomitu, uel ructu leuantur. Quorum uero nullum ex iis, aut certe pauca circa uentriculum ueniunt, melancholica quę apparent signa cerebrum per se et primaria passione uexari, atqueque bilis humoris affici declarant. Hi autem inter cetera, unam aliquam fixis ac intentis in eam prorsus oculis, diutius intuentur. *Viſtus.* Viſtus ratio talis fit, quę atram bilem mīnime procreet; quapropter in aere uersetur calido et humido. Cibis uescatur boni succi, humidis et temperatis, pane in clibano cocto ac probè cōfecto, carnibus caponum, gallinarum, perdicum, phasianorum, piscibus saxatilibus, et eiusmodi. Vitet cibos qui melancholicum efficiunt humorem, quos diffusè Galen. lib. 3. de Patientibus. lo. Cap. 6. commemorat. Vinum bibat tenue, album, neque ualde antiquum: crassius uero et nigrum uitet. Exercitium sit mediocre, equitatio aut deambulatio per loca amœna et uiridia, aut nauigatio. Balneo aque dulcis, quo se uno presidio cum uictu humido, Galenus morbum hunc, ubi nondum in longum esset protractus, curasse scribit, frequenter utatur. Somnus huius supra modum confert, ueluti etiam coitus, ad moderatus. Gaudeat et letetur, in hocque habeat qui cantu aut aliis musicis instru-

Curatio. strumentis hilaritatem excitent. Vbi uniuersum corpus sanguine melancholico abundauerit, curandi rationem à uenę sectione auspicari oportet. Secunda autem est, Galeno loco iam citato teste, cubiti uena: precipue autem media, quę scilicet communis est et ei quę humeraria nominatur, et ei quę per axillam ad manum fertur, iecoriaq; dicitur. Vbi uero solum cerebrum sanguinem melancholicum cōtinet, et ger sanguinis detractione non indiget, nisi forte multum sanguinis sit, ac pręseruationis gratia uenā incidamus. Quum itaq; ex primaria cerebri passiōe melancholici efficiuntur, frequentibus balneis, uisitu boni succi, et humido, et minime flatuoso, unā cū decenti animi delectatione, sine alio potentiori remedio curandi sunt: cum humor qui molestat, nondum ob temporis longitudinem ut excernatur contumax est. Si enim malum aliquandiu durauerit, tū ualentiora magisq; uaria medicamēta adhibere oportet. Siue igitur ex totius corporis consortio, facta prius, ut diximus, sanguinis detractione: siue solius cerebri primario affectu melancholia orta fuerit, medicamenta quę per inferna purgāt exhibere oportet. Interpositis tamen aliquot à uenę sectione diebus, hoc decoctum in aurora bibat, quod. ℞. Floru; boraginis, buglossę, uiolearum. añ. M. i. passularum mundatarum. ʒ. i. hemionitidos (scolopendriam uocant.) M. i. fumiterre. M. s. corticum radicum cum capparum, tamaricis. añ. ʒ. iii. radicum fœniculi, petroselini, glycyrrhizę. añ. ʒ. i. thymi, epithymi. añ. ʒ. s. Decoquantur singula in libr. iii. aque, donec tertia pars absumatur, dein colentur, atq; saccharo sufficienti dulcescat colatura, et adiiciantur syrupi de fumoterre, syrupi de epithymo. añ. ʒ. ii. et fiat potio. In eundem usum hodie exhibent syrupum uiolaceum, de buglossa, adiectis aquis scolopendrię, lupi salictarii, intybi domestici (endiuiam appellant) et buglossi.

decoctum
pręparans.

buglosi. Ego tamen aquarum distillatarum et ignis con-
 sertio expressarum usum, uentriculo potissimum,
 noxium esse arbitror. atque adeo multo consultius esse
 tuto, ut predictarum herbarum decoctis utamur, ac
 syrups in hunc modum ammisceamus. R. Syrupi de
 bugloso. 3. i. Syrupi de epithymo. 3. s. Decocti scolo-
 dendrie, fumiterre et endiuie. 3. iii. misce, fiat potio.
 Post hec corpus purgetur eclegmate hamech appel-
 lato, et diasene: catapotis Indis, de lapide armeno, et
 similib. Proderit autem hoc decocto purgante uti.
 R. Florum buglosi (boraginem hodie appellant) flo-
 rum uolarum et rosarum. añ. M. i. passularum mun-
 datarum, tamarindorum. añ. 3. i. myrobalanorum, ce-
 ruleorum (indos uocant) luteorum (citrinos nominat)
 empeliticorum, beletzicorum. añ. 3. s. folliculorum sen-
 polypodii. añ. 3. vi. prunorum damascenorum nume-
 ro. x. Coquantur in aqua sufficienti, ad tertias. Dein
 coletur, et saccharo dulcescat colatura, et de ea exhi-
 beantur. 3. iii. In quibus si non satis purget, licebit
 dissoluere. 3. ii. eclegmatis diasene. Mirifice etiam co-
 fert dilutum epithymi, in eum modum compositum.
 R. Epithymi. 3. s. maceretur in. 3. iii. feri caprini, ho-
 ris. 24. dein ualide exprimatur et coletur, atque in auro-
 ra propinetur. Et hoc, quod. R. Foliorum sen- 3. ii.
 prunorum damascenorum numero. xii. Contundan-
 tur et macerentur in sero caprino horis uiginti qua-
 tuor, deinde exprimantur et colentur, ut supra. Lice-
 bit et hoc puluere uti, qui. R. epithymi. 3. s. lapidis ar-
 menii, agarici. añ. 3. ii. scamonie preparate. 3. i. gario-
 phyllorum numero. xx. Redigantur singula in pulue-
 rem, et detur singulis septimanis. 3. i. uel. 3. i. s. Neque
 temere etiam quis a purgatione interiectis quibusdam
 diebus clysteribus utetur, ut quod a capite auertere pos-
 sint. R. Fumiterre, lupi salictarii, thymi. añ. M. i. epi-
 thymi. M. s. sen- polypodii. añ. 3. vi. cartami. 3. s. semi-
 num anisi, feniculi, ammi, cumini. añ. 3. ii. Coquan-
 tur

decoctum
purgans.

Dilutum e
pithymi.

Dilutum
foliorum
senæ.

Puluis.

Clyster.

tur usq; ad tertias. ℞. Colaturę lib. i. Casie fistularis recens extractę. ʒ. i. eclegmatis diaseng. ʒ. s. oleorum uiolacei, camomillę. añ. ʒ. i. s. salis communis, ʒ. i. s. misce, fiat clyster. Porro si hæmorrhoidibus aut mē-
 sibus suppressis malum fuerit concitatum, horum quoq; purgationem moliemur, Hippocrate sic præ-
 cipiente. ait enim: Atra bile uexatis, hæmorrhoides
 superuenientes bonum. Et rursum: Insanientib; si ua-
 rices uel hæmorrhoides superuenerint, insanie solu-
 tio. Ceterum danda etiam sunt medicamenta quę
 leticiam pariunt, atq; uires reficiunt: ut sunt conser-
 uę buglossi seu boraginis, intybi domestici, uiolarū,
 letificans Galeni uocatum, dianthos, et similia. Nul-
 la deniq; ratioe, ut antea quoq; monuimus, balneo-
 rum dulcis aque usus negligendus. Embrochę etiā,
 quę caput humectare possunt, adhibeantur. ℞. Mal-
 uę, althę, uiolarum, añ. M. i. s. camomillę, stichadis
 arabicę. añ. M. i. florum nymphę. M. s. se. lactuę. ʒ. i.
 Buliant in aqua sufficienti, et fiat embrocha, quę ra-
 so capiti admoueat. In hunc etiam usum conue-
 nient inunctiones ex oleo uiolaceo, nymphę, et si-
 milibus. Studiose deniq; annitendum, ut imagina-
 tiones peruersę et immensa mœsticia, quacunq; fieri
 potest ratione propulsentur. In hunc sanè modum
 Alexander Trallianus lib. i. Cap. 22. mulierem quan-
 dam sanitati restituit: quę melancholię malo corre-
 pta, inter dormiendum anguem se deglutisse puta-
 bat. Ciens enim ei uomitum, anguem extinctum pel-
 uī, qua uomitionem excipiebat, clandestine inseruit:
 quę simulatq; conspexisset melancholica, euomui-
 se rata, omnem suspicionez fallamposuit, et salua eua-
 sit. Pręterea si ob hypochondriorum offensionem
 passio constiterit, et horum habenda sollicitudo erit.
 Fouebuntur itaque rutę, anethi, absinthii, pulegii,
 agni seminis, baccarum lauri, et similium decocto.
 Hęc etenim dolores quoq; leniunt, et discutiunt fla-
 rus,

us, potissimum si oleo incocta affectę parti cataplas-
matis instar applicantur. Pręter hęc tamen cataplas-
matis insint etiam ea, quę flatibus discutiendis con-
ducunt, nempe apium, anisum, cuminum, uel ligusti-
cum: leuisticum uocant. Cum hęc admoues, longo
tempore per diem et pasto et ieiuno adherere fines.
Vbi ademeris, aliud quoddam operimentum super
accommodato, lanam scilicet latiore. Cucurbitu-
lis etiam ad flatibus digerendos leuib. hoc est, citra sca-
rificationem utitor. Videbitur enim cibi pręsidium
hoc, Galeno lib. 12. Ther. meth. authore, in huiusmo-
di affectu incantamenti cuiuspiam simile quid effice-
re. Illico enim cucurbita admota, qui spiritu flatuo-
so cruciantur, tum à dolore liberi, tum omnino sa-
ni redduntur. Porro ad dolores inflammationesq;
cum scarificatione. Quibus uitium inueterauerit, p-
sentissimum est remedium per uomitum purgatio.
Non tamen ualidis uomitoriis utendum: talia eni-
infecta sunt, stomachoq; anxietatem afferunt. Con-
citetur igitur uomitus cum aqua tepida, cui oxyme-
li sit admixtum. Quod si tamē neq; hoc modo pos-
sunt euomere egri, digitos aut pennas demittendo
irritare oportet. Proderit autem iis unicē uomitus,
qui per elleborum album fit, in hunc modum. ℞. El-
lebori albi. 3. i. Concidatur in minutas particulas, et
raphano satis magno indatur. Transactis trib. die-
bus iterum eximatur, raphanusq; fortiter exprima-
tur. dein accipe succi ex raphano expressi. 3. vi. aque
calide. 3. iiii. oxymelitis. 3. i. et totum calidum ægro
propinato. Vel in hunc, qui. ℞. Ellebori albi optimi
3. iiii. et raphano prius perforato inserantur infigan-
turuē, ac ibi noctem unam integram dimittantur.
Postridie ubi in raphanum uires ellebori migraue-
rint, amoto elleboro raphanus in minutas ptes dis-
sectus, in oxymelite exhibeatur, diligenter cauendo,
ne ellebori quidpiam in raphano relinquatur.

Vomitus
ut conci-
tandus.

D De

conuulsio
quid.

Σπασμὸς Græcè, conuulsio Latine, est, ubi ner-
ui atq; musculi præter uoluntatem conuellū-
tur, in eamq; dispositionem ueniunt, quam et
in motibus secundum arbitriū factis assumpserūt.

Vel breuius, ut definit Galen. lib. 2. de Symp. causis
Cap. 2. conuulsio est, quæ neruos musculosq; ad eun-
dem cogit affectum, in quem ab animali facultate,
quum naturalem habitū seruarent, ducebant. Eius

Τ: τανος

autem tres sunt species. Τέτανος, quum ceruix unā cū
reliquo corpore immobilis manet, et in neutram par-
tem inflectitur, sed iuxta in utramq; partem recta in-
tenditur, Latini uocant distentionem, Celsus rigo-

Ε: μπρο-
σθός τε-
νος.

ρε. Εμπροσθός τανος, quum caput, ceruix, reliquūq; cor-
pus in pectus contrahitur: Latine tensio ad anterio-
ra dici potest. Οπισθός τανος, quādo caput in scapulas

Οπισθός
τανος.

conuellitur: Latinis tētio ad posteriora appellari po-
test. Hippocrates conuulsionis duas duntaxat esse

Causæ.

causas statuit, repletionem nimirum, et inanitionem

6. aph. 39

neruorum corporum. Sicuti enī in exterioribus
uidemus lora et chordas extendi, ubi aut multa ma-

dent humiditate, aut uehementius exiccantur: sic et
in corporibus animalium, par est non raro fieri con-

uulsionem. Animaduertendum autē, hic Hippocra-
tem loqui de conuulsione ea quæ primo fit, aut, ut

Conuul-
sio per cō-
sensum.

apertius dicam, quæ propria passio est. Fit enim con-
uulsio etiam per conueniū, quum scilicet aliquid

à parte primò patiente ad cerebrum ipsum effertur,
quod ut à se expellat huiusmodi motu cōcutitur.

Spasmus
non pro-
portionas-
tus ad ma-
teriā.

Iuniores medici barbaram sectantes medicinā, spā-
smum non proportionatum ad materiam nomināt:

quia scilicet non accidat ob materiam, quæ implere
aut inanire partes neruofas possit, sed à qualitate q̄-

dam, alteratis per continuationem partibus, aut sub-
stantia, uel spiritali ueluti aura uel fluida ad neruo-

rum

um principium delata, sicut contingit in iis qui à
 corpione aut alia fera uenenata iēti sunt. Quando
 aliquem sanum repente, Galeno. 2. Apho. com. 26. re
 te, aut non multo postea à morbi initio conuulsio
 corripit, à repletionē fieri necesse est. Vbi uero post
 plurimos sudores, aut uomitum, aut deiectiones al
 ii, aut sanguinis eruptiones, aut uigilias, aut famem,
 aut motus tum multos tum uehementes subsequi
 tur, inanitiō in causa est. Conuulsio per consensum
 facile ex egri relatione dignoscitur. Viētus ratio
 in conuulsione quę sit à repletionē, eadem est huic
 quę in resolutionē, calida nempe et sicca. In ea uero
 quę ab inanitionē sit, humida sit oportet. Nutriendi
 enim sunt sorbitionibus et iuribus pinguibus, et car
 nibus concoctu facilib. et probē nutrientibus. Vino
 utantur tenui et aquoso, quod facile per omnia cor
 poris membra distribuitur: nisi febris affuerit. tunc
 enim ptisanę cremor utilis erit. Somnus etiam accer
 sendus erit. et uictus in uniuersum talis sit, qualis est
 eorum qui hēctica laborant febrī. Curatio conuul
 sionis à repletionē ortę, à sanguinis missione auspi
 canda, modō nihil adsit quod eandem fieri prohi
 beat. Liberaliter autem sanguinē auferre conuenit,
 modō non confertim id fiat, sed pluribus uicibus.
 Detrahendus autem sanguis ex cubiti uena mediā.
 Dein clysteri acri, si ita uisum fuerit, alius eluenda.
 Partes autem quę conuelluntur, ualenter continen
 dę sunt, et inordinatis motibus resistendum. Oleo
 quoq; rutaceo aut irino, aut alio quodam ex hoc
 genere perfricandę: aut lanis oleis eiusmodi imbu
 tis contegendę. Vel uescicam latam calido oleo re
 pletā, supponere oportet. Si uero à pituitosis hu
 moribus conuulsio euenerit, ii primum omnium
 extenuandi et incidendi, utq; idonei sint ad expul
 sionem præparandi: præparati, medicamentis in
 Capitibus de Resolutionē et morbo comitiali di

D ii Etis

Signa

Victus

Curatio
conuulsio
nis a reple
tione.

Etis euacuandi. Cucurbitulas etiam cum scarificatione adinouere prodest: leues enim lædunt. si quidem crura contrahantur, coxis, et postremæ uertebrae: si manus conuellantur, dorso, et primæ ipsius uertebrae, tum ei quæ humeros superiacet. Caput præterea apophlegmatissimis, gargarissimis, et similibus medicamentis purgandum. Procedente tempore balneo uti confert. Singulis itaq; diebus bis aut ter in

Balneum.

aquas sulphureas, uel aluminosas, uel salsas descendat: non tamen diutius, ne uires conuellant, immoretur. Aut si thermarum nullus usus esse poterit, laconico uti licebit, aut aqua cui iuncta sint folia lauri, abrotonum, pulegium, absinthium, ruta, salvia, hypericon, maiorana, et betonica. Conuulsæ quoque partes pellibus luporum et uulpium uestiantur. Inunctiones deniq; quæ in Cap. de Resolutione dictæ sunt, adhibere conuenit. Frigidæ superfusione, cuius

S. aph. 21

Hippocrates meminit, cum sit periculosa, non facile uti licebit, nisi singula quæ ab illo requiruntur adsint. Cæterum calida medicamenta, ut est theriaca, antidotus mithridati, deglutienda erunt. Omnium tñ securissimum et optimum est castoreum dilutum, ad cochlearis parui mensuram, hoc est drachmā unā.

*Conuulsio
ex inanitione
et siccitate
curatio*

Conuulsio, quæ ex inanitione et siccitate fit, maximum sanè malum est, et propemodum insanabile. Eos autem qui sic conuelluntur oleo, uel hydrelæo calido fouere opz. Ad lauacrum etiam deducere oz, temperatoq; folio uti, cum oleo et frictione lenissima. Et in uniuersum ferè curentur ut, hectica correpti.

*Curatio
conuulsio
n'a a consensu.*

Curatio conuulsionis ab ictu ferè uenenatæ, eadem est cum ea quæ adhibetur iis qui à cane rabido morsi sunt. Annitendum enim ut uenenum extrahatur, uulnus latius efficiendo, locumq; totum in circuitu scarificando, superimpositis cucurbitulis. Confert et marrubii et anagallidis folia illinere. Theriaca etiam cum rosaceo diluta, et ulceri apposita, eo quod

quod uenenum in profundo attrahat atq; euacuet: hæc enim alexiteriorum, teste Galeno lib. 5. de Sim- pli. medi. facul. Cap. 17. actio est. ut hinc toto coelo errare Gentiles, et qui hunc sequuntur, constet, quos theriacam admotam uenenum magis intrò et in pro- fundum pellere garriunt.

De tremore. Cap. XXII.

Tρῶμος Græcis, tremor Latinis dicitur: et est pas- sio, quæ duobus perficitur motibus. uno, dum cogitur membrum ob morbum atq; grauita- tem, ad inferiora repere: altero, dum sursum à facul- tate fertur. Eius origo cõmuniter ex neruorũ imbe- cillitate est. Priuatim uero, frigidius naturæ tempera- mentum frigide potio, et præsertim in febrib. intẽpe- stiue assumpta, frigidi, crassi, et lentĩ succi, uini multi meracioris usus, senectus, timor. Signa quibus cau- se dignoscuntur nulla sunt necessaria, quod partim ex egro, partim etiam ex iis quæ suprà dicta sunt de- prehendi queant. Viæ ratio sic instituatur, ut cau- sis plane contraria sit. Cibus uero diductu facilis offeratur, et boni succi, primum sorbilis, mox uolati- lium et piscium molli carne prædiorum. Si autem crassorum uiscosorumq; succorum copia fuerit, uti conuenit iis quæ incidunt extenuantq;. Vitent in uniuersum omnia quæ neruos offendere possunt, uini potionem, potissimum meracioris. Bibant dilutũ et aquosum, aut hydromeli. Qui ex erroribus com- missis manifeste tremunt, à noxiis deinceps absti- neant. Qui igitur ex uini potu tremunt, siis uinum circuncidendum est, quoad in totum morbo fue- rint liberati. Bibant interea hydromeli, cuj decocto saluie aut betonicæ. Si à frigidis et crassis humori- bus tremor accidit, curandi ratio eadem erit adhibẽ- da quæ resolutioni et conuulsioni à repletionem facte sanguinis duntaxat missione excepta. Extremæ au-

Causa.

Signa.

Viæ ratio.

Curatio.

D iii rem

tem corporis partes oleis calefacientib. præuncte, lenis mollibus cōtegantur, Dein cucurbitulę citra scarificationem à priori uertebra usq; ad spinam lumbosq; affigantur, ut scilicet crassi & lēti humores uertebularum foramina obstruentes, ad cutis superficiez trahantur, atq; adeo subinde facilius discutiantur. Proderit et, ut eger quotidie piperis grana. qnq; ex mulsi cyatho, hoc est. 3. i. s. sumat. Simplicia quoq; hæc præsumpta trementes adiuuant, castoreum, leporis cerebrum comestum, altheę radice decoctum, & eupatorii. Quid multa? medicamentis, unctionibus præsertim, ad resolutionem conscriptis utendus est.

De destillatione.

Cap. XXIII.

Destilla-
tio quid.

κἀτὰ
ρῆσιν.

κρίσις.
βρογχίτις.

Causæ.

Signa.

Destillationem hoc loco communiter accipere oportet, ut sub se complectatur omnes ex capite in subiectas partes defluxus. Huius autē tria sunt genera: quorum primum est κἀτὰ ρῆσιν, qui destillatio propriè Latinis dicitur. Fit, Galen. lib. 3. de Simp. caus. teste, ubi ad os ac fauces humor delabitur. Alterus κρίσις Græcis, Latinis grauedo appellatur: fit, dum ad nares decumbit humor. Tertiū βρογχίτις Latinis rauedo uocatur: accidit, ubi ad asperam arteriam humor destillat. Ob uarias causas accidere solet. Vel enim calor ambientis qui in cerebro sunt humores dissoluens, uel eiusdem frigiditas eosdem constringens, ut iis potissimū qui aperto capite balneum egrediuntur accidere solet, destillationez cōciliat. Frigida etiā cerebri intemperies, quę cur eius alimentum non probè concoquatur, & calida, quę aliunde ut trahantur ad ipsum humores efficiunt, destillationem procreare possunt. Causę extrinsecę facile de egrotorum sermonibus agnoscī possunt. Qui ex calore destillatione corripitur, his particulę incalescunt, acris tenuisq; humor destillat tum per nares, tum per os, facies rubescit & nasus. Hos etiā ut
plu.

plurimum febris comitatur. Qui ex frigore, iis caput undiq; & frons distenditur, meatusq; (quos ethmoides nominant) clauduntur, ita ut ne uox dorsum per nares transire queat. Pituita & crassus humor è naribus stillat. Fugiant aërem impensè calidum & frigidum, præsertim à balneo, uentos austrinos & aquilonios, laconicum, & omnia quæ dissoluere humores in cerebro possunt. Utantur cibis concoctu facilibus & boni succi. deuinent eos qui uaporum copiam ad cerebrum transmittunt, cepe, allia, sinapi, raphanum, & odoramenta supra modum casida. In cona minus quàm in prandio comedant. Potus sit hydromeli, aut decoctum hordei uel cinnamomi. Fugien-

Si calidus humor.

Auerho.

D iiii strum

Vetus.

Contracto.

Si calidus humor.

Auerho.

Si frigidus humor

Sacculus.

*Destillatio-
nem re-
primentia*

*Pastilli
pro suffl-
tu.*

strum quoq; ex terra sigillata, aut bolo armenio & plantaginis succo cōfectum, raso capiti imponatur. Si uero frigidus humor sit qui à capite destillet, per ea quę pituitam purgant corpus uacuabis. In quem usum non parum proderit ualidi clysteris iniectio. Quo peracto, à capite auertere atq; retrahere humores conueniet. Dein ubi materia cōcocta fuerit, apophlegmatismis, gargarismis, & similib. medicamentis caput purgandum. Sacculi etiam capiti admouendi sunt, hunc in modum confecti. ℞. Florum chamemeli, meliloti, stichadis arabicę, foliorum lauri, pulegii, origani. añ. M. s. cinnamomi, gariophyllorum. añ. 3. s. maceris. 3. ii. nucis myristicę, galliæ moschatę. añ. 3. i. Terantur omnia, & fiat sacculus capitalis, qui suture coronali imponatur. Confert etiam caput oleis calidis, irino, anethino, & rutaceo perungere. Destillationem uero reprimunt omnia quibus exiccandi inest facultas: potissimum uero nigella, aut cuminū deustum panniculo inditum & illigatum, præsens auxilium affert. In hunc usum suffimenta adhibere oꝝ, sic cōposita. ℞. Thuris, mastichis. añ. 3. i. ligni aloës. 3. i. cinnamomi, gariophyllorum. añ. 3. s. galliæ moschatę. 3. ii. foliorum lauri, santalorum luteorum. añ. 3. s. moschi, ambar. añ. gr. i. Terantur singula, & cum styrace liquido quod satis est formetur pastilli, quorum unus prunis inseratur. Aliud. ℞. Saluię, maioranę, rosmarini. añ. 3. i. maceris, gariophyllorum, cinnamomi. añ. 3. ii. ligni aloës, thuris. añ. 3. i. misce, fiat puluis, qui carbonibus ignitis iniiciatur.

De lippitudine, siue cphibalmia. Cap. XXIII.

Lippitudo quid.

Oφθαλμία Latinis lippitudo dicitur, est inflammatio tunice uel membranę adnatę, quaz cōiunctiuam hodie uocant. Adnata autem dicta propterea, quod aliis quę oculum ipsum constituunt tunicis forinsecus adnata sit, ligamentum existens toti

toti oculo ad circumiacentia ossa: ideoq; ambientes
 oculorum partes usq; ad malas nonnunquam in ue-
 hementiori lippitudine simul attolluntur. Fit uel
 ex plenitudine uniuersuz corpus aggrauate, ob qua
 adnata etiam humoribus referta tenditur. Vel ab in-
 fluentium acrimonia, uehementer erodente: uel pro-
 pter aliquam crassorum humorum, aut spirituum fla-
 tulentorum intensiorem. Dignoscitur, quando ad-
 nata oculi membrana, quæ natura alba est, ob san-
 guinis confluxum rubea esse uidetur, & ex oculis la-
 chrymæ resudant, atq; in maioribus oculi angulis
 sordes quedam colliguntur. Locus in quo decum-
 bit eger, obscurus & tenebrosus sit, & pro causæ di-
 ueritate aut frigidus aut calidus. Si in propatulum
 egreditur eger, panniculo atro aut uiridi oculos ob-
 ducat. Tenui utatur uictu, & cibo parciore. deuitet
 carniū lactisq; esum. Vino haud utatur, præsertim
 inter initia. Bibat itaq; decoctum cinnamomi, aut
 hordei, donec uigor prætereat. Quod si tamen crassi
 humores tensionem procrearent, hydromeli aut ui-
 num tenue & aquosum bibere conueniret. Exercita-
 ri haud prodest, sed quiescere & dormire. Perturba-
 tiones animi procul absint. Si ex plenitudine cōtra-
 cta fuerit inflammatio, id quod dignoscitur si cum
 ingenti dolore oculos affligente plurima tensio, ru-
 bedo, renitentia, & calor affuerit, feruidarūq; lachry-
 marum copia defluerit, à sanguinis missione curan-
 di ratio auspicanda erit. Venam autem secare oportet
 cubiti superiorem, quam humeralez uocant, atq;
 eam potissimum quæ è directo est. Et si uehemens sit
 inflammatio, ad animi deliquium usq; sanguinem
 auferre conueniet. Si uero à rodentibus, aut crassis
 humoribus lippitudo orta fuerit, id quod lachry-
 mæ tenues, salis, acres, calideq; aut contrariæ mon-
 strabunt, atq; adeo totum corpus cacochymum fue-
 rit, prauisq; humorib; abundauerit, quæ noxios hu-
 mores

Causæ

Signa

Victus

Curatio

*Adstringē
tia & reprimē
mentia.*

*Lenitiui hu
mores.*

*Emplastica & stu
pefacientia non te
mere adhi
benda.*

mores uacuare & purgare possunt medicamenta pro
pinanda, quę certe pro redundantium ac infestantium
humorum uarietate immutanda ueniunt. Corpore
inanito, humorum impetus qui ad oculos fertur, de
orsum, & alias corporis partes ignobiliores frictio
nib. infernarum partium, ligaturis artuum, & cucur
bitulis reuellendus erit. Posthęc adhibenda sunt me
dicamenta repellentia, quę non exasperent, hoc est
non uehementem sortita sint adstrictiones; sed quę
tum propria sua substantia sint moderatiora, tuz le
nitiui liquoris ammixtiōe adhuc magis talia fiant.
Lenitiui autem humores sunt potissimum, Galeno
lib. 13. Ther. meth. Cap. ult. teste, oui candidum, & fœ
nigręci decoctum, & ad hęc amplius ipsum lac. In
quo prouidum esse conuenit, ut iuuenulę simulq;
boni succi fœming existat, uberibus ipsius in cotem
in qua collyrium teritur expressis, quo calidum ad
huc oculis infundatur. Hoc autem precipue in uehe
menti dolore afflictis, aut ppter inflammationis ma
gnitudinem, aut ob influentium humorum acritudi
nem faciendum. Fronti itaq; illinendi succi rosarij,
plantaginis, solani, foliorum salicis, cum oui albo &
aceto. His ammiscere oportet bolum armeniaz, thus,
acatiam, santalos rubeos, balauſtia, & similia, ex qui
bus adiecto oleo rosaceo & farina hordeacea empla
strum componendum erit. Emplastica & anodyna,
ut est cerussa & amyſum, non temere sunt adhiben
da. hęc enim etsi sensum torpescere faciant, tamen
uehementes fluxiones, Galeno. 6. Apho. comm. 31. te
ſte, non reprimunt, sed excerni prohibent: atq; adeo
si humores fluentes acres fuerint, corneam erodi cō
tingit. Si uero multi, magis irritari, ac uehemēter ex
tendi. Pariter uehementer stupefacientia, nisi maxi
ma doloris necessitas urgeat, non sunt admouenda
quod scilicet facultatem uisoriam offendant, adeo
ut cessante inflammatiōe uel debiliter, uel nihil om
nino

ino uideant. In principio itaq; medicamenta quæ refrigerant, adstringunt & repellunt, adhibenda. In incremento repellentib. nō nihil ex iis quæ discutiūt admiscenda. At in uigore mitigatoria applicanda. In declinatione, ea quæ tantum discutiendi facultate pollent. Vbi igitur concocta iam phlegmone ipsa uerit, & simul corpus uacuum, tum utiq; lauaciones in balneo his sunt aptissime. nam Galeno ubi supra utore, & dolorem statim sedant, & fluxionem quæ ad oculos fertur sistunt, maxima quidem eius parte inter lauandum per totum corpus excreta, reliquo uero temperato mitigatouē. Fomentum præterea omnino adhibendum est ipsis oculis per spongiam, si quidem mediocris sit dolor, semel aut bis in die. Si uero uehementior dolor urgeat, præstat ter aut quater, & sæpius uti, in longis præsertim æstiuis diebus. Fiat autem fomentum per meliloti & fœnigræci decoctum. Est namq; hoc medicamentum maxime omnium quæ oculis admouetur, sine offensa discutiēs. Lauandum tamen prius curiose fœnogræcum, ne quid illi uel pulueris uel sabuli adhærens clam lateat. Alio ē etiam per se, uel aqua, aut succo fœniculi diluta mirabiliter confert.

De suffusione.

Cap. XXV.

Y ὁ ὕψμα καὶ ἰπ' ὕψος Latinis suffusio dicitur, barbaris cataracta. Est, ubi humor lentus & glaciei modo concretus, inter corneaz & crystalloiden circa pupillam subit, quo uisus eatenus saltem impeditur, ut non possit discretas reruz species & colores oculos apprehendere. Accidit potissimum ex refrigeratione, ac imbecillitate spiritus uisorii, Paulo libr. 6. Capite. 21. autore. Fit etiam ex uomitu uiolentius concitato, & ex ictu, & humore pigro in cornea membrana iuxta pupillam collecto. Inchoante morbo tanquam pusilli culices, uel alia lucentia, caliginosaq;

Balneum.

Fomentum

Causa.

Signa.

saq; quędam corpuscula assidue prę oculis obuersa
 ri uidentur. Quibusdam ueluti lanarum filamenta
 ⁊ telę aranearum, quibusdam circa lucernas circuli
 offeruntur. Hęc autem nonnunquam proprię noxi
 oculi, nonnunquam uentriculi passioni feruntur ac
 cepta. Quare inter hęc duo discrimen habendū est.
 Si quidem uisa ob humorum in uentriculo conten
 torum uitioꝝ oborta fuerint, utriq; oculo similite
 accidunt. Quę uero per propriam passionem appa
 rent, neq; incipiunt simul in utroq; , neq; similite
 apparent. Deinde ex tempore quoq; distinguuntur
 si enim tribus quatuorue aut etiam pluribus men
 bus suffusionis symptomata apparuerint, contēpl
 tiq; tibi pupillam, nihil tenebrosū uideatur, ab or
 uentriculi passionēꝝ procedere inuenies. Si uero nō
 ita multum temporis intercessit, quærendum est in
 primis utrum ex quo incipit affectus, singulis die
 bus perpetuō huiusmodi apparitio perseuerauerit
 nullo scilicet interueniente die qui omni querela ce
 ruerit, an diebus quibusdam laborans exactē uide
 tur conualuisse. Nam continuas suffusionem po
 tendit. Intermissio uero, quodd malum à uentriculo
 prodierit, suspicionem excitat. Idq; magis, si ubi per
 fecte quis concoquens, nullum sibi uisum apparer
 fatetur. Sed multo magis, si quum apparuerunt uisa
 mordicus in ore uentriculi doluit: maxime uero, si
 post hęc uomendo, eiecta re mordente, mitigata fu
 rint symptomata. Vbi uero altera pupilla tenebro
 sior, aut turbidior, aut non exacte pura uidetur, suf
 fusionis esse initium censendū est. *Viētus.* Viētus ratio si
 attenuatoria, ⁊ exiccatoria. A uino absteineat in to
 ta medicatione, ⁊ pro eo decoctum cinnamomi au
 hydromeli bibat, Fugiat omnia caput replentia. A
 balneis absteineat, nisi uel lassitudinis uel cruditati
 causa sint necessaria: atq; ne tum quidem in aēre ba
 nei diutius immorari, neq; in solio p̄sistere, s; sensu
 qui

sem ingredi, confestim uero egredi oportet. Vitent
 visces, fructus, & quicquid corpus humectare potest.
 suffusi in principio, nisi quid obster, uenę cubiti ex
 terioris sectioe, & acribus clysteribus purgatioibus
 que curantur. Deinde cucurbitula occipitio cuz sca
 rificatione affigenda est, utendumq; per interualla
 apophlegmatismis, & iis que per nares purgant. Cau
 terium etiam quale supra Cap. i. descripsimus, post
 aures apponendum erit. In oculis autem medicamē
 tis est primum simplicib. utendum, puta melle cum
 oleo & succo fœniculi. Postea cōpositis, quale hoc
 est, quod. ℞. Succu fœniculi. ʒ. ii. aque chelidonii ma
 ioris, euphrasie. añ. ʒ. i. s. sagapeni. ʒ. i. misce. Fellis etiā
 genera per se, aut cuz fœniculi succo illita proderūt.
 Aut myrrhe & piperis partes equales cum melle.

Curatio

De aurium dolore.

Cap. XXVI.

Aurium dolor aliquib. ex refrigeratione, in pē
 regrinatione à frigidis uentis facta, oritur. Ali
 quibus uero ex balneis frigidis, & quibusdam
 ex aquis medicatis excitatur. Fit & auris dolor ex in
 flammatione, interdum quidem solius circa meatus
 cutis, interdum uero in profundo, quando uidelicet
 nervus auditorius ad inflammationis affectum pue
 nerit. Qua uero ratione inflammatio, partes inflam
 matas distendens, doforem parit: eodem modo etia
 flatulentus spiritus transitum non habens, dolorem
 efficit. Saniosi deniq; & serosi humores in corpore
 aurium generati, consimiliter ut mordaces humores
 qui extrinsecus illabuntur, dolorem conciliant.

Causa.

Aurium dolor q̄ frigiditatis fertur acceptus, de egri ser
 monibus facile cognoscitur, & inde quod dolor altē
 citra grauitatem uel distensionem, uel ardorez fixus
 sit. At qui ex calida ortus est intemperie, ex eo quod
 in illo feruoris cuiusdam sine grauitate seu tensioe
 sensus est, deprehēditur. Si grauitas, distētio, simulq;

Signa.

ca.

Vitis.

Curatio

doloris
frigid.Doloris
calidi.Ex aquis
medicatisA. flatibus
et tumori
bus cras-
sis.

calor et dolor pulsatilis, aut etiā febricula oboritur. inflammatione, aurem laborare censeo. Sola autem citra grauitatem distensio, spiritum flatulentum cui exitus non patescit, indicat. Vitis ratio ex superioribus iuxta causę diuersitatem facile institui potest. Cæterum, dolorem à sola refrigeratione obortum, calefacientia quam celerrime curant, nempe oleum rutaceum, laurinum, nardinum, cicinum, anethinum, et liliaceum. Oleum etiam in quo allium decoctum est uel cepa, instillatum mirifice confert. Sunt qui magnas cepas exculpentes, deinde oleo explentes, et in feruente cinere moderatè calefacientes, ita auribus infundant. Galenus euphorbio perquā exiguo ad multum uetus oleum ammixto usus est, ueluti etiam pipere exquisitissime trito. Manifestum uero est omnibus, quicquid adhibetur mediocriter calidum esse oportere. Quum autem à calida intemperie dolor obortus fuerit, tum contrariis medicamentis propulsandus erit. Mirifice igitur confert rosaceum oleum in aurem demissum, uel acetum, uel succus solani, oleumq; nymphææ. Vt. R. Olei rosacei, succi solani, añ. ʒ. s. aceti. 3. i. s. misce. Magnifice et eos dolores mitigat qui candidum, itemq; lac muliebre. Vbi uero aqua medicata circa auditorium meatum contineatur, oleum assidue infundere conuenit, quo ipsum eluamus: dein lana molli extergere, rursusq; infundere. Plurimum etiam prodest adeps anserinus, atq; item uulpinus. Sed nihil ad aquam euocandam præstantius, quàm oris exuētio, quę etiā per calamum ceu canalem exugī potest. Si quis etiam alteri pedi innixus eiusdem lateris cum aure affecta, capite parumper declinui saliat, aquaz facile excutiet. Si uero à flatibus, aut crassis uiscosisq; humoribus dolor excitatus fuerit, medicamentis quę obstructiones auferunt et incidunt utendum: cuiusmodi sunt omnia amara, q̄ sine erosione expurgant, extergūtq;.

Ex

ex quo genere est album item ac nigrum ueratrum,
mygdalę amarę, ex aristo lochiis quęcunq; fuerit
ad manum, iris ilirica, uitis albe radix, centaurii mī
oris coma, cinnamomum, & polium. Quod si inflā
tio adsit, statim sanguis ex humerali uena eiusdē
arteris mittendus est. Deinde oxyrhodinum tepesa
tum instillandum. At si uehementior fuerit inflam
matio, ad sedandos dolores albumen oui cum lacte
mulieris tepidum infunditur. Cogente uero dolo
re, necessarium est etiam his quę sensum stupefaciūt
uti. Neq; enim mediocre periculum est, ne cerebrum
neruo per quem facultas audiendi distribuitur uici
um, per consensum afficiatur. Miscetur autem pau
culum opium muliebri lacti, & oui candido, quę &
ipsa per se aurium inflammationibus profunt. Casto
rio etiam opium miscetur. Verum multo ante usum
tempore, Galeno lib. 3. de Comp. med. Cap. 1. auto
re, siue pari pondere, siue duplo castoreo ammiscea
tur, preparatum id esse conuenit. Et miscetur quidē
in uehementissimis doloribus pari, in minoribus ue
ro duplo. Liquor uero quo prędicta medicamenta,
diligenter prius trita & leuigata diluuntur, sapa sit.
Opio etiam oleum rosaceum & uiolaceum miscetur
in hunc modum. ℞. Opii. 3. s. oleorum rosacei & uio
lacei. añ. 3. i. s. misce. Philonis antidotum frequenter
etiam sic laborantibus profuit, dissolutum lacte mu
liebri, & instillatum. Extrinsecus uero aurem assidue
siue oleo communi, siue ex quodam calido fomen
to oportet fouere, lanamq; hoc imbutam in aurem
conicere, sed ita ut partes inflammatione tentatę
quām fieri potest minime attingantur. Vbi autę do
lor inueterauerit, & iam in suppurationem conuer
ti cęperit, medicamento ē succo linis seminis uti
tor, quod unā cum rosaceo aut chamęmelino solu
tum instillabis.

Ab inflam
matione.

Stupefa
cientia.

De

Parotio
Causa. **P**arotides sunt inflammationes, quę in glandu-
Signa. lis auribus adiacetibus sunt. Causa eius nõ
Viſus. est alia quàm reliquarum inflammationu, quę
Curatio. in glandulosis accidunt partibus. Signa nulla ad
agnoscendas parotides requiruntur: oculoruz eni;
iudicio subiacent. Viſus ratio talis, qualis in aliis
inflammationibus, instituenda uenit. Curandi ra-
tio à uenę sectione, si ętas aliaq; permiserint, auspi-
canda erit. Incidenda uero humeralis eiusdem late-
ris uena. Non tamen ad eas, quemadmodu alias in-
flammationes, in principio reprimentibus utimur, s;
contrà attractoria medicamenta adhibemus. Atq;
si hec nihil notatu dignum effecerint, etiam cucur-
bitulas affigemus, aut fomēta assidua adhibebimus.
Annitendum eni, ut affligens humor ex profundo
ad cutem attrahatur, præsertim ubi in capite affectus
sit firmatus, humorib. in eo pertinaciter herentibus.
Quin & quum citra capitis affectum, in febribus acu-
tis natura superuacuos humores ex uasis effundens
ad regionem inter cutem & subiecta corpora depo-
nit, quando sanè & glandulę ex effusis humoribus
oppulentur: melius esse utiq; etiam tunc uidetur, na-
ture, per humorum decubitum seu ex loco in locu;
impetuosum illapsum febres curanti, opitulari. At
uero quum uehementi impetu influxus irruit, nihil
nos tentabimus, sed omnia nature pe-
mitteremus. Si enim uel cucurbitam uel medicamentu humores ex
alto ad cutē attrahens admouerimus, uehemens do-
lor hominem apprehendet, unde & uigilię suborien-
tur, febres intendentur, ac uires exoluentur. Mitiga-
re itaq; tunc, non humor influxui opitulari conue-
nit, per cataplasmatu maxime lenientium usum. Eli-
genda uero, quę cū humiditate moderata calorē ha-
beant, dolorib. mitigadis sedandis uē, atq; influētib.
hu-

umoribus concoquendis et maturandis idoneum, eluti est quod ex farina hordeacea, aut triticea, aut minis lini cum mulla, aut fœnigræci, aut althæe, aut hamæmeli decocto paratur. In hunc etiam usum ualeat butyrum assidue illitum, et ouorum uitelli. Si uero etiam adeps cum butyro liquatus, cera exigua adlita. Si itaque tumor non discutatur, suppurantibus medicamentis utendum est: uelut est farina triticea, cum aricarum decocto, et oleo. Si uero suppuratae fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, ulcusque; uelut in eiusmodi moris est curare, aut sane per acre medicamentum abscessum rumpere: quale est quod ex alliis constat, aut tentare, ut ipsum per medicamenta attractoria tenuiumque partium discutiamus, bis per diem ablatis, et fomentis admotis, donec remiserint et laxati fuerint dolores. Quando uero iam plurimum puris fuerit discussum, tunc iam primum semel soluere ea medicamenta, et fomenta adhibere oportet: deinde uero neque ex re est id facere, sed ipsis medicamentis permittere oportet, ut si quid reliquum in profundo hæreat, id ipsum discutiant. Quod si durities adsit, ea ipsa quoque mollienda est. quare hoc tempore ex mixta medicamentorum facultate compositio parabitur, emollientibus attractoriis ammixtis. Manifestum autem est quod moderate parotides, in quibus neque humorum multitudo redundans in particulas irruit tanta, ut uehementes dolores excitet, neque caliditas cum humore adest, facile per medicamenta emollientia et discutientia, quale est emplastrum diachylon, sanari possint.

De sanguinis ex naribus eruptione. Cap. XXVIII.

CAusæ profluuui sanguinis ex naribus externæ multæ sunt, nempe casus ab alto, ictus, exercitium uehemens, mora in sole. Multæ et sunt internæ, nimirum copia sanguinis, uel eiusdem tenuitatis.

Causæ.

E tas.

tas. Omnes autem causę sub iis tribus complecti possunt. Sanguis enim profluit ex naribus, aut reserato uenarum uel arteriarum quę in capite et naribus sunt ore, aut tunica earundem rupta ac diuisa, aut sudoris instar transcolatus. Porro, reseratur uenarum et arteriarum os propter tum uasis imbecillitatem, tum sanguinis qui ad os earum impetu ruit copiam; ad hæc acrem quampiam, quę illi extrinsecus incidit, et lilitatem. Diuiditur autem tum ex uulneratione, tum contusione, tum ruptione, tum erosione. Sudoris instar transmittitur tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine uero tenuato. Causę externę de sermonibus egrotantis cognoscuntur. Plenitudinis notę dictę sunt supra Cap. 6. huius libri. Decretoriuz sanguinis ex naribus profluuiuz ex morborum qui præcesserunt constitutione deprehenditur. Viſtus ratio talis sit, quę inſrigidare et incrassare sanguinem queat. Tenuis etiã sit. Aëre itaq; utatur frigidior: cibis boni succi, et cōcoctu facilibus. Feruente sanguine, uescatur lactucis, endiuia, scariola, piris, cotoneis malis, pullis gallinaceis assis, aut cum omphacio decoctis. Bibat uinum crassum ac rubeum, fugiat uero tenue et albu. Aut in potu utatur aqua frigida, uel decocto cinnamomi. Parum loquatur, animiq; perturbationes (iram potissimum, et similes) deuitet. Caput præterea sublimē habere conueniet. Curandi uero ratio ab iis quę sanguinem ad alias corporis partes auertere possunt aulpicanda. Primum itaq; si plenitudo corporis adsit, aut etas permiserit, egerq; resolutus adhuc non sit, uena in cubito incidenda est, quę profusioni è directo respondet. Vbi paululum detraheris, mox unam horam intermittens, rursus detrahes, post iterum atq; iterum pro laborantibus uiribus. Trictio etiã infernarum partium, brachiorum uidelicet, manuum, famorum, inguinum, ac pedum, potissimum per ea medicamenta quę calefaciunt, adhibenda.

Signa.

Viſtus.

Curatio.

Vene sectio.

Trictio.

benda. Præterea uincula ualentius adducta, iis re-
 mediis quæ reuellunt adnumeranda sunt. Sanguinē
 eniq; è naribus erumpentem retinent magnę in hy-
 pochondriis defixę cucurbitę. Infigendę autē sunt,
 ex dextra nare profluit sanguis, super iocinore: sin-
 x sinistra, super liene: si ab utraq; nare, super utro-
 ue sunt imponendę uiscere. Scapulis etiam cū sca-
 lificatione applicandę sunt. His peractis, medicamen-
 ta quę refrigerant & adstringunt, intra & extra cor-
 pus adhibenda erunt. Extrinsecus itaq; apponenda
 fronti & commissurę coronali sunt, epithemata ex
 ucco plantaginis, lactuce, acetosę, bursę pastoris,
 polygoni, & similibus. Mirifice uero confert, si lin-
 theolus in aceto madefactum frigidum, iterum atq;
 iterum fronti & ceruici admoueris. Frons etiam spō-
 giis ex aqua frigida fouenda. Proderit etiaz hoc epi-
 themate iocinori & fronti imposito uti, quod. ℞. A-
 quarum rosarum, solani. oxalidis (hoc est acetosę)
 plantaginis. añ. ʒ. iii. aceti. ʒ. i. s. specierum diatrifan-
 dali, diarhodon abbatis. añ. ʒ. s. boli armenię, eboris
 usti, lapidis ematitidos. añ. ʒ. i. misce, fiat epithema.
 Hoc etiam obstruenti medicamento, quod Gal. lib.
 5. Ther. meth. optimū eē inter omnia alia asserit, utē-
 dum, quod. ℞. Thuris. ʒ. ii. aloës. ʒ. i. Redacta in pul-
 uerem cum oui candido subigantur, donec ad mel-
 lis crassitudine redeant: dehinc leporis mollissimo
 pilo excipiantur, & admoueantur. Licebit etiam lina-
 mentum contortum hoc medicamento imbutū na-
 ribus indere. Mentam porrò tritam in nares conice-
 re proderit. Aut spongiam in acre & feruidum acetū
 coniectum, forinsecus ad sanguinem profundente;
 narem apponere. Aliud. ℞. Putaminis oui. ʒ. ii. gal-
 le omphacitidis. ʒ. i. trita linamēto torto aqua aut ace-
 to madefacto excipito, & indito. Frontem uero & na-
 sum gypso albumine oui madefacto integere con-
 fert. Aures quoq; ualidē linteis & cera obturare, &

L. gaturæ

Cucurbitæ

Medicamē
ta refriger-
antia &
adstringē-
tia.

Epithema.

E ii ore

in ore aquam pluuialem frigidam continere. Succum etiam foliorum urticae linamento impositus, sanguinem ex naribus erumpentem reprimat. Idemque etiam potest caudae equinae succus, aut ipsamet trita applicata. Cochlearum carnem cum aceto tritam, aut eadem cum suis domiciliis uistas tritasque, fronti ac naribus ex aceto admoveere conuenit. Supra omnia conferat sanguis, qui ex egrotantis promanauit naribus, si in uase figulino tostus fuerit, de quo. R. 3. iii. boli armig, gypsi, añ. 3. i. caphure. 3. i. cum oui candido et ex quo aceto reducantur ad mellis crassitudinem, et fricti imponantur. Necessitate urgente, grana duo aut tria opii adlicere licebit. A tota substantia sterco asininum exiccatum, et in puluerem redactum, conducere uidetur. Id quod porcinum etiam efficere potest. Intra corpus adhibenda ea quae infrigidant et acstringunt medicamenta, ut sunt syrapi rosaceus, myrtinus, et nymphaeae, et de papauere. Conseruati rosarum nymphaeae, et oxalydis. Pastilli de terra sigillata, de succino, de ebore seu spodio, cum succis paulo antea memoratis. Porro si quid interea ex sanguine absorptum esse uideatur, etiam id ipsum ubi multa eius sit copia, per medicamentum quod uacuare potest educito. In uentre enim et intestinis in grumos coactum, incensionem facit.

*Que ad
bibenda in
tra corpus*

De dolore dentium.

Cap. XXIX.

Causa.

Fit interdum ab intemperie uel frigida uel calida interdum uero propter defluxum humorum ex capite in radices eorundem, qui sua acrimonia illos aut erodunt, aut consimilem in eis passionem sua copia excitat, qualis est circa carnosas partes inflammatio. Si a nuda qualitatis intemperie dolor ortus sit, minime grauatius erit. Sin ab humore copioso influente, non solum grauatius dolor in dentibus sentitur, uerum etiam in reliquis partibus quas pertran-

Signa.

infit. Calidus autem humor uehementiores, frigidi
 uero remissionem mitioremque; dolorem excitat.
 Iustus ratio, que maxime ne dolor accidat efficere
 test, talis sit, ut supra modum calida aut frigida de
 centur: porissimum uero cauendum, ne statim sese
 quantur. Vitanda acida, acerba, et uiscosa omnia.
 Ictis etiam frequens usus dentibus mirifice obest.
 Iudium et diligentia assidua sit in purificatione den
 tum, que sane res eos a corruptione omnium maxi
 me tutos reddit. Utendum cibis boni succi, et conco
 cu facilibus. Dolore autem infestante, iuxta causae
 uersitatem iustus instituitur. Curandi ratio, si a
 uida sit qualitatium intemperie, solis iis que altera
 e possunt medicamentis perficitur. Si a frigore, pro
 lerit uino tepido colluere dentes. Extrinsecus ma
 illae calefacientibus oleis, chamemelino, rutaceo, iri
 no et similib. inungantur. Ad oris etiam collutione
 n aceto decoquenda erunt origanum, calamintha,
 hyssopus, pulegium, satureia, uerbenace recte radix,
 et similia. Sin a colore dolere dentes coperint, in ace
 to decoquere conuenit portulacam, parietariam, sem
 peruiuum minus, et glycyrrhizam. Quod si intolera
 bilis existat caloris iensus, utendum est seminibus la
 tuce, intybi domestici, et papaueris hortensis, deco
 ctis in aceto. Forinsecus oleis frigidis partes inunge
 de. Porro si a redundantia humorum dolor excita
 tus fuerit, si etas, tempus anni, et alia permiserint, ple
 nitudoque corporis affuerit, a sanguinis missione cu
 ratio inchoanda erit. Detrahendus autem sanguis ex
 humerali uena, que est directio affectum locum respi
 cit. Quo peracto, uenas sub lingua incidere oportet, aut
 scapulis cucurbitas affigere. Si uero unus duntaxat
 humor exundauerit, medicamento quod eius humo
 rem purgare consuevit euacuetur. In quem usus cly
 steres etiam, qui ad inferiora auertunt humorum im
 petum, adhibere licebit. Vacuato corpore, ea que

Vitus.

Curatio.

Vena se
cto.

Purgatio

E iii repri.

*Reprimen
tia.*

reprimunt medicamenta admouebis : ut sunt, succi plantaginis, rosarum, portulacæ, lactucæ, in cybi domesticis utriusq; aut prædictarum herbarum decoctum cum modico aceto. Prodest uero mirifice, dolentes acri aceto calido cum galla immatura collure. Adicienda etiam interdum erit caphura. Emplastrum quoq; ex farina ordeacea, cum decocto solani, halicacabi, et lactucæ confert. Inungendæ etiam uincing partes ex trintecus oleo rosaceo, nymphæ, exiguâ caphuræ adiecto. Principio morbi iam transacti, reprimentibus admiscenda erunt discutientia

*Discutien
tia.*

*Stupefaci
entia.*

ut est decoctum foeniculæ, seminis lini, pyrethri, et hyssopi. Ad stupefacientia, nisi summa urgente necessitate, non est perueniendum. In hunc autem usum adhibebis decoctum seminis aut foliorum hyoscyami cum aceto. Philonii etiam drachma una in aqua aut uino diluta, non parum auxilii confert. Inter ea tamen quæ à tota essentia conducunt, egregie facere feruntur in aqua et aceto probe coctæ decoctum, diutius ore retentum. Preclare prodest etiam senecta sepenis, in uino aut aceto cocta. Eadem quoq; uisâ ac trita, cum oleo ad mellis crassitudinem redacta, dentibus imposita dolenti confert. Ipsa deniq; non uisâ dentibus adfricta, non parum conducet. Origanum præterea dentium dolorem lenit, et protinus tollit, si redactum in puluerem cum nitro inspargatur. Quod si uero prædicta nihil contulerint, dens aut ferro aut medicamentis auferendus erit. Quæ autem sint medicamenta ea quæ citra dolorem et absq; ferro dentem extrahere queunt, docet Aëtius lib. 8. Cap. 34.

De aphthis.

Cap. XXX.

Aphthæ.

Aphthæ, ulcerationes quæ in superficie oris accedunt, igne caliditatis quippiam habentes, Græcis appellantur, quæ nunc subalbide, nunc subrubre sunt; alias crustæ modo nigrescunt, et hæc omnia periculosa.

periculosissime existunt. Barbari hunc affectum aliam nominant. Fiunt ut plurimum infantibus puerisque; lactentibus, quum aut uitiosum fuerit lac nutriticis, aut non probe ipsum concoxerit infans. Fiunt etiam aliquando in his qui ad perfectam etatem perueniunt, tum propter uitiosorum humorum ad os refluxum, tum propter acrimoniam eorum quæ bibuntur ac comeduntur. Cognitio omnium facilis est, utpote uisui ac tactui subiecta. Ad tactum quidem, validiores quàm conuenit partes fiunt, tumoresque excitantur. Visu uero, ex colore cognoscuntur. Quæ enim rubicundiores existunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amarulæ; albidiores, pituitæ; liuentes uero et nigrescentes, bilis atræ. Quæ infantibus accidunt, facile curantur, utpote quæ ex moderate adstringentibus sedantur. Infantibus uero ea potissimum conueniunt, quæ in cibis offeruntur. Oportet itaque miscere cibis aliquid ex malis cotoneis, et aliis acerbis, pirisque; ac mespilis. Aliquando etiam lactucæ quiddam et intybi, ac portulacæ cibo admiscendum est inflammata uidelicet ulceratione existente. Conuenit etiam lens cum aceto et aqua decocta, cum modico pane commanducata. Quod si infans ipse cibum capere haud possit, nutricei eius huiusmodi uictu curare oportet; nec non infantium ora medicamentis conuenientibus illinire. Si quidem subrubræ infantium ulcerationes fuerint, à principio his quæ mediocriter adstringunt et refrigerant, est utendum. Si uero subflauæ fuerint, iisdem quidem utendum, sed magis refrigerantibus. Si pituitosiores, adstringentibus. Si nigrescentes, iis quæ generosius discutunt. Sufficit itaque pro iis rosarum flos, ipsaque rosarum folia sicca contusa, galla, et thus, cum mulso aut melle rosaceo illita. Collutiones etiam oris ex succis rosarum, plantaginis, solani, aut decocto gallarum, balaustiorum, rhoë obsonio

E iiii rum,

Causa.

Signa.

Curatio
infantium

**Curatio a
dultorum.**

Vicius.

**Vene se
ctio.**

Purgatio

rum, admixto R ob de ribes, aut confectioe diamo-
ron, profunt. In eis qui iam perfecte etatis sunt, du-
rioraq; corpora habent, efficacioribus remediis uti-
mur. Primum itaq; quod ad uictus rationem atti-
net, qui in hac etate constituti, ab omnibus que sal-
sa & acris sunt, quæq; uitiosos succos generant
possunt, abstineant. In plenitudine totius corporis
primum uene humeralis, & dein earum que sub lin-
gua sunt, sectio fiat. In cacochymia, humoris redun-
dantis purgatio conuenit. Qua peracta, medicame-
ta quibus adstringendi & reprimendi facultas inest
adhibenda erunt. Deinde, uero ea que citra mordac-
tatem discutunt, ut est fœnumgræcum, glycyrrhiza
radix, melilotum, & alia prius sepe commemorata.
In his uero omnib. corporum naturas contemplar-
opz, nuz molles sint & humide, uelut in pueris, eunu-
chis, & mulierculis; an dure & aride, uelut in piscato-
ribus, nautis, uenatoribus atq; agricolis. Fortiorib.
enim corporibus fortiora adhibenda medicamenta
mollioribus imbecilliora. Atqui si exulcerationes
putrescere incipiant, maxime in infantibus, preclarum
facit ex decocto gallarum & melle illitio. Gallas
itaq; contusas aqua decoq; & cum decocto pcola-
to parem mensuram mellis pmiscens, rursus decoq;
donec ad mellis crassioris spissitudinem redigatur,
eoq; ut maximo remedio utere, ita ut locis illitū sa-
tis diu digitis adfrices. Nec minus egregie facit cen-
taurii minoris exusti cinis illinitus cum melle. Cor-
nu etiam ceruinum ustum, tritum, & adfrictum, miri-
fice conducit. Ad aphthas q̄ proserpunt, summe effi-
cax est fœniculi radix usta per se, & cū melle illita.

De foetore oris.

Cap. XXXI.

Causa.

Molestus oris odor primū ob putrescentes gin-
giuas, dentes, aut ciborū reliquias illic deten-
tas accidit. Deinde pp cutis oris calidaz intem-
periem,

eriem, humiditatem, quę in eo multa est, corrumpē-
 em. Interdum etiam ob humorem corruptum aut
 utrefactum, in ore uentriculi herentem. Nonnun-
 quam uero oris aut pulmonis exulceratione fit, ut
 molestus sit oris halitus. Si propter putrescentes uel
 gingiuas uel dentes, uel ciborum reliquias oris fœ-
 or accidit, facile uisu aut de egroti sermonib. depre-
 nendi potest. Si ob calidam cutis oris intemperie, tu-
 calor in ore sentitur, ac fitis adest. Si propter os uen-
 riculi, tunc ante cibi sumptionē precipue oris odor
 molestus esse solet. Oris et pulmonis exulcerationes
 uisus etiam agnoscit, totius enim corporis extenua-
 tio phthificos concomitatur. *Victus* ratio talis sit,
 ut omnia quę facile in ore aut uentriculo corrup-
 puntur, euitet egrotus: lac, pisces, fructus omnes, me-
 dullas, et pingua, aquas prauas, et similia. Utatur po-
 tius cibis boni succi, potissimum uero assis. In cœne
 et prandii sine adstringentibus, piris, cotoneis malis,
 et eiusmodi. Potus iuxta causę diuersitatez sit uel ui-
 num, uel cinnamomi aut hordei decoctum. Somnū
 statim à cibo fugiat. Si propter gingiuarum aut den-
 tium corruptionem fœtor oris acciderit, corporisq;
 plenitudo fuerit, ex uena humerali primum sanguis
 mittendus erit, et dein cucurbitulę ceruici affigende.
 Sin cacochymus fuerit corpus, medicamēto idoneo
 humor redundans ac molestas uacuandus erit. Cor-
 pore uacuato localibus utendū: in quem usum col-
 lutiones mirifice conferunt, qualis hęc est, quę. R.
 rosarum rub. plantaginis. añ. M. i. s. gallarum, balau-
 stia. nucis cupressi. añ. 3. ii. corticum granatorum. 3. i.
 s. aluminis liquidi, roche nominant. 3. i. Decoquan-
 tur in aqua sufficiēti, usq; ad tercię partis absumptio-
 nem. Colaturę adde mellis rosati colati, rob nucum
 uiridium. añ. 3. s. diamoron. 3. ii. fiat collutio, cum q̃
 calida dentes et gingiue colluantur. Proderit etiam
 frequens collutio ex aqua, cui acetus sit permixtus,
 mane

*Signa.**Victus.**Curatio.**Vene se-
ctio.**Purgatio**Localia.
Collutio*

Si calida
intemperie.

mane & statim à cibo. Non parum etiam confert cō
manducatio pyrethri, tamaricis & rutę. Collutio
item ex aceto scyllitico, aut decocto saluigę, aut cum
solo uino. Decoctum mentę ex aceto & aqua iuuat,
si illo assidue os colluatur. Si à calida intemperie fit
oris fœtor, contrariis curetur medicamentis. Sin ab
humore in ore uētriculi corrupta accidit, per ea quę
humorem illum uacuare possunt sanetur. C ommo-
de autem per uomitum uacuabitur, qui iis quę Cap.
20. diximus, concitandus medicamentis uenit. Dein
confectiones stomachum roborantes, ut est aroma-
ticum rosaceum, diambre, miuaq; cotoneorum ex-
hibenda. Medicamenta uero quę in omni cau-
sa competere solent, sunt gariophylli, masti-
che, macer, lignum aloës, cinnamomuz,
rosę, santali, nux myristica, cube-
bæ, & alia eiusmodi.

LIBRI PRIMI FINIS.

FRONHARTI TVCHSII

DE MEDENDIS SINGVLA

rum corporis partium a sum.

mo capite ad imos usque

pedes passionibus.

LIBER

SECUNDVS.

De Columelle Inflammatione.

C'p. I.



AR NOS A Quædam parti cula in summo ore appet depē dens, si quis aperto plurimum ore toto linguaz deprimat. Hec ueteribus Grecis duob. appella tur nominibus, γαργαρο & κολύνα, idest, gurgulio & colūna. Po steriores autem ferē omnes κολύνα, hoc est, columellaz uocat.

Columel =
ia quid.

Sepe admoduz inflammatione afficitur, id quod ex influxu humorum ad ilam contingere solet. Visu apprehenditur potissimum passio, acceditq; in deglu tiendo difficultas, dolor, tumor partis patientis, & febris. Viētus ratio talis sit, qualis in ceteris ferē inflammationibus. Conuenit autē præcipue quies, inediaq;. Curandi uero ratio si plenitudo affuerit, etasq; & alia permiserint, à uenę sectione auspiciāda erit. Incidenda autēz primū uena in cubito exterior, quam humeralem uocant, deinde ea quę sub lingua est. Alius etiam clysteribus subducenda, ut hac ra tione non tantum uacuentur, uerumetiam auertan tur à loco patiente, humores confluentes. In quem usum etiāz conuenit scapulis affigere cucurbitulas. Neq; hic negligenda sunt auxilia quę fluxum repri munt, qualia sunt quib. adstringendi facultas inest.

Causa.
Signa.

Viētus.

Curatio.

Vena se
ctio.

Auerfio.

Reprimen
da.

Vten

Gargaris
ma.

Utendum itaq; hac collutione, quæ. R. Succi ros-
rum, plantaginis, prunelle, oxalidis, solani. añ. ʒ. i.
diamoron, rob de ribes. añ. ʒ. s. rob de oxyacanth.
quam berberim uocant. ʒ. ii. aceti in quo rhus, hoc
est sumach, maceratus sit. ʒ. i. succi malorum gran-
atorum. ʒ. s. misce, fiat collutio. Vel hoc gargarismo
quod. R. Rosarum rub. rubi. añ. M. i. balauft. corti-
cis malorum puniceorum, gallarum, glandium. añ.
iii. s. rhois, hoc est, sumach, hypocistidos. añ. ʒ. i. s. i.
oxalidis, sc. citoniorum. añ. ʒ. i. Decoquantur in li-
q. aque fontanæ, dum altera pars absumat. Cola-
tur adice diamoron. ʒ. i. rob nucum uiridium. ʒ.
aceti optimi. ʒ. vi. misce, fiat gargarismus. Et iis qu-
dem in principio utendum: et tum maxime, ubi affe-
ctus non habuerit maiorem causam, nec ægri corpus
multis humoribus refertum fuerit, aut particula af-
fecta natura debilis. Sin contra acciderit, sepe quid
in principio, sepe uero paulo post, id est, in tertio die
quippiam ex discussoriis commiscendum erit, ut e-
semen lini, fœnigræci, et althææ, radix iridis, atq; me-
Omnia autem hæc tepida sunt exhibenda: frigus enim
non tolerant inflammata. Si uero in uigorem peru-
nerit passio, gargarisset decoctionem fursurum ca-
lidam, aut decoctum glycyrrhiæ, hyssopi et ficuum.
hæc enim non solum discutere, uerum etiam miti-
gere malum possunt. Extrinsecus proderit, spongiæ
oleo amygdalino madefactis et expressis fouere cer-
uicem. Aut lana mollis oleo tineta, collo circumpo-
nenda. Cataplasmata quoque ex farina hordei, au-
semine lini, aut fœnigræci, aut ex iis simul mixti
ad mouenda.

De angina.

Cap. II.

ΚΥΡΑΨΗ

KΥΡΑΨΗ καὶ σΥΝΑΨΗ Græcis, Latinis uero angina, proprie est inflammatio, quæ in gutture uel faucibus fit: sic dicta ἀπὸ τοῦ κυράψω ἢ συνάψω

Χ57

hoc est, à suffocando, quoniam pestiferum et acutissimum sit malum, quod strangulatu præsenteus ite discrimin inferre solet. Hippocrates tamen et alii ueteres, omnes passiones iis locis accidētes, quas pirandi difficultas comitatur, angine nomine appellant. Suntq; eius proprie loquendo quatuor differentie. Vna, ubi fauces inflammantur. Altera, quum neq; fauces, neq; relique oris partes, neq; etiam externarum partium ulla inflammata uidetur, eger tñ suffocationis periculu in gutture sentit. Tertia, ubi gutturis partes tum externę tu; internę similiter inflammantur. Quarta, ubi ad anteriorem regionem ceruicis uertebre luxantur, unde cauus apparet locus, et dolorem quum tangitur eger sentit. Recentiores, ut Paulus lib. 3. Cap. 27. et alii quidam, inter cynāchen et synanchen, item paracynanchen et parasynāchen, discrimin fecerunt, quod tamen Galenus lib. 4. de Locis patientibus Cap. 5. reprehendit. His itaq; $\sigma\upsilon\nu\alpha\gamma\chi\eta$ dicitur inflamatio, quę in interioribus faucium musculis oritur. Quę uero in exterioribus earundem musculis fit, $\pi\alpha\rho\alpha\sigma\iota\nu\alpha\gamma\chi\eta$ iisdem nominatur. Eodem modo et in gutture se habet. Si enim interiores eius musculi inflammatione confluentur, $\kappa\upsilon\nu\alpha\gamma\chi\eta$; si autem exteriores, $\pi\alpha\rho\alpha\kappa\upsilon\nu\alpha\gamma\chi\eta$ his ipsis appellatur. Oriuntur à sanguine copioso ac calido præter naturam ad loca iam cōmemorata confluyente. Cognoscuntur iis notis. Spiritus non nisi recta ceruice, aut difficulter trahitur. Nōnullis febris oritur dolor, faciei rubor, et colli. Ad hæc tumor etiam in quibusdam superuenit. Aeger ore hiat: cibuz non deuorare, non potionem potest. In principio itaq; p̄ceps ac compendiarium auxilium omnis angina requirit. Protinus igitur cubiti uenam anteriorem eiusde; lateris incidere oportet, nisi quiddam maioris periculi impediatur. Parcē autem, et pluribus interpositis uicibus, non uniuersis, sanguis auferendus. Quippe cum

mulata

Παρασι
ναγχη.Κιναγχη
Causa.

Signa.

Curatio.

Vene se
ctio.

mulata uniuersumq; facta uacuatione, anima ipsis
deficiente, suffocationis periculum superuenit, dum
materia in affectam partem ubertim prorumpit. Cu-
randum etiam, ut modica fiat uenę diductio. Nam
quum in aliis, tuz in magnis uenę diductionib. acer-
uatim animi defectus irruit. Neq; tamen angustiores
facere uenę incisionem conuenit, ne sanguis uelut
percoletur, & crassior eius pars intus remaneat, quę
causa huius passionis existit. Si per hęc parum profi-
citur, eas quoq; uenas incidere cōuenit quę sub lin-
gua sunt. idq; primo statim die. Quod si quid uenę
Clyster. incisionem fieri prohibeat, alius acriore clystere q̃-
cucurbita lem in Cap. de Apoplexia descripsimus, subduci de-
bet. Post uniuersales autem euacuationes, cucurbi-
tas apponere oportet. Et si quidem tumor circa ma-
xillas, aut sub mento persistat, in ipsum tumorem, &
cum scarificatione plurimum sanguinem extrahere,
saleq; respergere scissuras, & confricare. Quod si nul-
lus extrinsecus appareat tumor, retro in collo iux-
ta primam uertebam cucurbita infigenda erit, & cō-
stanti attractione utendum, frequentiusq; cucurbi-
Auerſio. ta auellenda. Auertendi etiam humores, ne ad lo-
cum affectum confluant. In quem usum pedes aqua
calida foueri debent, extreme partes ualide deligari
& fricari. Collum quoq; lanis oleo calido imbutis
Gargaris contegatur. Gargarizandum etiam statim per initia
mt. ex iis quę Cap. i. de Columellę inflammatione dicta
sunt. Cum morbus uiget constituē, iis quibus di-
scutiendi uis inest utendum propere p̃sidiis, ut est
decoctum fœnigręci, ficuum, passularum, glycyrhizę
uel ualentiorum, iridis radice, hyssopi, nigellę, abro-
Gargaris tani, cum oxymelite. Tale itaq; gargarisma, proderit
ma. quod. ℞. Glycyrhizę decorticatę. ʒ. i. passularu. ʒ. s.
ficuum aridarum numero. vi. fœnigręci. ʒ. ii. hyssopi
abrotani. añ. M. s. Coquantur in lib. i. aque fonta-
nę, usque ad medietatis consumptionem. Colaturę
adiice

Illice mellis rosacei colati. ʒ. i. s. oxymelitis simpli-
s. ʒ. i. misce, fiat gargarisma. Item stercus caninū ar-
um contusum, et cum melle perunctum, præstantis-
simum est remedium. Atq; huius generis albus ma-
ime, tum hirundinum similiter cinis efficax est. Fo-
s ceruici etiam adhibeantur, quæ discutere valent
utaplasmata et emplastra, quale est quod. R. Faring-
e minis lini, fœnigræci, hordeaceæ. añ. ʒ. i. se. altheæ. ʒ.
maluæ, flor, camomillæ, meliloti. añ. M. i. ferueant
in aqua, donec mollescant: dein in mortario contū-
antur, adiectis oleorum chamæmelini, liliorum al-
borum. añ. ʒ. i. s. fiat cataplasma. Non inutile est, si col-
um oleis chamæmelino, anethino, liliaceo inunga-
tur, aut decocto fœnigræci, meliloti, chamæmeliq; fo-
ueatur. Qui angina infestantur, triduo aqua mulsa
pro cibo utantur: inde ptisanæ cremore per se, aut cum
uauis quadam portione. Præditus enim est is succus
facultas extenuandi, discutiendi, alendi, et refrigeran-
di. Deinde ubi inflammatio imminuta fuerit, et egrus
melius iam deglutire cœperint, ouorum lutea perliquida,
ac sorbitiones ex alica exhibebis. In summa, cibi egrus
uiribus respondeant: ideoq; immodica alimenta ui-
tanda. Somnus quoq; ut in omnibus aliis inflamma-
tionibus, sic in angina omnium maxime fugiendus.
nā Hippo. teste, sanguis in summo intro magis repit.

Cataplas-
ma.

Villus.

De tussi.

Cap. III.

TVillis varieg sunt causæ. Nam intemperies frigi-
da respirationis instrumentorum tussis efficit.
Humor etiam à capite in asperam arteriam de-
stillans, et sola asperitas membranæ asperam arteriā
intrinsecus ambientis, tussim irritant. Qui præter la-
buntur etiam potus et cibi, tussim mouent. Lumbrici
quoq; stomachum infestantes, tussiculas paruas exci-
tant. Acris deniq; humor stomachū perturbans, ac
irritatiuā aliquā qualitatem ad fauces demittens, tussim

Causæ.

Signa.

sim producit. Humor etiam in pulmone et thorace detentus, in morbo laterali, inflammatione pulmonis, et tabe, maxime tussis causa existit. In summa, quod quid asperam arteriam exasperare potest ueluti funus, puluis, et eiusmodi, tussis causa esse potest. Signum autem obsolam intemperie in frigidam tussiem est, si per crebras inspirationes irritentur, frigiditate uidelicet exinde intensiore facta et aucta. Facie denique sunt pallida, siti nulla premuntur, calidis optime, frigidis male afficiuntur. Moderate et minime uolenter tussunt. Id quod. 6. Epid. 2. par. Aphor. 12. sic scribens testatur Hippocrates: Tusses siccae, leuiter irritantes, non a maligno, sed uento potius accidunt. Id uero hinc manifestum fit, quando loquuntur, aut os aperiunt, tunc tussunt: cum uero non, minime. Quae uero cum titillatione partium ab utraque palati parte contingunt tusses, palam ostendunt defluxum a capite ad asperam arteriam deferri, itemque ad pulmonem. Id quod ex difficili, quae comitatur, spiratione deprehenditur. Quod si sic affecti nihil expuant, tenuem defluxum indicat, qui expulsionem spiritus dissectus, praetenuitate sua rursus fluxum reflectit. Ratio uictus iuxta causarum diuersitatem variabitur. Si enim ex frigida intemperie instrumentorum respirationi deseruientium orta fuerit tussis aer et uentus, cibi et potus frigidi uitandi erunt. Si ob humorem a capite destillantem excitabitur, talis fit uictus ratio, qualem supra in Cap. de Destillatione descripsimus. In uniuersum uero salia, acrida, et quaecumque arteriam exasperare ualent, uitanda. Tussis ex frigiditate orta, per ea quae instrumenta respirationis calefaciunt curabitur. Cervix itaque lanis calidis uestiatur, raro inspirandum, adeo ut non solum per spiritus compressionem retinere queant aegrotantes et impedire tussim, sed sanare etiam sepiissime, per respirationis inhibitionem frige factas particulas calefaciendo.

Vicius.

Curatio

endo. Quapropter si hi leniter inspirant et aëres at-
 ahunt, ac in calida domo uersantur, parū uel om-
 ino nihil tussunt. Thorax etiam calidis unguētis,
 test oleū irinum, liliorum alborum, anethinum, et
 iusmodi. Si uero humor tenuis et acris ex capite in
 horacem destillans tussim excitauerit, tū per cibos
 otis. boni succi, et per medicamenta quę refrigerāt,
 pissant, et acrimoniam mordacitatemq; arcent et ob-
 undunt, curabitur. In hunc sanē usum conuenit ex-
 hibere syrupum uiolaceum, nymphę, de papauere,
 confectiones diatragacanthę, diapenidii sine specie-
 bus pilulas bechicas, et eiusmodi. Item ea etiam medi-
 camenta, quę a ueterib. dolorem leuantia et arteriaca
 dicuntur, de quibus Galenus copiosissime scribit lib.
 7. de Comp. medi. secundum locos. Potissimum au-
 tem hoc conferet, quod. R. Conseruę uiolarum, et
 nymphę. añ. 3. s. diatragacanthę frigidę, diapenidii
 sine speciebus. añ. 3. vi. succi glycyrrhię. 3. ii. pilula-
 rum bechicarum. 3. i. styracis calamitidis. 3. i. s. myr-
 rhę, rosarum siccarum. añ. 3. i. tragacanthę, nucū pi-
 nearum. añ. 3. s. cum syrupo uiolaceo quod satis est,
 fiat ecligma. Conueniunt etiam quę suprā in Cap.
 de Destillatione dicta sunt. Si autem crassus aut ui-
 scosus fuerit affligens humor, per ea quę extenuant
 et incidunt medebimur. Exhibebimus itaq; syrropos
 de glycyrrhię, de hyssopo, de prasio, de calamintha,
 et similes. Aut decoctum hoc, quod. R. Radicum iri-
 dis, petroselini, glycyrrhię. añ. 3. i. radicis inulę cam-
 panę uocatę. 3. s. caricarum numero. vii. passularum
 mundatarum. 3. i. se. urticę, anisi, fœniculi. añ. 3. ii.
 hyssopi, adianti, scabiosę, prasi. añ. M. i. s. agari-
 ci optimi. 3. iii. Decoquantur in aqua fontana iustę quā-
 titatis, donec tertiā pars absumatur. Dein colentur,
 et colaturę adiiciantur syrupi de hyssopo, de pra-
 sio. añ. 3. ii. s. misce, fiat potio. Posthęc, si uidebitur
 utile, corpus per ea quę crassos et glutinosos humo-
 res

Tussis a
 tenuibus et
 acris hu-
 moribus cu-
 ratto.

Ecligma.

Tussis a
 crassis et
 viscidis hu-
 moribus
 curatto.
 Decoctus

Purgatio

F res

Agarici
dilutum.

Loch.

Unguen-
tum.

res purgant, uacuandum. Inter alia uero multa quae
supra dicta sunt, unice confert agarici dilutum, quo
sic fit. ℞. Agarici electi. 3. ii. zingiberis. 3. i. salis gen-
me gr. iii. macerentur per noctem in uini albi odor-
feri. 3. ii. succi absinthii & fœniculi. añ. 3. i. Mane co-
lentur & exprimantur, & dissoluatur in iis ecligmat
indi. 3. ii. oxymelitis scyllitici. 3. s. & fiat potio. Vacu-
to corpore ecligmata (quæ officinis Loch appellantur)
exhibenda, de pino, sanuz & expertum, de scylla, dia-
ris solomonis confectio, & similes, quæ singula in
hunc modum coniungenda sunt. ℞. Loch de pino
sani & experti, de scylla. añ. 3. ii. s. diaris solomonis
3. i. trochiscorum pectoralium. 3. i. s. pulueris diape-
nidii cu3 speciebus. 3. i. pulueris radiceis inule, iridis. añ.
3. ii. s. succi glycyrrhizę. 3. i. s. cum syrupo de prasio quod
satis est, fiat ecligma. Thorax extrinsecus inungatur
oleis calidis liliorum alborum, irino, amygdalarum
dulcium, adiectis pinguedinibus & aliis, in hunc quidẽ
modum. ℞. Oleorum liliorum alborum, amygdala-
rum dulcium. añ. 3. iii. pinguedinis gallinę. 3. i. buty-
ri recentis. 3. ii. muci fœnigręci, radiceis althę. añ. 3. i.
s. styracis calamitidos. 3. s. pulueris radiceis inule, iri-
dis. añ. 3. i. croci. 3. s. cum cera quod satis est, fiat un-
guentum. Reliqua quę ad tussis curationem requi-
runtur, ex Capite de Destillatione petenda erunt.

De asthma.

Cap. III.

Asthmati-
ci.

Suspirio-
si.

Orthop-
noici.

Causa.

Qui citra febrem crebro respirant, quemad-
modum solent qui citatiore cursu fatigati
sunt, eos medici Greci Asthmaticos, Latini
Anhelosos & suspiriosos uocare p̄sueuerunt.
Eosdem etiam propterea quod thoracis corpus peni-
tus rectum habere coguntur, ob suffocationis timo-
rem, orthopnoicos nominant. Fit autem asthma, quum
aut crassorum humorum ac uiscosorum multitudo
pulmonis bronchiis fuerit infarsa, aut tumor quis-
piam

in abscessui similis in ipso cōstitit. Similiter au-
tem difficulter spirant, qui asperam arteriam à mul-
ta destillatione habent repletam. Facile autem inui-
dem hę passiones distinguuntur. Nam destillatio etiā
his ex manifesta causa repente accidit, in totum fe-
bre citra febrem, concomitantibus etiam propriis de-
stillationis signis. Si uero tumor abscessui similis in
pulmone fiat, necessariò febris consequitur: neque
diu post, inflammatione in pus transmutata, pus
relicitur cum tussi. Si autem crudum tuberculum ge-
neratur, hi neq; grauitatem magnam sentiunt, neque
difficultate spirandi admodum infestantur. Qui p-
rie asthmatici et orthopnoici appellantur, in totum
febrem non habent grauitatis uero sensus eis con-
tingit, neq; quippiam purulentum per sputum reie-
ciunt. Viētus ratio in uniuersum calida et sicca sit.
Vitandus itaque aer frigidus et humidus. Utendum
carnibus perdicum, auicularum montanarum, galli-
narum, caponum, et similibus. Fugiendi pisces, fru-
ctus, item legumina, et omnia alia quę crassos ac glu-
tinosos humores procreare possunt. Utendum fre-
quenter hyssopo, oreoselino, et fœniculo. Vini autē
potio ambabus conuenit affectionibus, saltem te-
nuis substantiæ. In uniuersum autem paucus potus
conuenit, quibus abscessus oboritur: multus uero,
quibus bronchia tenacibus et crassis humorib. sunt
obstructa. Etenim hos humores repurgantia medi-
camenta necessario tusses commouent. uerum non
facile per sputum relicitur ob crassitudinem id quod
repurgatum est: humectatione igitur multa indi-
get, quo facilius efferatur. Exercitio utendum ante ci-
bam at non subito, quod multi hac ratione extincti
sint. Frictiones etiam thoracis prosunt. Fugiat eger
irram, mororem, et alias animum uehementer pertur-
bantes affectiones. Porro curatio predictarum pas-
sionum quiddam commune habet, quiddam etiam

Signa.

Viētus.

Curatio.

F ii pro

proprium. Commune quidem utrisq; ut redundan-
tia humoris has passiones generantis consumatur
aboleatur. Proprium autem, ut si à crassis ac tena-
cibus humoribus fiat passio, per extenuantia & exten-
gentia medicamenta sanetur. Si uero à tumorib; a
scessui similibus oriatur passio, p extenuantia & ex-
cantia. Quę sanè curandi ratio omnibus in profun-
do corporis ab scessibus communis existit. In cras-
sis itaq; & tenacibus humoribus, conueniunt extenuan-
tia & abstergentia citra uehementem calefactionem
ab immodico si quidem calore, quemadmodū etia
frigore, prædicti humores magis crassescunt, coagu-
latur, & contrahuntur, ita ut subinde difficulter aue-
abstergiuè possint, Quapropter maxime prodest
oxyineli scylliticum, ipsaq; scylla assa, cum melle
ta & delineta. Syrupus item de glycyrrhiza, de prasi
aut hyssopo, & decoctum quod suprā in Capite
Tussi commemorauimus. Quod ad euacuationem
attinet, si necessitas urgeat, uena in cubito media
aut interna ante hæc omnia incidenda, & tantum sa-
guinis quantum uires patiuntur detrahendum. Si
corpus plethoricum non fuerit, facta humorum
euacuationem preparatione, medicamenta quę cras-
sos & tenaces humores uacuare possunt, frequenter
exhibenda. Conueniunt in hunc usum pilule de ag-
rico, & cochleę. Confectio diaturbit cum rhabar-
ro, ecligma Indi, diaphenicon. Dandum etiam disti-
tū agarici, quod præcedēti Cap. descripsimus. Alui
quoq; clysteribus fortibus eluenda. Vomendū etia
per interualla ex sumpra radícula, & aliis quę uon-
tum mouent, de quibus diximus lib. 1. Cap. 20. In-
tea dum frequentior fit purgatio, exhibenda etia
medicamenta quę sensim & paulatim extenuare &
discutere humores in thorace possunt. Intro corpu
quidem, aristolochia rotunda, inule & iridis radi-
semen urticę, hyssopus, nigella, calamintha, & eiu-
mod

Prepara-
tio.

Vena se-
ctio.

Purgatio.

odi, ex quib. decocta uel ecligmata construenda. hunc usum loch, quę in Cap. de Tussi recensui-
us, conuenient. Thoraci forinsecus cataplasmata
ficub. & hordeacea farina, cui adiecta sit resina, ce-
& mel imponenda. Vnguenta etiam & olea magis
alefacientia, irinum, anethinum, & rutaceum admo-
tenda thoraci, in hunc confecta modum. R. Oleo
anethini, rutacei. añ. 3. iiii. s. adipis anatis, gallinę. añ.
ii. radicis iridis, inulę. añ. 3. i. le. lini. 3. i. styracis ca-
amiridis. 3. iiii. cum cera quantum sufficit, fiat unguē-
tum. Thorax tamen nunquam non antea fricandus
panno aspero, quo apertis meatibus facilius uis me-
dicamentorum ad profunda penetrare possit. Cæte-
rum abscessus qui attenuantibus & resiccantibus indi-
gent, ut diximus, maxime aromatum gaudent facul-
tatibus, quas omnes constat esse tenuium partium &
resiccatorias, nec non calefacere. Conuenient itaq;
tum theriaca, mithridatis confectio, diamoschi dul-
cis, aromatici rosacei, & similes.

Cataplasmata.

Vnguentum.

abscessus
curatio.

De pleuritide.

Cap. V.

PLEURITIS est inflammatio membranę, intrinse-
cus costas succingentis. Fit ex sanguine co-
pioso calido, ut alię inflammationes, ad mem-
branas predictas præter naturam confluente. Hujus
accedit spirandi difficultas, tussis, febris continua,
dolor uehementer pungēs, pulsus durus, & ferre mo-
do asper. Et si sputum rubrum & cruentum fuerit, san-
guinem superare significat. si flauum & subpallidū,
flauam bilem. Quemadmodum rursus, si album fue-
rit, & leuiter spumofum, pituitam; nigrius uero, me-
lancholiam in sanguine præualere monstrabit. Suc-
co ptisanę primis duob. dieb. contentus in cibo sit
eger. Dein cum ptisana amygdalę mundatę & tritę
decoquantur, idq; matutino potissimum tempore.
Vespere sumat lac amygdalarum, aut panis puri mis-

pleuritidis
Causa.

Nota.

Videtur.

F iii cas

Curatio.
Vena se
ctio.

2. Visc.
cul. 10.
Clyster.

Fomenta.

Empla-
stra.

cas cum iure gallorum, maxime ubi egri vires imbecillas uideris. Pisces etiam saxatiles in declinatione potissimum morbi dare conuenit. Acerba et adstringentia omnia uitanda. Potus sit, aqua decocti cinnamomi. Frigidam aquam, quod sputum incrudescere faciat, uitabit æger. Decumbat in latus affectum, iramque et mororem fugiat. Curandi ratio confecti à uene sectione incipienda. Secunda uero uena cubiti interna in brachio è directo posita. hæc enim non solum à loco affecto retrahit, uerum etiam euacuat, ut in nostra Apologia ea de re conscripta fusissime demonstrauius: id quod in pleuritide et aliis inflammationibus internis maximopere requiritur. Eousque autem detrahendus sanguis, donec uel multo rubicundior, teste Hippocrate, uel pro puro rubidoque, liuidus effluerit. Dein clyster aluo infundatur leuis, si non ut conuenit, sua sponte deiciat. qualis est qui. ℞. Maluæ, foliorum uiolarum, mercurialis, spinachie, intybi domestici utriusque. añ. M. i. hordei integri. ʒ. i. Coquantur in aqua iustę quantitaris, quoad tertia pars absumatur. ℞. Colaturę libra 3 unam, casie recens extractę. ʒ. i. s. oleorum chamæmelini, uiolacei. añ. ʒ. i. s. butyri recentis salis inexpertis. ʒ. s. salis communis. ʒ. i. misce, fiat clyster. Forinsecus à corporis uacuatione calorifica ac dolo rem leuantia fomenta adhibenda erunt, ut sunt sacculi ex floribus chamæmeli, anethi, meliloti, phlomis (tapsum barbatus nominant) seminibus lini et fænigræci, milio et furfure compositi. Aqua etiam calida, aut decoctum prædictorum medicamentorum, aut olea calida in utre, uesica, uel uasculo adhibenda. Quinetiaque utiliter admouetur sponsia magna mollisque, iam dictis rebus intincta, et subinde expressa. Vestienda uero fomenta sunt, ut eorum uis non celeriter euanescat. In hunc etiam usum conuenient emplastra, in eum modum composita. ℞. Florum

lorum chamæmeli, uerbasci (tapsum barbatum uo-
ant) anethi. añ. M. s. seminis lini, fœnigræci. añ. 3.
i. seminis anisi. 3. i. faring hordei p. i. Buliant in aq̃
sq̃ ad mellis crassitudinem. Dein adice oleorum
hamæmelini, anethini, nardini. añ. 3. i. s. Buliant de
uo, & addantur duo uitelli ouorum, croci. 3. i. & fi-
t emplastrum. Post septimum diem, si eodem modo
color persistat, cucurbita lateri affigenda est, & cutis
scarificanda. Manifestissima enim in pleuritidis uti-
tas ex cucurbitæ appositione apparet. Vulnuscula
autem scarificati loci sale inspergenda, si egri sustine-
re queant. in aliis uero linteolum oleo madefactum
adiale conspersum imponatur. Sequenti deinde à
scarificatione die optimum est, rursus cucurbitam
affigere, quo sanguis saniosus ex impactis uulnusu-
lis extrahatur. Non negligat etiam medicus exhibe-
re intro corpus ea quæ ad sputi facilem excreatio-
nem faciunt medicamenta, ut sunt diapenidion, dia-
dragacanthum frigidum, saccharum uiolaceum, tro-
chisci pectorales, adiectis etiam interdus loch, & aliis
in Cap. de Tussi commemoratis. Extrinsecus adhi-
benda medicamenta quib. discutiendi inest facultas
ut sunt fœnumgræcum, anethum, melilotum, hyssop-
us, & similia iam sepe commemorata. Quod si per-
mutationis in pus signa appareant, coadiuuare per-
mutationem oportet, hoc autem simili unguento:
quod. R. Oleorum chamæmelini, amygdalarum dul-
cium liliorum alborum. añ. 3. iii. butyri salem nō. ex-
pertis, pinguedinis gallinæ. añ. 3. ii. cere quod satis est
fiat unguentum. Rupta phlegmone, ea quæ ex terget
atq̃ purificant à pure ac sanie exhibenda: ut est aqua
mellis, aut decoctum, hordei, aut sacchari rubei. Fa-
cta absterfione puris & saniei, glutinantia adhiben-
da medicamenta: de quib. omnib. in Cap. de phthisi
copiosè dicemus.

E iiii De

Cucurbita

Spull eda
Elionez fa
cillem fa
cier.lla
collige. i. bi. si
Chalig. i. bi. si
Suppura
tionem lu
uant'a.
Vnguen
tum.

Peripneu
monia.

Causa.

Signa.

Vicus.

Curatio.

Peripneumonia est inflammatio pulmonis, cui febre acuta. Hec plurimum ex ualentibus in pulmone destillationibus, aut angina, aut asthma, aut pleuritide aliisue morbis contrahitur. Aliquando etiam ipsa inflammatio passionis origo est. Huius affectum subsequitur difficultas spiritus, febris acuta et ardens, grauitas distensioque thoracis citra dolorem. Quod si pellicule ipsius, que cum thorace secundum longitudinem ipsius sunt connexę, fuerint inflammate, etiam dolorem percipiunt. Male in his rebus, natus in summo fit sinus, uenę temporum eluantur, oculi intumescunt, prostratus est appetitus lingue adest siccitas, aque frigide, magis autem aeris frigidi concupiscentia, expiratio calida, tussis sicca. Si uero quid efferatur, spumosum est ac biliosum, ampliusque cruentum et floridum uehementer. Quod ad cibum attinet danda est peripneumoniceis sorbitio ex ptisanę cremore cum melle, origano aut hyssopo: magis enim quam in pleuritide, extenuatoriis cibis opus est. Chondrus etiam seu alica cocta ex aqua mulsa iis conuenit. Potus exiguus sit quantitate, humiditas enim nocet pulmoni. Possunt uirtutis tuende gratia, potissimum si suffocatio urgeat uti mulsa per se, et cum nucleis pineis: aut mulsa in decoctum sit hyssopum aut iris sicca aque mulse inspergenda. In uniuersum autem uictus ratio eorum qui peripneumonia afficiuntur, eadem fere sit quam pleuriticorum. In iis qui ex aliis morbis in hunc incidunt affectum, sanguinis detractio uitanda est, maxime si diu malum hoc durauerit, uel si per initia sanguine miserint. Alius clysterib. ducenda, si egre deiecit aut cucurbitule, ubi nihil obstat, thoraci et lateribus admouende sunt, exque per grandes et multe, cute incisa. Sin autem peripneumonia statim ab initio inuaserit,

alerit, confestim uena in cubito interna secāda est, si sustinuerint uires, ex utroq; brachio sanguis ex-
rahendus: primus quidem modicus, & non usq; ad
nimi defectiōem, ut uidelicet asseruetur ad repetē-
tam extractiōem. Si uero quid prohibeat uenę se-
ctiōem, cucurbitulas certe uniuerso thoraci late-
ribusq; affigere opz iisq; tantuz sanguinis eliciendū,
quantum uires patiuntur. Aut acri clystere aluum
oluere conuenit ex decocto nimirum hyssopi, iridis,
rutæ, adiecta colocynthide, sale & aliis quę suprà in
Cap. de Apoplexia dicta sunt. Posthęc curanduz ut
sputi educiō quā celerrime & facillime fiat. In quę
sanē usum ea quę suprà in Cap. de Pleuritide memo-
rata sunt eccligmata, unguēta, & emplastra cōueniūt,
tantum in eo diuersa, quod hic omnia ualentiora, &
maiori extenuandi facultate prędita esse debent. Cō-
uenient itaq; loch, decoctum hyssopi & iridis, oleum
rutaceum, nardinumq; ceratum ex oleis iaz dictis, te-
rebinthina, medulla ceruina, iride & hyssopo tenuissi-
mē tritis p̄fectum thoraci & lateribus impositum.

Sputi edu-
ctio.

De cruento sputo. Cap. VII.

Aιμοπύσις aut rectius αιμπτυσις, est sanguinis
sputio seu reiectatio. Fit ex causa interdum
externa & manifesta, nempe delapsu ex alto, aut
si grauius aliquod corpus thoraci inciderit, clamo-
re magno aut frigore, nam id rumpere uenas scribit
Hippocrates, & consimilibus; Nōnunquam ex occul-
ta, ueluti plenitudine, aut oris uenarum apertione,
aut earundem erosione. Venarum autem ora aperiū-
tur ob calidas dispositiones pręcedentes, ueluti si ca-
lidis balneis plurimis usus sit homo, habiterq; in ca-
lida regione, consimili existente maximē anni tēpo-
re, cibus quoq; & potionibus calidis utatur. Ipsa uero
ualorum erosio ex acribus contingit humoribus, si
ne à capite in pulmonem delabentibus, seu in ipso
pul-

Αιμοπύ-
σις.

Causæ.

6. Epid.

par. 3.

Apb. 19.

Signa.

pulmone generatis. Porro sanguis modò ex thora-
 ce et pulmone, aut aspera arteria educitur: modo ex
 aliis locis, oris, aut gingivarum, aut faucium, aut co-
 lumellæ, aut uentriculo, ad quem ex uenis ac partib.
 adiacentibus, iecore nimirum et liene, sanguine dela-
 bitur. Cause externe et manifeste è sermonibus æ-
 grotantis aut assidentium cognosci possunt. Si ob
 plenitudinem accidit, tum confertim sanguis reiici-
 tur. At si propter oris uenæ apertionem, tum ea quæ
 diximus præcesserunt, et neq; inflammationes, neq;
 febres, neq; labores torquent, sicut in iis euenit q ob
 exetias uenas sanguinem expuunt, sed contrà uacua
 ti melius leuiusq; agunt. Si uero ex uenarum erosio-
 ne cruentum sputum editur, non confertim, sed pau-
 latim sanguis reiicitur, et semper peius habent. Cete-
 rum sanguis qui spumosus et subalbidus atq; ex in-
 teruallo cum tussi absq; dolore reiicitur, ex pulmo-
 ne fertur. Si uero pituitosa cum tussi leuiore reiiciã-
 tur, ex aspera arteria prodire scito. Si ater sanguis et
 in grumum concretus fuerit, doloremq; in loco in-
 tēdat, ex thorace educi significatur. Si uero ex locis
 circa fauces aut columellam sanguis feratur, per ex-
 creationes excernitur. Si uero ex aliquo loco oris
 aut gingivarum, simpliciter expuitur. Accidit autē
 nōnunquam per palatum sanguinem educi, propter
 hirudinem deuorata, et alicui indidem particula
 adhærescentem, id quod localis dolor qui concomi-
 tatur patientēz particulam, et sanguis ipse qui tenuis
 est et serosus, ostendent. Si ex stomacho educio fiet,
 non magna sanguinis eruptio continget, graciles
 enim stomachi uenæ. Si uero ex iecore et liene san-
 guis in uentrem deferatur, aderit tumor. Si autem
 a capite sanguis feratur, titillatio palati accidit, et fre-
 quens excreatio, atq; hoc modo expuunt; irritantur
 enim ad tussim, et tamen non ualde tussunt. Sanguis
 etiam colore niger est, mixtus cum aliquo pure uel
 pituita,

ituita, & cum excreatione statim se in linguam in-
 ert rotundus, facileq; reicitur per sputum. **Victus** **Victus.**
 tio fit talis quę moderatam quandam adstringen-
 ti facultatem obtineat. Utatur itaq; oryza, alica, fru-
 mentaceisq; aliis cibis, quibus succus mali granato-
 rum, aut pirorum adiectus sit. Conuenient ex carni-
 bus columbe syluestres, turdi, perdices, si cum ompha-
 cio seu uua acerba rhoë oboniorum coquantur.
 Utendum etiam cotoniis, piris, pomis adstringenti-
 bus, rubi, & aliis supra in Capite de profluvio san-
 guinis narium memoratis. Bibendum uinum crassū
 ubeum, aut pro eo aqua, in qua chalybs ignitus ex-
 inctus est. Cauendum ab iracundia, clamore, frequē-
 ti locutione & omni corporis motu. Curandi ratio
 iuxta causarum diuersitatem uariatur. Si enim à ca-
 pite feratur sanguis, simplicior & exigua sufficit cu-
 ratio. Adstringentia enim per collutiones palato ad-
 hibita frigida, nisi quod defertur multum sit, cura-
 tionem perficient, quę sanè ex Cap. de Columellæ
 inflammatione petenda sunt. Multum enim si à capi-
 te defluerit, euacuatione sanguinis per nares, aut ue-
 ne alicuius incisione opus erit. Qui ob destillatio-
 nem sanguinem expuunt, his statim in principio ue-
 nam incidere oportet, ac pro uirium modo sangui-
 nem detrahare. Clysteri etia; adhibito alius euacua-
 da. Deinde frictis quàm plurimum brachiis ac cruri-
 bus extremitatibus eorum partes ligentur. Postea uero ca-
 piti raso medicamentum cui exiccandi & discutiendi
 facultas inest, quale est quod ex fimo syluestrium co-
 lumbarum constat, imponendum. Aliaq; deinceps
 omnia quę destillationem reprimere & sistere pos-
 sunt, de quibus suo diximus loco, adhibenda. Qui
 ex pulmone sanguinem reiciunt, ruptis scilicet ue-
 nis, aut earundem oris patefactis, iis præcipiendū in-
 primis ne respirent ualde, sonumq; edant, & ut parū
 loquantur & sileant. Incidere etiā statim uenā oportet.

Curatio
 sanguinis
 a capite
 destillan-
 tis cura-
 tio.

Curatio
 eorum qui
 ob destil-
 lationem
 sanguinis
 expuunt.
 Frictio.

Curatio
 eorum qui
 ex pulmo-
 ne sangui-
 nem reici-
 unt.

Adstringe
gentia.

Ecligma.

Unguen-
tum.

ret in cubito internam, ac sanguinis detractionē bis
aut etiam ter reiterare pualatim reuellendi gratia.
enim euacuatione copiosa indigent tales, nimirum
à passione ipsa euacuati. In hunc sanè usum frictio-
nibus extremitatum, & earundem cum latis lintheo-
lis constrictione & ligatura utendum. Postquāz hæc
peracta fuerint, primum quidem poscam dilutam &
tepidam bibendam exhibere conuenit, ut si quis san-
guinis grumus in uiscere hæreat inde dissolutus eii-
ciatur, neq; quicquam obstat bis & ter in tribus ho-
ris hanc potionem iterare. Post hæc autēz medicamē-
ta adstringentia & obstruendi meatus uim habentia
intrinsecus & extrinsecus adhibeantur. Per os quidē
sumpta proficiunt portulaca comesta, succus autem
eius bibitus efficacior est; succus plantaginis, poly-
goni, uue acerbe, decoctus rhois (sumach appellant)
gallę, corticis glandium, radicis rubi, balaustiorum,
seminis oxylapathi, radicis equiseti, & aliorum quę
in Capite de Sanguinis ex naribus profluuiū dicta
sunt. Vtus etiam sit huius ecligmatis, quod. R. Con-
serue rosarum ueteris, rob de ribes. añ. 3. i. diatraga-
canthi frigidi, diacitoniton simplicis. añ. 3. s. pulue-
ris corallorum, lapidis amatidos, terrę lemnie (si-
gillatam uocant.) añ. 3. ii. boli armenie. 3. i. sangui-
nem draconis. 3. s. balaustiorum, thuris. añ. 3. i. s. cum
syrupo myrthino quod satis est, fiat ecligma. Extrin-
secus thorax ex uino adstringente oleisq; cotoneo-
rum, rosaceo, aut myrthino irrigandus. Si uero mul-
ta sanguinis eruptio fiat maxime in estate, & citra tus-
sim eius reiectiones contingant, neq; debilis sit eger
sed robustus & carnosus, acetum pro uino aduouen-
dum est spongiis exceptum. Proderit iam dictis oleis
adiicere bolum armeniam, terram lemniam, coral-
los, & similia, ac cum cera componere unguentum
quale infra lib. 3. Cap. 3. describemus. Cataplasma
quoq; ex palmulis (dactylos uocant) acatia, sym-
phyti

hyti radice, cortice mali granati, & lentium farina
 pparatum, adhibendum. Nec minus confert quod
 x carnibus malorum punicorum, thure, corallis
 ubeis balauftiis, bolo armenia, terra lemnia, & eius-
 nodi componitur. Maximum enim hoc est, cui dili-
 genter animum attendere oportet, ut mox facta ua-
 sorum ruptura, & dum adhuc cruentum est uulnus,
 concreſcat priusquam inflammatio apprehendat.
 Etenim ſi inflammatio præuenerit, parum ſpei eſt ad
 huiusmodi uulneris conglutinationem, quippe quæ
 ſe in multos dies extendit. Eluere enim oportet tu-
 pus, tum ſeroſum ſanguinem ipſius ulceris, poſtea-
 quam inflammatio fuerit ſoluta: reliquam autem
 curationem, quemadmodum in tabidis fieri ſolet,
 ordinare oportet. Qui ab eroſione ſanguinem ex-
 puunt, iis primum quæ acres humores in pulmonem
 deſtillantes purgare poſſunt medicamenta exhiben-
 da, ut in Capite de Deſtillatione dictuſ eſt. Deinceps
 ea quæ alterare & incrāſſare acres & tenues humores,
 atq; adeo ſiſtere deſtillationeſ ualent, ut eſt ſyrupus
 uiolarum, roſarum, myrthinus, miua cotoneorum,
 & alia quæ paulo ante memorata ſunt. In hunc uſuſ
 interdum ſyrupum de papauere, & alia narcotica &
 ſtupefacientia adhibemus. Deſtillatione ceſſante,
 corroſe partes cibus boni ſucci, & medicamentis car-
 nem generantibus reſciantur. Porro qui uomunt
 ſanguinem, eadem uictus ac curandi ratione, quæ an-
 tea dicta eſt utantur, ſola hac cura adhibita, ne cre-
 bro cibum, aut potum ſumant. Quippe facile curan-
 tur, ſi auxilia quæ bibuntur particulis ipſis ſanguis-
 nem fundentibus applicentur. At ſanguine in uen-
 triculo inſtar grumi concreto, coagulum potandus
 eſt, maxime leporinum, uel thymbra ſeu ſatureia cū
 aceto, uel ex aloë ſic affecti uacuari debent. Qui
 per palatum ſanguinem excreant, gargarizabunt ex
 adſtringentibus, frontiſq; & capiti admouenda ſunt
 quæ

Curatio
 eorum qui
 ab eroſio-
 ne ſan-
 guinem
 expuunt.

Curatio
 eorum qui
 uomunt
 ſanguinem

Curatio
 eorum qui
 per pala-
 tum ſan-
 guinem
 excreant.

que ex naribus sanguinem fundentibus accommo-
dantur. Porro postquam omnia, ut postulat ratio,
peracta fuerint, et sanguinis fluor substiterit, vires ip-
sis reficiendæ sunt, roburq; adhibendum. In primis
autem cauendus frequens usus balnei, uini potio,
ira et uenus.

De Empyemate.

Cap. VIII.

Emplema

Causa.

S. aph. 10.

Signa.

EΜΠΥΗΜΑ, purulenta excreatio atque suppuratio
Latinis diciſ. Et ἐμπύημα, hoc est suppurati seu
purulenti uocant. Fit quando abscessus in mē-
bra intrinsecus costas succingente, aut aliqua alia
thoracis factus aceruatim rumpitur, et in uacuoꝝ tho-
racis locum effunditur inter pulmonem, et membra-
nam costas succingentem. Interdum propter sangui-
nis eruptionem ulcere ad cicatricem non perducto,
interim etiam propter confluxum ex capite et aliis
partibus superioribus illuc manantem, ut in angina
iuxta hoc Hippocraticum: Quicumque ab angina li-
berantur, his ad pulmonem uertitur, et in septem die-
bus pereunt; si uero has effugerint, suppurantur.
Cognosces autem suppuratos hoc pacto. Grauitas
adeſt thoracis, tussis ualida siccaq; cum dolore, ali-
quando etiam cuꝝ humiditate, ob qua releuari quo-
que uidentur, febricula per initia affligit, languida,
inordinata, et ad iudicandum difficilis. Postquam ue-
ro ruptura abscessus iam appetit, uehementius cum
quodam horrore febricitant, ac in sermone contur-
bantur, offendunturq; spiritu. Rupto abscessu ali-
quid in profundo thoracis transfluere apparet, iux-
ta multiplices reſclinationis permutationes, et maxi-
me quum ab uno latere in alteruꝝ decumbunt, tunc
sanè multitudo puris manifestatur, et fluctuationis
cuiusdā sonitus sepe sensibiliter in reſclinationibus
ipsorum auditur. Pus etiam educitur, nunc purum,
nunc saculentum. Erumpunt autem suppurationes
alique

quæ quidem sursum in uacuum uidelicet thoracicum locum, & hæ periculosiores existunt. Aliquæ uero sursum, & hæ quidem in aluum & intestina ac uesicam transfunduntur, per uasa quædam transmissione eas partes facta. Semper autem hectica febris laborant suppurati, quoad sursum omnia fuerint educuntur. Victus ratio suppuratorum talis sit. Aërem inhibent siccum. Cibis utantur boni succi & concocti facilibus, iure gallorum, carnibus gallinæ, pullo, animum montanarum; iure etiam cicerum cum herbis hyssopo, & oreoselino (petroselinum officinae vocant.) Potus sit aqua mulsa, aut uinum album ac melle. Porro nisi in iis summa adhibeatur diligentia, protinus purulenta illa collectio tabes accersit. Primum igitur puris concoctio & digestio adiuuanda fomentis per spongas, cataplasmatibus & emplastris hordei, foenigræci, & seminis lini farinis, caricis, linguis, columbarum fimo, althea, & resina modice compositis. Cerata etiam ex butyro, iride, baccis auri & ruta confecta adhibenda, & alia quæ collectiorem maturare & discutere possunt: qualia multa in Capite de Asthmate dicta sunt. Posthæc si malum non discutitur quæ abscessum rumpunt admoventur. Rupturam autem promouet in latus sanum decubitus, salsorum esus, & catapotia illa dormituro data, quæ. R. pulueris hieræ picræ Galeni. 3. i. pulpæ, colocynthidis. 3. i. cum succo absinthii fiant pilule, quarum una aut altera teneatur in ore. sic enim eger expuere conabitur, ac nimium expuendo abscessus rumpetur. Ruptione facta diligenter animaduertendum erit quo pus proreptet. eius enim excretionem adiuuare oportet. Quod si ad aluum prorepat, magis emollientia sint ea quæ offeruntur. Si uero ad uesicam serpat, ea quæ urinam magis cient adhibenda. Si uero per tussim puris repurgatio fiat, nihil conuenientius aut familiarius exhiberi potest, quàm ptisana optio melle permixta.

Victus.

Curatio.

Rupturam
abscessum.

Pur repur
gantia.

mixta. Possunt etiam ea abstergentia quæ par-
Cap. de Pleuritide dicta sunt, et partim subinde in
Cap. de Tabe dicuntur exhiberi. Ceterum quæ urina-
cient, cibis comode admiscuntur, undecumque tandem
puris excretio contingat. Ad puris uero repurgatio-
nem mirifice utilis est aqua mulsa cum iride, et plu-
ma glycyrrhiza decocta. Radicis etiam dulcis succi
comanducatus prodest. Conuenit et decoctum hyssopi,
iridis, marrubii, et similia quæ ex Cap. de Asthma
petenda erunt. Porro quæ deinceps in curatione suppu-
ratorum necessaria sunt, ea in sequenti Cap. dicemus.

De tabe.

Cap. IX.

Tabes.

Causa.

Signa.

5. aph. 14

5. aph. 11

5. 12.

Curatio
cur diffi-
cile.

Videtur.

TAbes quam *ῥαβδία* etiam Greci appellant, pro-
prie est corporis extenuatio quæ pulmonis ex-
ulceratione sequitur. Fit propter humoris acris
et erodentis à capite in pulmonem defluxum. Et quæ
puris aut sanguinis eruptio in suppuratis, peripneu-
monicis, et pleuriticis cohibetur. Tabidi cognoscun-
tur corporis totius et carniū extenuatione, nares
etiam iis acute, collapsa tempora, oculi concaui, spa-
ruleque instar alarum prominent. Tussunt quoque ac
febre hectica febriunt, difficulter spirant, genæ liue-
scunt, ungues curuatur, pallidi que apparēt. Malo uin-
cente, uenter turbatur, sitis ipsos magis conficit, ca-
pilli defluunt, et id quod per sputum reicitur uehemen-
ter foedi odoris est. Difficillime autem curantur ul-
cera pulmonis, propterea quod citra tussim non re-
purgantur. Tussientibus autem ulcus dirumpitur,
atque quasi circuitu quodam malum reuertitur. Med-
icamentorum præterea uires ad ulcus priusquam in
uentriculo permutentur peruenire non possunt. De-
nique per respirationē pulmo semper mouetur, ac tui-
fiendo lacinatur. Vt cumque aut difficilis sit curatio,
tamen nihilominus conandum ut ulceratio illa curetur.
Primum itaque curandum, ut conuenienti uictus ratioe
utantur.

utantur tabidi. Aërem siccum et in calore et frigore
temperatum inhabitent. Cibus illoz sit ptisana hor
dei, lac amygdalarum, oua sorbilia, carnes auiū mō
tanarum, perdicum, phasianorum, merularuz, turdo
rum, gallinarum, caponum, uituline, hedi lactantis.
Pisces squamati, saxatiles, potissimuz uero cancri flu
uiatiles. Lac uero inter omnia cibaria tabidis opti
mum, primum humanum, dein asininum et caprinū,
quod ex mammis, si fieri potest, sugatur, aut statim
mulctum dum adhuc calet bibatur, quēadmodum
fussimē Galen. lib. 5. Ther. meth. docuit. Animad
uertendum tamen ut statim à lactis usu alius cibus,
potissimum uero uinum, non sumatur, quod sic in
uentriculo corrumpetur. Quod si tamen impen
se febricitarent, putrida maximē febre, lactis usus
non cōduceret. Inter fructus prosunt passule, amyg
dale dulces, nuces pinæ, ficus, palmulæ, (dactylos
uocant) pistacia. Exercitia et motus uehementes de
uitent, suauiter tum ante cibum deambulare haud
incommodabit, à cibo penitus quiescant. Somno
utantur nocturno et mediocri. Fugiant iram, tristi
ciam, uigilias immodicas, famem, sitim, coitum, laco
nicuz, et quicquid corpus exinanire potest. Potus sit
uinum aquosum et tenue, aut si febris est uehemens,
cinnamomi decoctum, aut Hippocras uulgo nomi
natum, cuius compositionem pete ex Cap. de Reso
lutione. Curandi uero ratio si à defluxu humoris
acris ex capite fit, à destillationis amolitione incho
anda erit, quam peculiari Capite suprā docuimus.
In præsentia quæ ulcerationez pulmonis curant do
cebimus. In primis itaq; quæ abstergendi ui prædita
sunt, et quæ ut facile pus sursum feratur efficiunt ex
hibenda erunt. In quem usum conuenit hydromeli,
decoctum hordei cum saccharo et melle. Item hyssō
pi, iridis, caricarum, adianti, et similium. Syrupus
de hyssopo, prasio, et glycyrrhiza. Si febris accedit,
G semi

Curatio.

semina frigida prædictis comisceri haud inutile erit. Extrinsicus ad mouenda emplastra & cataplasmata ex semine lini, fœnogræco, & aliis in Cap. de Empyemate memoratis. Ex Cap. etiam de Asthmate multa remedia ad præsentem usum conducentia petenda erunt.

*Glutina-
tia.*

Absterfo iam & à pure purgato pulmone ea quæ ulcera eiusdem glutinare possunt medicamenta sunt exhibenda. Commendatur in hunc usum ab omnibus saccharum rosaceum, quod & abstergendi & glutinandi facultatem obtinet. Abstergit autem magis recens, glutinat uero antiquius. Mirifice etiam confert bolus armenia, sanguisq; draconis (hodie appellatus,) succinum coralli, se. portulacæ, & similia quibus adstringendi & glutinandi facultas inest. Prodest etiam loch de pulmone uulpis, conserua symphyti

Ecligma.

maioris & adianti, ut. ℞. Conseruarum symphyti maioris, adianti, hoc est, capilli ueneris. añ. ʒ. s. sacchari rosacei. ʒ. i. loch de pulmone uulpis. ʒ. ii. specierum dragacanthi frigidi. ʒ. iii. boli armenie. ʒ. ii. cum syrupo de papauere fiat ecligma. Conueniet etiam is puluis quotidie exhibitus, qui. ℞. Se. papaueris albi. ʒ. v. gummi arabici, amyli, dragacanthi. añ. ʒ. i. s. seminum portulacæ, altheæ, maluæ. añ. ʒ. ii. s. seminum cucumeris, melonum, citrulli, cucurbitæ, cotoneorum. añ. ʒ. iii. s. Eboris usti, succi liquiritiæ. añ. ʒ. i. s. penidiorum ad pondus omnium & fiat puluis, de quo mane dentur quotidie. ʒ. ii. cum syrupo de papauere, aut rosaceo.

Puluis.

Hoc quoq; tempore quo cicatrix obducitur, extrinsecus thoraci oleum myrrhinum, aut rosaceum adhibendum, adiectis interdum rhoë obsoniorum, hypocisthide, malicorio, acatia, galla & similibus. Postremum corpus iusta & conuenienti uictus ratione reficiendum, in quem usum mirifice confert hoc medicamentum quod. ℞. Pulpe caponis. ʒ. i. testiculorum galli, nucum pinearum, pistaciorum, amygdalarum dulcium. añ. ʒ. s. specierum ecligmatis de gemmis. ʒ. s.

*Vires re-
parantes
mor juli.*

specie

specierum diarhodon abbatis, dianthos, aromatici
rosacei. añ. 3. i. santaloꝝ alborum, cinnamomi electi
añ. 3. s. maceris. 3. i. sacchari cādidissimi lb. i. dissoluti
in aq̃s boraginis ⁊ rosarum fiat ꝑfectio in morsulis.

De cordis palpitatione.

Cap. X.

Cordis palpitatio est passio, quam alio nomine *cordis pal-*
tremorem cordis appellant. Practicarum uero, *pitatio.*
ut uocant scriptores, perperam cardiacāz nomi-
nant. καρδίακῆν enim ad stomachum, quēz ueteres oliz
καρδίακῆν dixerunt, pertinet, ut alibi copiosè monstra-
uimus. Fit ab omni eo quod cor præter naturāz affi- *Causa.*
cere potest, ut est intēperies omnis, aut humoris mul-
tudo in ambiente cor tunica contenta, aut tumor
præter naturam, ⁊ alia quæ à Galeno lib. 5. de Patiē-
tibus locis Cap. 1. recensentur. Dignoscitur facile *Signa.*
de sermonibus egri palpitationem hanc euidenter
sentientis, ⁊ ex pulsu. In calida intemperie febris, ⁊
pulsus uelox atq; magnus existit. In frigida, contra.
Si humoris multitudo in pericardio contenta palpi-
tationem fecerit, pulsus est mollis ⁊ languidus. *Vi-*
ctus ratio iuxta causas morbuꝝ efficientes uariatur. *ctus.*
In calida itaq; intemperie aēr sit mediocriter frigi-
dus, in frigida, mediocriter calidus. Quapropter
ad eum modum, quem in doloribus capitis curan-
dis exposuimus, instituatur. In uniuersum autem ui-
tandum q̃cqd spiritum uitale resoluat ⁊ ꝑturbat: ni-
mius estus, ira, fames, uigilia, coitus, frigus immodi-
cum, cibi mali succi. Si multitudo humoris in ambiē-
te cor membrana contenta palpitationem procrea-
uerit, tota diēta sit extenuatoria. Potus in calida in-
temperie sit uinum aquosum ⁊ tenue, aut iuleb uio-
larum, uel rosarum, aut decoctus buglossi (quod ho-
die borrago dicitur.) In frigida uinum meracius bi- *Curatio*
batur. Qui ob calidam intemperiem palpitatione *calida in*
corripiuntur, iis per frigida quē intēperie corrigere, *temperiet*

G ii ⁊ cor

& corroborare possunt succuriendum: ut ex simpli-
 cibus medicamentis sunt rosę, uiolę, nymphę flores
 sautali, coralli, caphura, & similia. Ex cõpositis dia-
 margariton, diarhodon abbatis, saccharum rosaceũ
 uiolarum, buglossi, & earundem herbarum succi &
 syrupi. Ex iis potiones, ecligmata & confectiões p
 uniuscuiusq; arbitrio componi possunt. Extrinse-
 cus admouenda unguenta, emplastra: potissimuz au-
 tem epithemata & sacculi, & alia quę calidam intem-
 periem alterare possunt. Tale itaq; unguentum cõ-
 ponatur, quod. *R.* Oleorum rosacei, uiolacei, nym-
 pheę. añ. 3. ii. corallorum rub. santalorum rub. rosacei
 rub. añ. 3. i. caphurę gr. ii. cerę albę quod satis
 est, fiat unguentum. Potest eo spina dorsi, aut cordis
 regio inungi. Imponatur cordi hoc epithema quod
R. Aquę rosarum, acetosę, buglossi. añ. 3. iii. aquarũ
 melissophylli. 3. i. specierum confectiõis cordialis.
 3. i. santalorum rub. corallorum rub. añ. 3. s. caphurę
 gr. iii. croci gr. iii. misce, fiat epithema. vel fiat hic sac-
 culus qui. *R.* Florum buglossi, uiolarum, rosarũ rub.
 añ. p. i. santalorum omnium. añ. 3. i. corallorum rub.
 & alborum. añ. 3. i. s. margaritarum. 3. i. Redigantur
 in puluerem, & cum serico fiat sacculus. Ceterum q
 frigida cordis intemperie laborant, iis profunt am-
 bar, moschus, crocus, lignũ aloẽs, styrax, gariophyl-
 li, macer, zedoaria, melissa, & similia. Ex cõpositis dia-
 mbre confectio, dianthos, aromatici rosacei, plirilar-
 coticon. Ex iam dictis uaria remediorũ genera cõpo-
 ni possunt, haud secus quàm in calida cordis inten-
 perie. Conuenit aut potissimum hoc unguentuz q
R. Oleorum de lilio, de spica, de croco. añ. 3. ii. galli-
 moschatę, aliptę moschatę. añ. 3. i. ligni aloẽs. 3. s.
 maceris. 3. i. croci gr. iii. cerę quantum sufficit, fiat un-
 guentum. Epithema q. *R.* Aquarum melissę, maior-
 nę, buglossi, añ. 3. i. specierũ diambre, diamoschi. añ.
 3. s. maceris, ligni aloẽs, añ. 3. i. ambre gr. i. uini opti-
 m

mi. 3. i. misce, fiat epithema. Sacculus qui. 8. Florum *Sacculus*
 melissę, buglossi. añ. M. i. cinamomi electi, gariophyl
 lorum, maceris. añ. 3. i. ligni aloës. 3. i. corticum citri.
 3. i. s. croci. 3. i. ambre gr. i. R. edigatur singula in pul
 uerem & fiat sacculus cuz serico ut supra. Porro si ab *Si ab hu*
 humore aliquo in pericardio ptento palpitatio oria *more fil*
 tur, extenuanti uictus ratione, & uene sectione q̄ in *palpitatio*
 cubito est curabitur, Gal. lib. 6. de Patien. loc. Cap. 1. *cordis.*
 teste, qui ibidem sic scriptus reliquit. Palpitatio cor
 dis pluribus integra ualeitudine degentibus tuz ado
 lescentib. tuz adultis, subito sine alio manifesto sym
 ptomate euenire uisa est, atq; oēs eos sanguinis de
 tractio iuuat. Nāq; hoc pacto pleriq; perfecte ab hoc
 symptomate liberati sunt: p̄sertim qui utebantur
 & uictu & medicamentis, quibus esset extenuandi fa
 cultas. Facile itaq; quouis ex iis Galeni uerbis & que
 antea dicta sunt curandi rationē instituet, ita ut diu
 tius in ea immorari superuacaneum putem. Aliun
 de igitur petant, quod hic omisum est.

De syncope. Cap. XI.

Syncope Gale. lib. 12. Ther. meth. autore p̄ceptus *Syncope*
 est uirium lapsus. Fit ob plurimā sanguinis, aut *Causę*
 uentris excretionē, motuz uehementez, dolorem
 ingentem, uigilias, omnez immoderatā inanitionez,
 timorem, terrorem, & alias animi perturbationes, ob
 crudorum deniq; humorum copiam, inflātionis
 magnitudinem, uitiosos & erodētes humores, aureq;
 fatidę inspirationē. Cognoscitur iis notis. Pulsus *Signa*
 est rarus & obscurus, extremarū partium frigiditas,
 sudor circa faciē, nitoris cutis eiusdē ablatio, & toti
 quasi corporis resolutio. Notę uero quibus causa
 diuersitas deprehenditur ex aliis Capitib. que partiz
 p̄missa sunt, partim uero deinceps sequentur petē
 de erunt. Generalis curandi rō nulla est, sed h̄z ferē *Curatio*
 quęuis causa symptomatis suam peculiare, curatio
 G iiii nem.

Si propter
sanguinis
excretionē

nem. Si enim propter sanguinis aut uentris excretionē, aut immoderatos sudores et repentinās alias euacuationes fit syncope, frigida faciem aspergere opus, aut aqua rosacea. Extremæ etiā corporis partes uinculis uehementer constringendæ, ac lintheis modice asperis fricandæ. Crura quidem, si supra eruptio fiat manus uero, si infra. Cucurbitulæ quoque pro diuersitate partium, ex quibus sanguis erumpit, affigendæ. Os quoque aperiendum, pennarum aut digitorum immisione: auditorius autem meatus, et nares compri-
mendæ, ut inspiratus aer interiora petens, spiritus re-
ficere ac excitare queat. Confestim etiam rebus odo-
ratis animum reuocare conuenit. Nihil enim est, Hip-
pocrate in lib. de Alimento teste, quod uires odore
citius reuocet. Prodest itaque, pullos gallinaceos affos-
ac per medium discerptos, naribus egrorum admo-
uere. Post hæc, iusculis concoctu facillimis alendus
egrotus. Vinum etiam huic tenue et dilutum exhiben-
dum. Balneum alui tantum profuuiū conuenit, aliis
minime. Cubiculi aer sit frigidus, stratis in pauimen-
to rosis, uitium palmitibus, rubis, quercus foliis, et
huiusmodi adstringentibus. In immoderato sudore,
exudantibus partibus oleum myrthinum, rosaceum,
cotoneorum illinendum: in primis uero collum, tho-
rax, loca sub alis et inguinibus. In hunc usum etiam
conuenit amyrum, et thuris pollinem, candido oui
excepta, aliaque adstringentia illinire. Odoramenta
quoque uaria offerenda, rosæ, santali, poma cotonea,
caphura, flores nymphaeæ, et similia. Extremas autem
corporis partes non oportet uincire. Si ob dolorē
syncope fit, iis remediis quibus dolor aufertur, cura-
bitur: quæ singula suis locis, potissimum uero in Ca-
pi. de Coli doloribus dicentur. Qui ob mororem,
gaudium, et alias animi perturbationes syncope cor-
ripiuntur, ii contrariis curandi erunt, odoribusque,
et aliis quæ per os sumpta spiritus recreare possunt.

Si pro-

Si a dolo-
re.

Si ob ani-
mi affe-
ctum.

Si propter crudorum humorum copiam syncope cor-
ripiuntur, tum neque sanguinis missionem, neque pur-
gationem sustinent, utpote quos etiam sine his syn-
cope subito aderiatur. Inaniendi itaque per frictiones
erunt. Initio igitur morbi statim incipere oportet, ac
primum crura à superiore parte deorsum, linteis, non
admodum mollibus, sed modice asperis: deinde et ro-
ta brachia ab humeris pariter ad infimas partes per-
fricanda. Vbi uero artus omnes abunde calidi uide-
tur, et metus est ne quis ex ampla frictione lassitudi-
nis sensus superueniat, oleo relaxante utendum, qua-
le est anethinum, et chamæmelinum. Cum iam artus
plurimum perfricueris, postea oleum detergetur. in-
de ad spinam dorsi transeundum est, hæcque tota per-
fricanda similiter: ab hac rursus ad crura, et hinc ad
brachia, exinde rursus ad spinam remeandum, et ita
toto die faciendum. Idque in splendido et minime hu-
menti cubiculo, cuius aer temperatus sit. Porro
mussa in qua hyssopum coctum fuit, his est aptissi-
ma. Cauendumque ne uel cibum, uel sorbitionem, uel
aquam exhibeas, uel omnino liberaliter bibere si-
nas, nisi mussam tribus primis duntaxat diebus, ut
solum illud tempus intersit quod somno datur, qui
certe mediocri sit. Si pulsus robore mediocri sit, ac
magnitudine, considerata quæ ad aluum spectant:
et si iua sponte commode non deiciat, clysteri secu-
rus abluere. Accidit namque post aquam mussam, ut quæ
in primis uenis, quæ scilicet circa iecur et mesenterium
sunt, colliguntur superuacua, commode deiciantur.
Quod si iusto maior recrementorum impetus ad
aluum citeretur, mussam amplius percoquere oportet
bit: ita enim minus subducet. Si plenius superuacua
descendant, nec sic quidem sistenda aluus, sed exhi-
bendus pro aqua mulia ptisanæ cremor est. Si uero
fluere pergant, alicui sorbitione nutries. Si ex pul-
sus imbecillitate uires quoque collapsas didicerimus,

G. iiii panes

Si ex re-
dundantis
crudorum
humorum

*Syncope
iaz premē
tis curatio*

*Si ob tē-
ues huma-
res synco-
pe oppri-
muntur.*

*Si ob inflā-
mationis
magnitu-
dinem.
si propter
erodentes
humores.*

panes ex uino diluto exhibere conuenient: idq; si nec
uenter, nec iecur inflammatione laboret. nam si hac
infestentur, iam corpore crudis humoribus referto,
nulla planè medicina periculo liberat. Atqui si quā-
do crassi abunde humores deprehendantur, oxyme-
li pro multa continuo exhibendum. Ergo si ęstas sit
& ęger frigide potioni assuetus, frigidum huic oxy-
meli dabis: si hyems sit, calidum omnibus. Sanè bal-
neum iis est aduersissimum, tum aēr ambiens uel ni-
mium calidus, uel frigidus. Porro iis quos syncope
iaz premit, si partes modo cōmemoratę inflammatio-
ne uacent, panis exhibebitur modicus, isq; ex uino
fuluo, quod celerem in corpus digestionē adiuuet.
Et si ęstas adsit & constitutio calida, aqua frigida ui-
num dilues: si contrā, calidam mellebis. Inde ad fri-
gionem ueniendum est, quę pro tradito quoq; iam
modo administrabitur. Verum quibus ex flaua bili,
quę os uentriculi infestat, syncope incidit, iis frigi-
da offerenda potio est: nōnunq; etiam uinum, quod
calidum natura sit, fuluum colore, & substantia te-
nue. Qui tenuium humorū uitio syncope premunt,
hos paulatim nutrire op̃s, summamq; cutem densare
& aēr cubiculi refrigerare. Ungendi sunt adstrin-
gentibus unguentis: tum cibi iis dandi, qui non ad-
modum promptē diffluant, ut est panis, sorbitiones
alicę, ouorum sorbillum uitelli, gallorum testiculi, &
eiusmodi. Vinum iis aquosum inter initia dandum
est, sumptum à cibo. Si ob inflammationis magnitu-
dinē syncope accidat, artus fricandi & fouendi, ma-
nusq; ac pedes uinciendi, uigilię imperādę. Quicūq;
uero propter uitiosos humores erodentesq; synco-
pe corripuntur, ii curandi sunt ad eum modum, qui
infra de Doloře stomachi exponetur. Qui exquisi-
tam & pleniorē syncoptes curandi rationem deside-
rat, is legat quę tradit Gale. lib. 12. Ther. methodi, &
quę infra Cap. 4. Libri tertii dicentur.

De

Lactis defectus accidit propter siccam mammillarum, aut totius corporis intemperiez, propter sanguinis boni paucitatem, & quia infans imbecillis non probè ex mammis sugit. quāto enim plus sugendo ex illis adimit, tanto magis attrahitur. Notè, quibus caularum diuersitas deprehenditur, notiores sunt quā ut dici debeant. Sicca enim intemperies ex habitu corporis macilento, & aliis suprà dictis dignoscitur. Sanguinis boni paucitas, ex malo corporis habitu, & ex iis quę præcesserunt corporis, mensium nimirum aut alui profluuiis, exercitiis immodicis, inedia & similib. inanitionibus. Posthabito itaq; lactis defectu qui fit ex intemperie sicca, quę facile ex iis quę suprà dicta sunt, & deinceps in Cap. de Hætica dicentur, curabitur, de eius tm̃ qui ex sanguinis boni paucitate fit curatione dicemus. In quo sanè primū san- Causa.
guis est contemplandus, sic monente Galeno lib. 5. Simpl. Cap. 20. aut enim minor est quā conuenit, aut deterior. Itaq; qui minor est, uniuersaz uictus rationem exposcit humectantem & calefacientem mediocriter. Quęcunq; enim plus quā expediat calefaciunt, quęq; desiccant aut refrigerant, partim qualitatē ipsius sanguinis uitiantia, partim ipsum minorem reddentia, lac prouenire prohibēt. Dare itaq; conuenit panem purum, lac, carnem uitulinam, pul- Signu.
lorum gallinę, perdicum, hędorum, oua sorbilia, pisces saxatiles & squamatos, passulas, amygdalas dulces. malas, lactucam, buglossum, melissophyllon, cucurbitas, & eiusmodi. Bibendum uinum aquosum, tenue. Fugiendum immodicum exercitium, ira, mœ- Viciu.
ror, & omnia quę sanguinem minorem efficere possunt. Si uero deterior est sanguis, si quidem biliosus fuerit, primum purgationem desiderat biliosi hu- Curatio
moris, mox uictum quem modo diximus, Sin pitui-
tosus,

Lac gene
tantia.

tosus, medicamenta requirit excalefacientia aut primo, aut secundo ordine: non tamen desiccantia. hec enim pituitosos humores excalefacientes in sanguinem uertunt. Verum inter ea potiora sunt, quæ non tantum sunt medicamenta, sed & nutrimenta: uelut eruca, fœniculum, anethum, apium, fîum, eaq; uirentia priusquam siccentur. Nam sicca plus quàm oporteat & excalefaciunt & desiccant. Quæ autem desiccant humorem sanguinis depaupercentia, crassiores simulq; pauciores efficiunt. Et si natura quoq; sint calida, iusto etiam calidiores: si frigida, frigidiores. Debet enim esse modice calidus, ac neutiquam crassus, ut ex eo lac generetur. Proinde quæ mediocriter excalefaciunt, nullamq; insignem adiunctam habent siccitatem, lactis procreatricem facultatem obtinet: inter quæ, præter ea quæ dicta sunt, est sesamum in uino decoctum. Item butyri recentis. 3. i. cum uino pota. Præterea amygdalæ dulces, pistacia, nuclei pinearum triti, & cum butyro comesti. Laudatur etiam hoc ferculum, quod sic conficitur. ʒ. Orizę decies ablutę, exiccatę, & in puluerem redactę, coquanturq; in lacte optimo iuxta carbones ignitos, adiciaturq; inter decoquendum sacchari albissimi quod satis est, & fiat pulmentum. Fit præstantius, si addantur amygdalæ dulces, pistacia, nuges pineę, faria hordei, cicer, & eius modi. Annitendum etiam erit, ut cum leni frictione thoracis, & aliis medicamentis trahendi facultate præditis, ad mammas lac alliciat. *De lactis redundantia.*

Cap. XIII.

σπαργάνωσις.

Causa.

Signa.

Curatio.

Accidit ut interdum ob lactis redundantiam mamillę tumefactę repleantur, & sic extendantur, ut copiam eius uix ferre queant. Qui sanę affectus Græcis σπαργάνωσις dicitur. Fit à causa contraria, nempe boni sanguinis copia. Visu tactuq; apprehenditur. Succurrendum statim huic affectui, quod

quod aliàs metuendum sit ne mammæ inflammatio
ne corripiantur. Inter initia itaq; uena secanda popli
tis, aut media quæ est in cubito. Dein utendum iis q̃
leuiter reprimunt, ne scilicet ad pulmonem impetu
quodam trudatur sanguis. In hunc usum proderit
spongia, in posca madefacta, apposita. aut, palmulæ
(dactylos uocant) cum pane ⁊ posca tritæ adhibitæ.
Conuenit etiam apponere emplastrum ex oleo rola
ceo, santalis, coriandro, psyllio, portulacæ, farina fa
barum, lentium, plantaginis succo, ⁊ aceto, in hunc sci
licet modum confectum. ℞. Faring fabarum, farinæ
lentium. añ. 3. i. portulacæ. 3. i. se. lini, altheæ. añ. 3. ii. s.
plantaginis, coriandri. añ. 3. ii. Buliant in aqua, do
nec ad mellis crassitudinem redeant. dein addantur
olei rosacei. 3. ii. succi plantaginis, aceti. añ. 3. i. buliāt
denuo, ⁊ adiciantur ouorum, uitelli duo, ac fiat em
plastrum. Vel potest fieri ceratum, sic compositum.
℞. Olei rosacei, myrthini. añ. 3. i. s. faring lentium, fa
ring fabarum. añ. 3. i. s. mentæ, rutæ. añ. 3. i. plantaginis,
coriandri. añ. 3. s. cum cera ⁊ resina. q. s. fiat ceratum.
Erysimon etiam (quod rapistrum hodie uocant) mi
rifice prodest, cum aqua ⁊ melle illitum. Ricini etia
folia trita, ⁊ apium uirens illitum, non modice pro
sunt. Vniueria deniq; uictus ratio talis sit, quæ pau
cum procreet sanguinem: adeoq; inedia non parum
conferre in hac passione potest.

Empla
strum.

Ceratam.

Vicius.

De lacte in grumos conuerso. Cap. XIII.

GRumescit lac, ⁊ in casei formam transit inter
dum, quam passionem Græci θρομβωσις, quasi
diceret grumescencia, nominare solent. Fit ob
lactis abundantiam, quum scilicet è mammis nõ su
gitur: ⁊ deinceps à nimia caliditate, qđ in eo tenuius
erat partius digesto, quod reliquum est concreuit.
Idem etiam à frigiditate accidere solet, quæ ut con
crescat lac nonnunquam efficere potest. Interdum
etiam

Θρομβω
σις.
Cause.

Signa. etiam lac ipsum suapte natura satis crassum et glutinosum est, ut facile in grumos uertatur. Notę lactis grumescens satis manifestę sunt. ex tactu enim, atq; adeo relatione egrotantis, statim dignoscitur. *Viſus.* ratio iuxta causarum diuersitatem uariatur. In calida mammarum intemperie, ad frigidum, in frigida contra ad calidum declinet. Si propter crassicię lactis accidit passio, extenuanti prorsus dięta utendū. *Curatio.* Quid ad curandi rationem attinet, si redundantia lactis fuerit, nec in mamillis grumescat, ab adultis peritisq; mulierib. leuiter exugendum erit. Mammę aut apii uirentis, mentę, uel fœnigręci succo illinantur, aliaq; quę supra in Cap. de Lactis redundantia dicta sunt adhibeantur. Leporis autem coagulum ex aqua tritum si illinatur, ad omnes mammarum tumores, et passiones precipue lactis copia euenientes, confert. Si nimia mammarum caliditas affuerit, tunc portulacę succus, et solani hortensis illinendi erunt. Itę rosacei cum aceto. Alſine etiam (morsum gallinę uocant) illita mirifice confert. Benefacit etiam cimolia terra ex aceto, aut aqua, et oleo rosaceo illita. Lentę quoq; in aceto coctę, et contusę, illitę profunt. In frigida intemperie, mamę decocto chamęmeli, fœnigręci, anethi, seminis lini et fœniculi fouedę. Oleis etiam chamęmelino, anethino, liliorum alborum, et eiusmodi, inungendę. Cauendū tamen, ne papillam contigant. Fel bubulum illitum confert. Medulla panis cum aceto illita prodest. Potest adici menta, aut apium, et fit medicamentum ualidius. Preter cętera hoc etiam ualet, quod. ℞. Mellis. ℥. s. styracis calamitę. 3. iii. fellis bubuli. 3. ii. olei chamęmelini. 3. i. myrrhę, thuris. añ. 3. ii. s. Misceantur singula, et reducuntur in formam emplastri, quod mammis imponatur.

De

De inflammatione mammarum. Cap. XV.

ACcidit interdum, ut alię inflammationes, ppter
 defluxus sanguinis copiosi & calidi ad mamas.
 Nonnunq; ob lac casei modo coactum, atque
 subinde suppuratum. Facile discernuntur, quod
 prior inflammatio iis quę neq; grauidę, neq; puerpe
 re sunt accidat: altera uero, iam commemoratis dū
 taxat. In prima confestim sanguis mittendus ex cu
 biti uena interna, uel media eiusdem lateris, nisi mē
 sium subesset retentio. tunc enim consultius est po
 plitis uenam secare. Posthęc ad reprimentia uenien
 dum medicamenta, quę non oportet esse ualida, ne
 ad interiores corporis partes nobiles humorum im
 petus trudatur: aut aliqua, quę discutere possunt, iis
 miscenda. In hunc itaq; usum conuenit oleum rosa
 ceum cum succo solani, aceto, & decocto chamemeli
 lintheis in iis madefactis, & impositis mammę. Va
 let etiam emplastrum ex farina hordeacea, semine li
 ni, santalis, bolo armenia, adipe porcino, & oleo rosa
 ceo confectum. Quod si reprimentia medicamenta
 non contulerint, ad ea quę discutunt statim ueniē
 dum est. Conuenit itaq; adhibere hoc emplastrum,
 quod. ℞. Farinę fabarum, farinę fœnigręci, seminis
 lini. an. p. i. meliloti, chamemeli. añ. 3. ii. s. medullę pa
 nis triticeı. 3. s. myrrhę. 3. ii. Bulliant in aqua sufficien
 ti usq; ad mellis crassitudinem, dein addantur olei
 chamemelini, anethini. añ. 3. i. s. & bulliant iterum, de
 in adiciantur uitelli ouorum numero. iii. croci. 3. i.
 & fiat emplastrum. In hunc usum lini semen, uel fœ
 num gręcū in oxymelite decoctū illini potest, & alia
 quibus discutiendi facultas inest, de quibus iaz sepe
 dictum est. Quod si uero spes discutiēdi sublata fue
 rit, maturatione auxiliabimur, quę hoc cataplasma
 te perficietur, quod. ℞. Maluę. foliorum althę, uio
 larię, chamemeli. añ. M. i. s. radicis althę. 3. i. Ebuliāt
 in exi

Cause.

Signa.

Curatio

Adstrin
gerita.Discutien
tia.Empla
strum.

maturatione

Cataplas
ma.

Ruptio.

in exigua aqua ad mollitudinem usq; dein contundantur, & fiat cataplasma. Vel formetur emplastrum ex semine lini, fœnigræci, caricis, radicibus altheæ, & liliorum alborum, adiectis oleis chamæmelino & liiaceo, adipib. porci, gallinæ, & similibus. Suppuratio ne facta mammillæ ruptione; sectionem uè tentabis, idq; medicamentis aut ferro. Medicamenta suppuratas mammas rumpentia sunt, finus columbinus, fermentum cum puluere cantharidum, calx uiua cum fumo anserino. Si ferro potius uti placuerit, locus prope pupillam lunari sectione accuratissime incidendus erit, ut iucisione abscessus quidē profunditas denuderetur, sed pupilla cōseruetur. Curatio reliqua talis erit, qualis reliquorum ulcerum. Si ob lac coactū inflammatio accidit, tunc utendum per initia est spōgia molli egelida posca imbuta, expressaq; loco fasciis superaccommodetur. Itē palmulæ (dactylos nominant) cum pane & posca tritæ imponendæ. Vel utē dum est ouo toto, cum rosaceo. Medulla etiā panis adiectis myrrha, croco, menta, & aliis quæ in Capite de Lactis redundantia dicta sunt, imponenda. Deinceps si illa non contulerint, reliqua ordine (ut iam commemoratum est) adhibenda erunt.

LIBRI SEC VNDI FINIS.

XII
LEONHARTI FUCHSII

DE MEDENDIS SINGVLA

rum corporis humani partium à
summo capite ad imos usque
pedes passionibus.

LIBER TERTIVS.

De Imbecillitate Ventriculi. Cap. I.



ENTRICVLI Imbecilli- *Causa.*
tas ex quacunq; intemperie ob-
oritur, nullis humoribus vitia-
tis. Fit etiam ex humore in ip-
so sinu ventriculi contento quī
aut calefaciendi, aut perfrige-
randi, aut humectandi, aut sic-
candi, aut etiam horum aliqua
per coniugationem efficiendi na-

turam obtinet: interim vero ⁊ in ipsas ventricu-
li tunicas imbibito ⁊ impacto. Nudam qualitatem
calidam testantur, sitis uehemens, cibi fastidium, ni-
dorosiq; ructus. Frigidam contraria indicant, mo-
dica sitis, immodica appetentia, acidi ructus. In hu-
mida nulla, uel exigua saltem sitis ægrum affligit,
saluæ copia adest. In sicca, linguæ siccitas, corpo-
ris extenuatio, sitis uehementissima, saluæq; pauci-
tas. Copiam autem humorum nausea, uomitus, gra-
uitas ventriculi, ⁊ ructus à cibo potissimum osten-
dunt. Et si flaua bilis redundat, oris amaritudo, bilis
uomitibus, sitis, ructus nidorosi, ventriculi morsus
aderunt. Sin pituita, nulla ventriculi erosio erit,
ructus acidi, sitis nulla, tensio uentriculi. Si ab atra bi-
le,

Stigna.

Curatio

le, tristitia et metus, ructus et excreatio foetida, pisces olens. Curatio intemperierum per contraria fit. in temperiem enim calidam refrigerare oportet, frigidam calfacere: siccam humectare, humidam siccare. Similiter uero etiam compositas intemperaturas aut calfacere et siccare, aut humectare et calfacere, aut refrigerare et humectare, aut siccare et refrigerare oportet. Calida itaque intemperie affecti, refrigerante ui-

Calida in temperiei

ctu curantur, precipue qui ex aceto assumitur. Panis igitur posca imbutus fit. Pullis gallinarum, perdicibus, carnibus uitulinis cum aceto aut omphacio decoctis utendum. Lactuca denique, portulaca, et similibus herbis, pomis, et piris acidis. Bibenda aqua frigida, aut uinum aquosum. Frigida intemperie la-

Frigida in temperiei

borantes, contrariis medicari oportet, anisi, rutæ, petroselinii decocto. Cibi odoramentis cinnamomo, calamo odorato, pipere, et similibus condiantur. Dana etiam confectio diatrion pipere non nominata, et

Humida.

theriaca. Vino utendum ueteri, et subadstringenti. Humide remedia sunt, cibi qui citra ualentes calefactionem refrigerationem uel siccant. Preterea consue-

Sicca.

potionis parcitas. Siccam curabis instar hecticæ, de qua suo loco dicemus. Copiosissime autem Galeni uentionem, ut etiam reliquarum intemperantiarum uentriculi, prosequitur lib. 7. The. meth. ex quo ea quæ

Si ab hu-

more uen-

triculi im-

becillitas

accidat.

Bilioso.

hic desiderantur petenda erunt. Cæterum si humor aliquis calefaciendi uel refrigerandi uim obtinens uentriculi imbecillitatem effecerit, diligenter considerandum erit an humor is in sinu seu amplitudine uentris innatet, an eiusdem tunicis impactus sit. Si in sinu continetur, et biliosus fuerit, per uomitum statim expurgandus erit. Facilem uero uomitum reddit aqua calida, uel mulsa dilutissima bibita. Satius fuerit, si ante hæc humectantia exhibeas, ueluti prisanæ cremoræ, aut lutea ouorum. Sin in uentriculi tunicis est receptus humor biliosus, hiera picra alius purganda erit.

na sanè Galeno ubi suprà teste, nullum aliud medi-
 umentuz ad uitiosos humores qui in uentriculi ha-
 entur tunicis præstantius inueniri potest. Humore
 acuto, uictu utantur eodem quo qui calida intem-
 erie affliguntur uti debent. Exhibendę etiam cõser-
 g, & confectiões refrigerantes. Extrinsecus uentri-
 culo adhibeantur refrigeratiã, & mediocriter adstrin-
 gentia, ut est oleum rosaceum, cotoneorum, adiectis
 antalis, balaustris, corallis & caphura. Infrigidantiũ
 amen mediocris semper usus sit, iuxta præsentis in-
 temperiei contrarietatem. Nam immoderatus horuz
 usus, non modò non iuuat, sed etiam sepe insanabi-
 lem morbiũ efficit. Si uero pituitosi, aut crassi & gluti-
 nosi humores amplitudini uentris innatent, oxyme-
 lite utendum est, in quo ex incidentibus & extenuan-
 tibus quædam sint decocta: uerbi gratia hyssopus,
 ris, origanum, satureia, & marrubium. Sin tunicis
 uentriculi impacti fuerint, tum prius exhibenda que-
 runq; lentam hanc pituitã dissecant, post deinde pur-
 gandum. Qualia uero hæc sint medicamenta, Capi-
 te. 8. Libri primi diximus. Est autem & ad illoruz hu-
 morum purgationem non inutilis hiera picra. Vi-
 ctus ratione extenuante utendum. Confectionibus
 item calidis dia trion pipereon, diagalanga, diacina
 momi, diambra, zingibere condito, diacori, & simili-
 bus. Extrinsecus adhibenda sunt olea calefacientia,
 quale est nardinum, de menta, de absinthio, masti-
 chinum, & alia eadem faculte prædita. In hunc sanè
 usum commendantur cærata, quæ uulgus medico-
 rum hodie scuta stomachalia nominat. Hæc in eum
 componantur modum. ℞. Cinamomi selecti, garyo-
 phylorum, piperis longi. añ. 3. i. galliæ moschatę, ma-
 ceris. añ. 3. s. calami aromatici, thuris. añ. 3. i. s. ligni
 aloës. 3. i. mentę. 3. ii. mastichis, ladani. añ. 3. i. s. oleo-
 rum mastichini, nardini. añ. 3. s. Cum cera & resina
 quod satis est, fiat scutum stomachale. Aut. ℞. Masti-
 chis

Pituitoso
 Scutuz sto-
 machi.

Corrobo
rantia uē-
triciū.

chis in puluerem redactę. ʒ. i. s. spargatur per corium
scuti formam habens, et affundatur oleum nardin.
Dein admoueantur igni quoad liquecant singula
et inspergatur cinamomi selecti, nucis moschatę,
garyophyllorum in puluerem redactorum. añ. 3. i. et in
macho admoneantur. Quid multa ē medicus ha-
et alia uentriculuz roborantia adhibeat, qualia sunt
menta, absinthium, thus, mastichę, cinamomum, aca-
rus (galangam hodie uocant) zingiber, garyophyl-
li, macer, lignum aloës, calamus odoratus, et simi-
lia, ex quibus uarię medicamentorum formę com-
poni possunt.

De inflammatione uentriculi.

Cap. II.

Causa.

Signa.

Vitius.

Curatio

Adstrin-
gentia.

Phis.

Ventriculi inflammatio haud secus quàm ali-
rum corporis partium fit, à cōfluxu sanguinis
copiosi et calidi. Hanc testantur dolor imme-
sus, assiduus, et qui nullis medicamentis admotis ni-
tigari potest, tumor, ęstus qui tactu diiudicari possi-
febris, grauitas et nausea. Viētus ratio perinde atque
in aliis inflammationibus sit tenuis. Vitendum pti-
ne cremore, abstinentum à carnibus, uino, et aliis
bis calidis. Bibat decoctum cinamomi, aut succū m-
lorum granatorum acidorum, aut aliorum fructu
frigidorum. Parum loquatur, et dormiat. Fugiat tr-
stitiam, et uertetur in aëre mediocriter frigido. Cu-
randi ratio à sanguinis missione auspicanda, mod-
plenitudo corporis, et uirium robur adsint. Incide-
da autem uena cubiti interna, et pro uirium robo-
sanguis detrahendus. Posthęc ea quę adstringunt a-
reprimunt, foris ubi dolor et tumor maxime appa-
rent, sunt imponenda. Conuenit in hunc usum ole-
um, in quo malum cotoneum decoctum sit, admix-
ta simul mastiche apponere. Item succum cotoneor-
aut pirorum, adiecta farina hordei, rosas rubeis, san-
talis, bolo armenia, et similibus, in hunc modū. ʒ. F.

rin

iæ hordei. 3. i. s. fantalorum alborum & rubeorum,
 farum rub. añ. 3. ii. boli armenicæ. 3. i. s. cuꝝ succis la-
 tæ, portulacæ, & rosarum, redigantur in formā pul-
 uis, aut emplastri. Quod si maiori adstrictione opus
 erit, addendum aliquid erit de succo omphacii (a-
 estam uocant) aut hipocisthidis, aut rhois (sumach
 pellant.) Hæc omnia si uehemens sit inflammatio
 tu f. i. gida sunt ad mouenda. Quod si alius nihil
 iiciat, clysterib. leuibus irritanda erit. Neq; temere
 erit, qui estus uehementia paululum remissa casæ
 stularis. 3. s. intybi domesticæ succo dissoluta exhi-
 beb. Hoc etiam tempore cum adstringentibus medi-
 camentis, quæ extrinsecus adhibentur, aliqua quibus
 discutienti inest facultas permiscenda erunt: ut est fa-
 na fœnogræci flores chamæmeli, semen althææ, lini,
 cuiusmodi. Imò cum etiā nihil amplius affluit, nec
 epe lli quod in laborante particula continetur po-
 est, solis discutientibus medicamentis utendum, sed
 emper adstringentia, quæ robor illius seruant, admi-
 cenda, id quod Gale. lib. 13. Cap. 10. Ther. meth. co-
 niosissimè docet. In hunc sanè usum hoc conueniet
 emplastrum, quod. R. Farinæ seminis lini, fœnigræci
 añ. 3. s. seminis anethi. 3. ii. florum chamæmeli, melilo-
 ni. añ. 3. iii. absinthii, balaustiarum, rosarum rub. añ. 3.
 i. hypocisthidis. 3. ii. oleorum chamæmelini, liliorū
 alborum, rosacei, mastichini. añ. 3. s. axungie gallinæ
 anseris. añ. 3. ii. melle, fiat emplastrum. Ante illius ap-
 positionem, uentriculi regio hoc unguento inunga-
 tur, qd. R. Oleorum chamæmelini, anethini, cofoneo-
 rum. añ. 3. iii. pulueris radicis althææ, absinthii, se. lini
 añ. 3. i. cere quod satis est, fiat unguentum.

Empla-
strum.

Vnguen-
tum.

De appetitu canino.

Cap. III.

CAninus appetitus contraria est ammissioni ap-
 petitus passio. plures enī cibos appetunt sic af-
 fecti; atq; quos appetitū cohibere nequeant, in-
 H ii inge-

Caninus
appetitus

Causa.**Signa.****Curatio
Acidorum
humorum****Vitæ.**

ingerendis cibis modum excedunt: deinde multitudine eorum grauati, et assumptos cibos citra necessarium ferre non potentes, ad uomitus diuertunt. Postea rursus cibo se explentes, rursus ad uomitus reuertuntur, quemadmodum canes: unde etiam pellationem malum hoc accepit. Fit propter frigidiores uentriculi temperaturam, uel ab acidis humores os uentris mordentes et irritantes. Quippe frigidi humores uitati, rosioneque suctioni proportionem respondeat inducunt, ciborumque appetentiam excitant: uel propter totius corporis quod equius et calidius est immodicam dissipationem, Galen. lib. 1. Cap. 7. de Symptomatum causis teste. Frigidi uentriculi intemperies ex deprauata concoctione, inflatione, fluctuatione, murmure, ac egestionibus multis deprehenditur. Acidi humores ex ructu acido multaque egestionem et liquida admodum cognoscuntur. Immodica dissipatio ubi causa fuerit, tum uentris egestionem longe pauciores procedunt, quam eorum que ingeruntur modo ac proportionem. Egeruntur, sicciora existunt. Frigida intemperies ratur ad eum quem supra diximus modum. Quod si uero ab humoribus acidis ori uentris impactis habet fit passio, hiera picra Galeni exhibenda erit, quam ut supra Cap. 1. eiusdem Libri commemoratum est ad uitiosos humores uentriculo impactos educendos prestantissima sit. Aut si amaritudinem eius horruerit, eger in catapotia digesta exhibe. Et si pituitosi fuerint humores, prius quam dissecant calefaciuntque deuoranda dabis. Neque etiam temere tuzilia, porrum, satureiam, origanum, pulegium, et quibus similia existunt, cibis permiscebis. Vacuatis uitis humoribus, ea tandem uictus ratione utantur. Panis non sit recens, neque bene fermentatus. Cibi sit pingues, et oleosi. Sorbitiones itaque conueniunt, quibus mel et oleum plurimum, gallinaceus adeps adhibetur.

tyrum adiectum est. Ex olerib. malua. Cerebella
 m, & pinguiore uolucrum partes, pisciumq; eo-
 m modo, & omnino quę appetitum auertunt, ac sa-
 etatez inducunt, & quę magno cumulo accepta mo-
 ce alunt. Vinum bibant colore fuluum, substantia
 nue, odorumq; & nulla adstringente sapore prædi-
 m. Hoc etenim uenterculum excalfacit, & humoruz
 efruit acorem, ut sepe solum suffecerit cum pingui-
 us & oleosis cibis ad perfectam curationem. Exhi-
 endum autem tam ieiunis quàm cibo sumpto, etiā
 nondum sitierint. Ieiunis autem calidum sanè, aut
 erte tepidius. Abstineri autem oportet ab omnibus
 cidis ac adstringentibus cibis ac potibus, maxime
 uero à fructibus. Bellaria tamen eorum sint, pistacia
 mygdalę, nucesq; pineę. Lac etiam ipsis exhibendū,
 um per se, tum cum melle: ita tamen ut uitemus in-
 is, quib. in stomacho acescere consueuit. in his eniz
 maius nocumentum, quàm utilitas consequetur.
 Probè uero concoctum, non solum appetitum ob-
 tundit, sed & aluum obturatam emollit, fluxionesq;
 eius sistit. Apparandę etiam ex ipso lacte potiones &
 placentę, ut sunt dulciaria, & oryza cum lacte deco-
 cta exhibenda. Lauare quoq; per interualla opz, cu-
 ticularq; ipsorum large cum oleo pinguefacere. Ac
 isto curationis modo, tantisper dum à morbo libere
 tur eger, utendum. Si uero ex immodica dissipatio-
 ne caninus appetitus oritur, tunc eoruz qui hoc mo-
 do patiuntur cutem densare, & spissiore reddere cō-
 uenit, cum oleo ex immaturis oliuis expresso, aut ro-
 saceo, aut myrthino, aut alio in quo quippiam ad-
 stringens ad lentum ignem decoctum sit. Quinetiaz
 optima ratione eger in aëre frigido ac perspirabili
 uersabitur. Abstineat autem ab aëre calido, consimi-
 libusq; balneis, ac uini potu, & ab omnibus quę
 tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt.
 Potui autem detur aqua frigida, aut cinnamomi de-
 H iii coctum.

*Si ex im-
 modica
 dissolutio-
 ne.*

coctum. Ducatur eger ad lauacrum frigidum, si
dem nihil id fieri prohibeat: utpote corporis gra-
tas, aut pars aliqua corporis refrigerata, thorax
mirum, aut alia quædam. Cibi ei exhibendi stabili-
tate et egre corruptibiles, ut sunt carnes suille in uig-
existentes, maxime uero uentres. Bubule quoque
guiores, et omnia simpliciter pingua, et quæ uetri-
natant, tardeque concoquuntur ac distribuuntur.
enim hi, quandoquidem ipsis natura inest acris
mordax, et ut quispiam dixerit febriculosus calor
eorum numero qui minori negotio bubulas car-
ac alia concoctu difficilia, quam laxatiles pisces fin-
liaque concoctu facilia conficiunt, et fusius in præfati
Lib. i. de Alimentis Galenus docet. Ex ouis, ea quæ
coquendo sunt indurata, aut sartagine frixa con-
niunt. Panis sit non fermentatus, iusculaque pingua
Oryza cum butyro decocta danda. Iuxta proporti-
nem autem quantum malum imminuitur, tantum
crassi humoris cibus est detrahendum, et ex adstringen-
tibus forinsecus admotis imminuendum. Aliquand-
enim sedata uehementis appetitus accessione, quum
corpus ex crudis et crassis humoribus repleto aliud
grauius malum transitio contingit. Inter adstringen-
tia uero, præter ea quæ antea dicta sunt, et huic un-
guento locus sit, quod. R. Olei rosacei. 3. i. oleorum
myrthini, cotoneorum. añ. 3. s. succi plantaginis. 3. i.
santalo. 3. rub. mastiches, bistorte, rosarum rub. añ. 3.
boli armenie. 3. ii. hypocisthidis, acatie, sanguinis dr-
conis. añ. 3. i. cere quod satis est, fiat unguentum.

De Bulimo.

Cap. III.

Bulimos.

Causa.

Bουλιμος ingens Græcis uehemensque fames dici-
tur. Εοῦ enim particula aliis uocibus adiecta, si-
gnificationem earum auget. Fit ex uentriculi
frigidityte, indigentiaque, ac uirium imbecillitate, et fi-
re in totum ab externo frigore initium capit. Peregrina-
tio

ationes enim et itinera longa, maxime per niuem fa-
ta, affectum hunc inducunt. Deprehenditur facile.
In principio siquidem fames multa adest, quæ tamen
non usquequaq; perdurat. Nam postea repente ani-
mo relinquuntur, cum externarum partium refrigera-
tione, et spiritus defectione. Curatio huic malo sta-
tim adhibenda, quod sint qui in locis desertis, aut in
silneo, hoc ipso correpti ex instanti, auxilii facultate
destituti perierint. Hi itaq; qui in itinere, aut alias
time magna citra febrem infestantur, aceto, aut pule-
gio ad odorandum exhibito, aut terra quæcunq; tam-
en obtigerit aceto cõspersa, aut malis, aut piris, aut
aliis similibus fructibus qui ad manum fuerint refo-
cendi sunt. Auxiliatur et panis recens narib. admotus
seus bono odoris, caro suilla assata aut cocta et in
panem niuersum omne quod multum alit, maxime uero
quod nidorosum ac probè conditum, sufficienteq;
odorem habet. Per huiusmodi enim odores tales ut
lucinum refocillantur: quãdo nihil sit, ut diximus
Cap. I. Libri secundi, quod odore citius uires refi-
gere possit. Extremitates etiam eorum partes fasciis pre-
strin-
genda sunt, manuumq; ac pedum summitates calide
et aque feruentiori imponenda, ipsiq; tum maxillarum
punctura, tum capillorum ac aurium uellicatione ex-
citandi. Reuocatis uero iam ab exolutione, panem
ex uino diluto, aut aliud quippiam eorum quæ acer-
uatim uires reparare possunt, offeres: uelut sunt oua
torbilia, halica cum uino. Compendiosissimuz eni-
auxilium ex cibo sperare possunt: quem etiam si ob-
latum acceptare non queant, ori indere oportet ui-
olenter, cogereq; ut ipsum transglutiant. Euestigio
enim à fame, et ab animi deliquio liberantur, et cele-
riter excitantur. In hunc etiam usum conueniunt cõ-
fectiones ex odoramentis uariis compositæ, ut est aro-
maticum rosaceum, diambra, dianthos, diamo-
schi, alipta moschata, et similes pastilli. Quod si in

Signa

Curatio.

H iiii febris

febris (quod tamen raro accidit) bulimos inturrit, atque circa exacerbationum declinationem eius cessio irruerit, intrepidè cibi sunt offerendi. Si uero in principio accessionis, aut in uigore apparuerit, per odora menta ab initio dicta reuocandi sunt, et maxime per ea quæ sunt frumentacei generis, uel est panis calidus nidorem adhuc emittens, et fimi Fricatio etiam partium extremarum adhibeatur cataplasmata ex palmulis (dactylos nominant) malis cotoneis, in uino decoctis. Atque hæc usque remissionem facere oportet, ut opportune cibum fere liceat. Quod si ex his nihilo melius habeant, et audendum est per ciborum ingestionem auxilium ferre. Cremo rem itaque ptisanæ, aut buccellas unam atque alteram uino albo et tenui madefactas exhibebis. His enim refocillati ac respicientes ex improbitate deinceps usque ad remissionis tempus perueniunt. Quod autem liceat in accessione ipsa egrotantes tritare, pereleganti historia ostendit Gal. lib. 10. Theophrasti methodi Capite. 3. ubi multa ad institutum nostrum facientia offendet.

De inflatione uentriculi.

Cap. V.

Causa.

INflatur uenter ex flatibus in eo generatis. Generantur autem ex humoribus in ipso pituitosis, aut ex cibis in uapores per mediocrem caliditatem resolutis. Perfecta enim frigiditas hoc nominis quod extenuare ac dissolvere non sit idonea, nullum flatum procreat. Vehemens caliditas cum non tantum extenuet, sed etiam discutiat, flatum generationem impedit. Mediocris uero caliditas dissoluit quidem, et transmutat cibos, non tamen perfecte conficit: unde sane flatuum generatio contingit, ut fusi Gale. 3. de Sympt. causis Cap. 7. docet. Accedit sic patientibus uentriculi grauitas, et distentio: aliquando autem et tumor, ac eminentia quædam circa os uentriculi ipsius

Signa.

osum adeò uentrem efficitur, ructusq; inanes sunt
 iodicè alletantes, inhibitiōq; flatuum, qui per aluū
 xcerni conueuerunt. Vltra hęc uehemens difficul-
 tas spiritus ob septi transuersi compressionem adest
 ut aliqui non dissimile quiddam suffocationi se p-
 etati estimant. Leuantur autem cibo infernè subeun-
 e, & flatib. siue per ructus siue per intestina exclusis.
 Murmura deniq; intus audiūtur. Si itaq; ex cibis pi-
 uito sis generatur uentriculi inflatio, uictus ratione
 xtienuante utendum erit, & medicamentis iis quę in
 Cap. I. huius Libri dicta sunt. Sin ex mediocri cali-
 ditate orta inflatio fuerit, cibis utendum erit conco-
 ctu facilibus, & boni succi. Parum etiam comedend-
 um; inedia siquidem huic affectioni summè pfert.
 Post omnem cibum uinum meracius exhibendum.
 Vbi somnus etiam accesserit, non parum leuat egro-
 tantes. Multum autem potum tanquam infestissimū
 hostem deuitent. Fructuum quoq; atq; olerum hu-
 midorum esum semper habent suspectum. Soliis etiā
 calidiorib. utantur. hęc enim, Paulo lib. I. Cap. I. te-
 ste, mitigant, emolliunt, flatuq; ubicunq; fuerint dis-
 cutiunt. Quod ad medicamenta ipsa attinet, bibant
 hoc decoctum, quod. ℞. Calaminthę, mentastri, cha-
 memeli, origani, mentę, pulegii. añ. M. I. absinthii.
 M. s. seminū anisi, apii, cumini, dauci, oreo selini, fœ-
 niculi. añ. 3. iiii. seminū urtite, carei. añ. 3. ii. radicis, inu-
 le campanę. 3. ii. Decoquantur in aqua quātītatis iu-
 ste, quo ad tertia pars absumatur. Dein coletur, & sac-
 charo sufficienti dulcescat, adicianturq; syrupi de
 calamintha. 3. iiii. & fiat potio, de q̄ (ut moris est) una
 uice dentur. 3. iiii. Vel utendū ista (ut uocant) tragea
 quę. ℞. Specierum dianisi, diacumini, diacalamenti.
 añ. 3. ii. seminū anisi, carui, dauci, fœniculi. añ. 3. i. cu-
 bebarum, gariophyllorū. añ. 3. ii. zingiberis. 3. i. pipe-
 ris. 3. i. sacchari lib. s. misce, fiat tragea. Glādes quoq;
 pfidenter & citra dilationē supponendę sunt, ex reb⁹
 flatu

Curatio

Decoctum

Tragea

Glādes

status prolestantibus, in hunc modum formatæ. ℞.
Mellis cocti. ℥.ii. seminum rutę, cumini, fœniculi. añ.
3.i. semis carei, anisi. añ. 3.s. salis. 3.ii. misce, fiat glās.

Clyster. Aluo autem adstricta, clyster infundendus, qui. ℞.
Decocti superioris lib. i. bñdictę laxatiue. 3. vii. oleo
rum absinthii, rutę, anethini, añ. 3. i. pinguedinis an-
seris ⁊ gallinę, salis expertium. añ. 3. ii. s. salis. 3. i. mi-
sce, fiat clyster. Extrinsecus etiam uentriculus in hoc
affecto cum oleis iam dictis inungendus. Aut lana
in fasciculum conuoluta, ⁊ iis oleis leuiter calidis
inadefacta imponenda: lanę quoq; sic conuolutę
cuminum tritum, aut apii semen, aut anethi insperga-
tur. Aut imponatur uentriculo hoc ceratum, quod

Ceratum. ℞. Oleorum rutacei, anethini, nardini, laurini. añ. 3.
i. farinę seminis lini, fœnigręci. añ. 3. i. s. seminis apii,
carei. añ. 3. i. baccarum lauri, centaurii minoris. añ. 3.
i. s. gummi ammoniaci, opopanacis. añ. 3. ii. cere ⁊ resi-
nę quod satis est, fiat ceratum. Ceterum cucurbita
cucurbita magna. bonę magnitudinis umbilicum undiq; cōprehendēs
cum flamma copiosa sæpius admota, p̄sidium in
hac passione est, quod incantamenti cuiusquaz simi-
le efficit, Galeno etiam lib. 12. Ther. meth. autore. Ca-
storeum etiam ex posca potum, tum extrinsecus cu
oleo anethino appositum prodest.

De singultu.

Cap. VI.

Singultus

ΛΥΠΟΣ gręcę, latinę singultus, est motus uētri-
culi, qui ueluti eius conuulsio est, ab expultri-
ce facultate noxia uolentis extrudere factus.

Causę.

Accidit uel ex plenitudine, uel euacuatione, aut ob
humores acres ⁊ medicata qualitate p̄ditos, aut ci-
bos acres ⁊ mordaces. Item propter frigiditatē, ⁊ ali-
menti corruptionē, quo sanē nomine maxime oīuz

Signa.

pueris frequentes singultus eueniunt. Fit et in febrī-
bus singultus, stomacho, p̄sertim, aut aliquo alio
uiscere inflāmato. Causę extrinsecę facile ex egri aut
assiden-

fidentium sermonibus dignoscuntur. Plenitudo
 et gravitate, euacuatio autem ex iis quæ præcesse-
 rint. cibus corruptus ex illius nidore. acrimonia, ex mor-
 bicatione. Singultu itaque à frigiditate oborto, oleum
 quo ruta, cuminum, et absinthium sint decocta,
 una exceptum stomacho imponendum. Oleum etiam
 castichinum, et de castoreo inunctum prodest. Pue-
 ros calidorum lintheorum admotio interdum iuvat
 is qui ætatis integre sunt, in potu uinum, aut apium
 aqua mulsa decoctum, aut cuminum tritum, aut
 sarum, aut pulegium, quodlibet eorum per se, aut si-
 mul mixta exhibenda. Vtile est et acetum scylliticum
 orbendo acceptum. Denique spiritus retentio, quæ ca-
 lorem auget, Galen. lib. 2. de Sympt. caus. Cap. 6. tes-
 te, præsens est remedium. Quando uero ex pleni-
 tudine singultus oboritur, uomitus optimum reme-
 dium fuerit. Crassis autem existentibus humoribus,
 cum oxymelite scyllitico, calaminthæ, prasii, et simi-
 lium iam sepius commemoratorum decocto exte-
 rui quando et incidendi sunt. Deinceps ea quæ in diuer-
 sos humores copiam trahunt, sunt adhibenda. In-
 quem usum conueniunt ea quæ per inferna purgant,
 notissimum uero clysteres, extremarumque partium frictio
 et constrictio, cucurbitule, cum plurima flamma tho-
 racis, stomacho, et dorso affixæ. Sternutatio etiam con-
 uenienter eis prouocatur. nam Hippocrate teste, à sin-
 gultu habitum sternutatio superueniens liberat. Sic
 etiam uociferatio concinna cum plurimo clamore
 et ambulatio longa et concitata, equitatio, et compul-
 sio spiritus conferunt. Ventriculus etiam roboran-
 dus erit per ea quæ introsumuntur, ut sunt confectio-
 nes in hoc in officinis paratæ. Extrinsecus oleis, un-
 guentis et emplastris in præcedentibus Capitulis pro-
 ductis. Singultus autem ex euacuatione sanatur
 per alimenti conuenientis assumptionem, et per ea
 quæ defectum explent, quæ partibus supra sunt dicta, et
 copiose.

Curatio
 Singultus
 ex frigiditate.

Singultus
 ex plenitudine.

Auersio.

6. aph. 13

Singultus
 ex euacuatione.

copiosè in curatione heclicæ febris dicentur. Non mediocriter autem hic conducit, uerthebras ceruicis et dorsi oleo humectante, uiolaceo et amygdalarum dulcium nimirum, perungere. Porro mordacibus rebus singultum excitantibus, primum sufficiens remedium uomitum ipsum reperiemus: deinde sensus etiam stupefactionem et morsum inferentium alterationem ad discussionem. Stupefiunt itaque sensus per refrigerationem, in quem sanè usum philonium exhiberi potest aut pilulæ de cinoglossa, quæ in hoc casu mirifice conferre solent. Debent ex una drachma confici sex pilulæ, de quibus unam antequam cubitum eat eggestumat. Alteratur autem mordacitas per attenuantia et exiccantia. Eiusmodi mixtæ facultatis est subiectum pastillus, qui. R. Costi, croci, spicæ nardi, rosarum uiridum, mastiches. añ. ʒ. s. asari, aloës. añ. ʒ. ii. opii. ʒ. cum succo psyllii fiant pastilli, de quibus detur. ʒ. s. uel ʒ. i. Commendatur hoc pharmacum à Galeno libro 8. de Compo. medica. secundum locos, Cap. 3. pluribus uerbis. Obtundit etiam mordacitatem, et ex eo abortum singultum sedat, intybi succus potatus, cum cumeris semen decorticatum tritumque bibitum. lacticæ semen eodem modo: item portulacæ succus potatus, ipsaque portulaca in cibo sumpta. Myxarum quoque decoctum (sebesten hodie uocant) in potu acceptum. Maximè tamen omnium præstat lac asininum aut si hoc non adsit, bubulum recens mulctum bitum. In eum usum exhiberi potest saccharum rosarum aut uiolarum, diarhodon abbatis, diatriasandali, uel uiolarum, et eiusmodi.

De cholera.

Cap. VII.

Cholera.

X Cholera Græcis, et cholera Latinis, est uomitus liosus, nidorosus et acidus, ad plures horas perseuerans, et uenter infernè eadem simul excernens. Barbari cholicam et choliricam passionem noian.

Q

Qui hoc malo afficiuntur, Grecis γολερίαντες, & Latinis cholericici appellantur. Est ob multam cruditatem, quæ nonnunquam ex magna alimentorum praetritate, interim ex uitiosorum humorum copia originem ducit. Signa quibus deprehenditur malum hoc, manifesta sunt: nam supra infraque excernunt. Sitis etiam sequitur, impeditus pulsus, musculorumque manuum et pedum, maxime uero surarum contractio et tensio. Quum itaque malum hoc acutissimum sit, et grauissimam syncopam, si paulo diutius duret, inducat, accurata opera danda erit, quo confestim et sine mora huic succurratur. Nemo igitur ubi copia uitiosorum humorum malum hoc conciliauerit, mox in principio, aut confestim ea quæ efferuntur cohibere aggrediatur. inutilia enim cum sint, euacuatione indigent. quare si nauseabundus eger est, et turbatur, cibis etiamnum crudis in uentriculo manentibus, aqua tepida propinari debet: deinde uomere oportet, digito uel pinna ori indita. Neque tamen cum aqua mulsa, neque aqua cum oleo mixta uomitus citandus quod hæc fluxiones augeat, illa uero mordacitatem operetur, et torsiones augeat. Adiuuare etiam oportet per sedem excretionem. alienum enim uelut uenum insidens, et uentrem ac intestina rodit, et humores ex uniuerso corpore attrahit. Propinanda autem leuissima purgantia medicamenta, ut est aloë, casia fistularis, myrobalanorum decoctum, et similia. Postquam aluus exinanita est, conquiescere oportet, et uentriculum ac hypochondria oleo mastichino, uel nardino, uel de absinthio fouere conueniet, somnuzque accersire. Prædictis oleis admiscenda interdum alia quæ uentrem roborare possunt, de quibus supra dictum est, et unguenta conficienda. Vbi iam exacta apparuerit concoctio, balneo aque dulcis, et cibis boni succi utendum est. In quorum numero est iusculum pulli gallinacei cum omphacio. Carnes item

Causa.

Signa.

Curatio.

auicu.

auicularum montanarum, perdicum, oua sorbilia, & eiusmodi. In potu utendum uino tenui, odorato, & adstringente, aut succo malorum granatorum, aut syrupo rosaceo, aut aqua in qua chalybs ignitus sit ter aut quater extinctus. Quum uero perseverauerit malum, & gracilitas per ambitum corporis fiat, & maxime si uenter confidat, pulsus minor densusque euadat tunc sanè extremas corporis partes uinculis adstringere, ac oleo multo calido impinguare oportet. Cataplasmata etiam & emplastra ex adstringentibus & roborantibus composita, uentriculo imponenda. Sunt autem eiusmodi, quæ ex palmulis, hypocistide, acathu rubi obsoniorum, bolo armenia, thure, balauistiis, rosis, ac myrti fructibus componuntur. Efficax quoque remedium est, si linteam in succo malorum syluestrium madefactum uentriculo imponatur, aut hoc ceratum, quod. R. Oleorum rosacei, myrthini, coroneorum. añ. ʒ. i. mastiches, thuris, acath. añ. ʒ. ii. hypocistidis. ʒ. i. santalorum alborum & rub. añ. ʒ. i. balaustiorum, sanguinis draconis. ʒ. s. boli armenie. ʒ. i. ceræ & resinæ quod satis est, fiat scutum stomachale. In potu uero frigida aqua cyathi mensura, hoc est. ʒ. i. s. absorbenda præbeatur. Cauendum tamen ne nimium frigida existat. hæc enim aliquando innatum calorem stupore suo extremè offendit, aut inflammationem stomachi aut uisceris alicuius efficit. Instilletur autem huic interdum mali punici acidi succus modicus, aut rosarum, uel pampini uitis decoctum. Quod si aciora sint ea quæ excernuntur, uexetque ardor & sitis, cum meris semen cum aquæ cyathis tribus præbeatur. Datur etiam utiliter cum amylo. Tum etiam intybæ & lactucæ in posca coctæ exhibeantur. Post uero sonus procurandus, & quies omni modo. Verum si fluxio sisti nequeat, uinum quoddam mediocriter adstringens, neque uiribus ualidum, & quod dulce quidem sit, non autem odorum, potui dandum est. In

teran

Scutum
stomachale

ant uero in ipsum micas panis, atq; ita paulatim
per interualla absorbeant. Vini tamen multitudo
anda est, ac omni arte conandum ut ipsos sopia-
is, ex rosis, pampinis, rubo, & similibus pauimen-
constrato. Odoramenta quoq; naribus admouea-
r, rose, mala cotonea, & eiusmodi. Illitiones etiam
porifere circa frontem adhibeantur. A luo autem
huc egerente, amyllum cum decoctione capiti pa-
ueris per clysterem infundatur: simul enim cohi-
t, refrigerat, & somnum inducit. Ad uomitiones
ero coercendas, succum malorum cotoneorum, pi-
orum puniceorum, & mespilorum deuorare conue-
t. Si ne his quidem auxiliis cibum retinent, extrin-
cus contra uentriculū ipsum cucurbita leuis quā-
axima admouenda est. Ad contractiones autem
musculis factas, linimenta oleo calido imbuta mu-
ulis circumponere oportet, & cerata humida seu
nguenta, quibus adiectū sit aliquid castorei, & olei
ini, quorum copiam in Cap. de Resolutione & cō-
ulsionē offendes. Vbi morbus inclinauerit, ad bal-
eum deducendi sunt egri, cibisq; reficiendi erunt,
ullis gallinaceis, columbis, gallinis, perdicibus, pa-
umbis, turdis, & consimilibus.

De diarrhoea.

Cap. VIII.

Διάρροια Græcis est, copiosum sine exulceratione
& inflammatione alui profluuiū. Fit propter
imbecillitates instrumentorum uentris, alimē-
copiosa humidiora & uiscosiora, eorundemq; cor-
uptelam, mordicationem item in uentre cōtentorū,
refluxū quorundam ē supernis ad uentris spacia, im-
becillitatēq; retentricis facultatis. Notē quib. cause
discernuntur, manifestē admodum sunt. Si enim ob
imbecillitatē fit instrumentorū concoctioni seruiē-
tium, uentriculi nimirū, intestinorum, iocinoris &
ienis, ex propriis Capi. petēda signa erūt. Sin ob alimē-
torum

Somnus
ut conc
landus.

diarrhoea
Causa.

Signa

Curatio

Alui pro-
fluuium
non teme-
re sisten-
dum.

Bilioſæ
diarrhoeæ
Curatio.

torum, prauorum ingestionez accidat diarrhoea, par-
tim de egri sermonibus, partim ex iis quæ excernun-
tur disci potest. Si enim biliosa fuerint, flauo colore
excrementa infecta erunt, neq; citra mordicationez
& caloris sensum eiicientur. Aderit etiam oris amari-
tudo, sitis, tenuis habitudo corporis, & alia quæ ha-
bitum biliosum ostendunt. Sin pituitosa fuerint, co-
traria prorsus quæ per aluum excernuntur erunt. Si
à capite in uentrem confluunt humores, egestionez
spumose erunt, cerebriq; temperies humida. Si à ple-
nitudine totius corporis oriatur, aut iudicatorius
sit alui fluor, signis quæ in Commentario de Pleni-
tudine, & in libris de Crisib. à Galeno dicta sunt, de-
prehendetur. Cæteruz si ab imbecillitate instrumē-
torum alui profluuium excitabitur, intemperies quæ
imbecillitatem parit, suo contrario, quemadmodum
Cap. i. huius Libri diximus, corrigenda erit. Si autē
propter alias causas fluore aluus laborauerit, & na-
tura per hunc quæ noxia sunt & superuacua expelle-
re tentauerit, quiq; eo correpti sunt facile tulerint,
tuz usquequo natura omnē suam curam impenderit
expectare, aut ipsius etiam motus adiuuare conue-
nit. Etenim obluetari & excretionis cohibitionem
moliri, maiorem morbum facit. Si quidem quæ co-
hibentur, sursum perlata dolores capitis, aut phreni-
tidias, aut lethargos, aut parotidas inferunt, planē pe-
riculosos. Quare in principio ea quæ in corporis
commoditatem utiliter excernuntur, minime inhibe-
re oportet. Postquam uero iam diutius perseueraue-
rit fluor, non solum superuacua euacuans, ueruz ha-
bitum corporis ueluti colliquans, uiresq; consumē-
tunc sanē resistere eis oportet, tum per ea quæ per o-
sumuntur, tum quæ per anum infunduntur, atq; e-
quæ extrinsecus imponuntur. Si itaq; biliola pura r-
crementa prodierint, in magis salubria permutar-
ipsa oportet, non tamen per cohibitionem statim eo
curare

ve. Biliosum enim tum in uentre, tum in ieiuno
 stino aggregatum, atq; post coaceruationem re-
 tum, maximopere ledet. Nam & stomachum sub-
 tit, & uiscerib. inflammationes infert, & sitim accé-
 & febres instaurat, omnesq; prædictas in capite
 siones efficit, atq; in totum grauius malum red-
 . Quod si igitur humores biliosi in corpore copio-
 uerint, natura per medicamenta leuia, ut est dilu-
 rhabarbari, casia fistularis, cortices myrobalano-
 m luteorum, aut mel ærium (mannam Arabes uo-
 nt) iuuanda erit. Lac tandem bubulum aut capri-
 um tepidum, recens mulctum ac potatum exhiben-
 am, aut ad ignem decoctum, assidueq; agitarum do-
 ec ad tertias sit reductum, quod ipsum & per fluuia
 s silices, ferriq; laminas igni cādefactas, ac in lacte
 tinctas fieri potest. In decoquendo autē superstan-
 m concretionem siue spumam auferre opz. Hoc sa-
 e nullum compendiosius remedium ad fluxiones
 liosas reperire poteris. Quandoquidem autem fe-
 icitantibus lac ipsum in nidorem aut etiā acorem
 onueriti consueuit, maiusq; nocumentum quāz cō-
 modum inferre, sanè in præsens ipsum exhibere uita-
 imus. Aque uero quarta parte ad lac ipsum affusa,
 decoctionem faciemus, donec dimidium eius consu-
 natur, atq; hoc modo exhibebimus. Si autem in in-
 estinis aggregata bilis fuerit, clysteres ex hordeo de-
 octo, saccharo rubeo, oleo rosaceo, ouorum uitel-
 is, & similibus confectos iniicere oportet. Biliosis
 iacuatibus humoribus, intrinsecus ea quæ adstringūt
 & roborare possunt exhibenda, ut sunt saccharuz ro-
 laceum, diacitoniten sine speciebus, diatriasantalī,
 pastilli de spodio, miua cotoneorum, & eiulmodi.

Lac co-
 elum.

Diarroea
 ex pitu-
 lis humo-
 ribus cu-
 ratio.

I reā

re à purgatione auspicanda curatio erit. Exhiberi itaq; in hunc usum agarici dilutum cum myrobanis empeliticis, aut aliud quod prædictos humores educere possit. Conueniunt etiam clysteres, potius si in intestinis uiscosorum humorum copia aceruata fuerit, ex centaurii minoris decocto, obrutaceo, & similibus. Intro corpus exhibenda diatoniten cum speciebus, zingiber coctum, & alia que calefacere & exiccare possunt. Extrinsecus etiam quæ

Diarrhoeæ robur addunt ad mouenda. Si ob retentricis facu-
ex imbecil tis imbecillitatem orta fuerit diarrhoea, ea sunt ad
litate retē benda medicamenta, quæ ad alias fluxiones alui
trictis fa modicas admouentur. Irrigationes itaq; ex oleo
cutatis cu phacino aut rosaceo, aut melino, cum uino aliquo
ratio. austero. Efficacius autem his est myrthinum, si uen-
Simplicia mentiori opus est adstrictione. Gallas etiam, mal-
adstringē riu, & balaustia in oleis prædictis incoquere liceb-
ia aluum. Perseuerante autem adhuc fluxione, emplastra & res-
 rata ex adstringentibus, & exiccantibus, apparatus, im-
 da erunt, quorum aliqua in Cap. de Lienteria detul-
 bemus. Est autem in primis hoc efficax & parabile,

Ceratum.

℞. Mora præ immaturitate adhuc acerbiora & albi-
 tia septem, quibus ubi probè contusa fuerint, addi-
 tur olei rosacei. ℥.ii. ceræ. ℥.i. & fit ceratum. In potu-
 ro accepta, uentris fluxiones, post sufficientem in-
 lium euacuationem, sanant, cum inum, adianti de-
 ctum, spinæ albæ radix, apii similiter semen drachi-
 pondere datum. urinam enim irritat. fluxiones ad-
 testina factas, eò diuertens. Mora etiam immatura
 adhuc acerba, ad solem pluribus diebus exiccata, co-
 inde reposita, usuq; expetente trita & bibita, mihi if-
 aluum restringunt. Contunduntur quoq; & ob-
 sonis admiscuntur, quemadmodum rhus (iuma
 nominant) consuevit. Interdum enim eius. ℥.i. cu-
 pullo gallinaceo decoquitur. Magis tamen aluum
 cohibent rubi mora immatura, & acerba, eodem n-

iccata, & in potu exhibita. Inter cōpositas medi
 mirifice conferunt, pastilli de spodio, theriaca,
 toniten, diatriasandali: & hæc, quæ. ℞. Specieruz
 iasandali, specierum diarhodon abb. añ. 3. ii. co
 rum rub. thuris electi, rosarum rub. añ. 3. s. spo
 1. seminis acetosæ, rhois obsoniorum, id est su
 1. añ. 3. i. balauſt. acatię. añ. 3. s. mastiches. 3. s. bo
 nenig. 3. i. sacchari candidissimi. 3. viii. dissoluti
 qua plantaginis, fiat confectio in morsulis. Aut
 ecligma, quod. ℞. Sacchari rosacei ueteris, diaci
 ten sine speciebus, rob de ribes, rob de oxyacan
 id est de berberis. añ. 3. s. miuę cotoneoruz simpli
 1. iii. diamoron. 3. v. specierum diatriasandali. 3.
 orallioꝝ rub. 3. i. spodii. balauſt. añ. 3. s. boli arme
 3. i. cum syrupo myrthino, fiat ecligma. Ceteruz
 in aquam nunquam non parataz habebis, quæ. ℞.
 ois obsoniorum quartam unam, aque pluuialis
 iii. in quibus die & nocte sumach maceretur, dein
 iat, & rhu bene ac ualide exprimatur. In ea siquidẽ
 ia oryza, milium, & alii cibi coquantur, aut saltem
 qua illis portio affundatur. Si propter defluxum
 aliis corporis partib. diarrhœa accidit, curatio ex
 propriis capitibus petenda erit. uerbi gratia, si ex ca
 de defluxio fit, ad ea quæ in Capite de Curatiõe de
 lationis dicta sunt, recurrendum erit.

De lienteria.

Cap. IX.

Lienteria, quemadmodum ipsum nomen indi
 cat, leuor quispian intestinorum est: passio ni
 mirum, in qua intestina cibos non retinent, s;̄
 atequam in uentriculo coquantur, celerrime ex
 eta dilabuntur non cocta, sed qualia antè sumpta
 erunt. Latinis itaq; leuitas, aut leuor intestinorũ
 dici potest. Oboritur autẽ frequẽter, dysenteria ma
 na pꝛecedente, & ex profunda ulceratione, cicatrice
 enſa & leui succedente, quæ deinde ob densitatem

I ii quidem

Composi
ta cobi
bentia al
uum.
Cōfectio
in morsu
lis.

Ecligma.

Aqua.

Diarrhoe
ex deflu
xu humo
rum e su
pernis o
ta curatio

Lienteria.

Causa.

quidem suam, ciborum per corpus digestionem non permittit, quum sanè uenarum ora finiti obrurata: uenarum in quaz, quæ alimentum testinis ad se auellunt. Cui lenorem uero cibum, et priusquàm permutationem et perfectam concoctionem admittat, dilabi sinit. Fit nonnunquàm ex inutilitate facultatis cibos in uentriculo concoqui ac digerentis. Hac enim imbecilla, nec coqui nec digeruntur alimèta: sed cruda, humentia, imperfecta, nihilue immutata excernuntur, aluo contra fluida. Interdum etiam post longum uentris fluxum oboritur. Aliquando etiam aqua intestinum per uentrem euacuata, lienteria consequi solet.

Signa.

Ex quacunque igitur causa lienteria orta sit, egri uenter non sentiunt, et malum corporis habitum habent. Succedit itaque egri assidua excretio cruenta, colore subalbida, inequalis, et aquosissima, citra sanis ac bilis complexum. Adest autem simul et per tota hypochondria se dilatans, quem cibi dimitatur fastidium.

Curatio

Ceterum quum eiusmodi perit fit, facile est intelligere quod facultatem retentam et concoctricem tum uentris tum intestinorum non modo refocillare oportet: id quod in primis ciborum conuenientium exhibitionem fieri potest. Uictus rationem restituendis ac refocillandis aptam. Conueniunt itaque carnes auicularum, mularum, pulli gallinacei assi, in quorum uentre aut mastiche imponi etiam debet, et alia quæ in sequenti de Dysenteria commemorabuntur. Vinum bendum adstringens. Cibus autem qui exhibetur.

Curatio**lienteria****ex imbe-****cillitate fa-****cultatis co-****coctricis.**

titate paucus sit, et concoctu facilis. Potus etiam guus sit: multus enim, uentris fluxionibus omnino infestissimus existit. Si itaque ex imbecillitate facultatis concoctricis fit lienteria, eodem modo quo in ipse de Imbecillitate uentriculi dictum est curetur. Tro enim et extra corpus adhibenda ea quæ ad-

et tam uentriculum quam intestina roborare
unt. Exhibendus itaq; syrupus de absinthio, aut
ta, confectionesq; alię uentriculum corroborā
extrinsecus uero ad mouenda sunt ea quę in Ca
de Diarrhœa dicta sunt, et in sequenti de Dysen
Cap. dicetur. Conueniet autē in primis hoc un
ctum, quod. ℞. Oleorum mastichini, de absin
de menta, myrthini. añ. 3. ii. pulueris cinnamo
lecti, gariophyllorum, galangę. añ. 3. i. balauft.
arum rub. añ. 3. s. cere quod satis est, fiat unguen
um. Vel hoc ceratum, quod. ℞. Oleorum mastichi
de absinthio, cotoneorum. añ. 3. i. olei de menta,
calami odorati, gariophyllorum, thuris. añ. 3. i. li
aloes. 3. s. rosarum rub. santalorum alborum et
peoruz. añ. 3. s. mastiches, cumini. añ. 3. i. hypocisthi
acatię, rhois, hoc est sumach. añ. 3. i. s. gallię mos
ate. 3. i. cum cera et resina quod satis est, fiat cera
um. Porro quib. cicatricem factam esse coniectamus,
etiā acrium rer. comestiones frequentiores apte
sunt. Acrium enim rer. comestio uelut refrica
onem quandam cicatricuz operatur, quin et insitū
lorem reuiuificat, et concoquendi facultatez quo
ammodo refocillat. Conuenient itaq; in hoc casu
Gal. Cap. 9. artis medicinalis autore, quę sufficien
ter abstergunt, et parū adstringunt. Admiscēda itaq;
emper adstringentib. medicamentis abstergentia. In
his causis lenterię omnib. eodē curationis mō utē
n est, quo in diarrhœa et dysenteria affectis utimur.

Vnguen
tum.

Ceratum.

Stacica
tricefacta
lenteria
oriatur.

De dysenteria.

Cap. X.

Δυσεντερία proprie Gręcis exulceratio est intesti
norum. Latinis tormina, quod intestina dolo
re torqueatur, nominatur. Fit interdū a cau
sis extrinsecis, ueluti frigidityte, ardore, et humidita
te. Item malignorum medicamentorum potu, scam
monię scilicet, et similia. A fructuum comestione,
I iii crudi

Dysente
ria.
Causa.

Signa.

**Quando
exulceratio
in tes-
tibus
intestinis
consistit.
Si in cras-
sioribus.**

Vitam.

cruditatibus, acrium ciborum acceptione, ab humoribus, mordacibus et acris ex uniuerso corpore ad uentrem confluentibus, aut in ipso natis. Hec quidem nunc ex tenesimo, nunc per se incipit. Excernuntur primus biliosa, uaria, subpinguia: pingui nimirum quod intrinsecus intestinis adheret, paulatim circumliquefacto. Quum uero superficies intestinorum perfecte fuerit denudata, exulceratioque supernè consistit, seculenta ac cruenta excernuntur. Vbi autem altius penetrauerit ulceratio, etiam sordes pelliculas admixtas habentes expelluntur. Et si non celeriter cohibeatur, uicinos locos depascitur: saniosa uero quedam excernuntur, qualia à mortuorum cadaueribus defluere consueuerunt. Si quidem igitur ab exulceratione cruenta stercorei commixta, cum labore et torminibus, mordacitate ac exolutione, ut non procul ab animi deliquio egri absint, deiciantur, à siti que infestentur, et febricitent, ulceratio tenuia intestina obsidet. Sin autem sincera ac multa egeruntur stercorea, et coaceruata, et cum flatibus prodeunt, pinguia quoque iis commixta fuerint, et cruor supernatauerit, in crassius intestinis ulcus consistere credendum est. Id quod nosse, non mediocriter ad curationem conducit. Nam si in superioribus intestinis ulcus est, ab epotis medicamentis presidium petendum est: si uero in crassioribus, clysterem subiicere magis conuenit. Principium curationis dysentericorum à quiete et modico cibo fiat, undecumque tandem fluor procedat. Permittentibus itaque febribus, lacte recens multo adhuc calido utendum est: aut pro eo lac coctum, quod in Cap. de Diarrhoea descripsimus, exhibendum. Primus enim lac depurgat, simul ea que in corpore sunt contemperando: postremum uero aluum fistit. Opus autem insuper et panem madefactum, à lactis acceptione offerre. Pulses etiam ex lacte apparatæ, tum medicamentum, tum nutrimentum optimum præbent: uelut

uelut est oryza cum lacte, amyllum, & oua lacti com-
mista. Sorbitiões quoq; aut pulres ex alica, milio q;,
adiecto rhoē, conueniunt. Apparanda item puls ex
ficcis panibus affusa posca, aut palmarum, aut malo-
rum cotoneorum, aut pirorum, aut rhois succo. Len-
ticula quoq; probè assata cum plantagine, aut malis
cotoneis contusis decocta exhibenda. Olerum usus
non est necessarius, attamen degustandas exhibebis,
terin seu endiuia coctam, plantaginem, brassicāq;
bis coctam, Damas & ouorum assatorum lutea. Car-
nes dysentericis non ualde commodè existunt, dan-
dæ tamen eis qui diuturno malo uexantur. Ex iis
autem præ cæteris uolucrum eligendæ, perdicis ni-
mirum, palumbium, & montanarum auicularum. Ex
pedestribus carnes capræ & leporis conueniunt. In
potu à principio quidem aqua pluuiā, quæ non sit
ex ædibus plumbo intestis delapsa, utendum est. talis
enim aqua sanis etiam potata dysenteriaz conciliat.
Quod si pluuiā optima non adsit, fontana in qua
chalybs ignitus extinctus sit, utemur. Si uero labo-
rauerit stomachus, aut ubi uires fuerint deiectæ, etiā
uinum præbendum. Sit autem adstringens, & nō ual-
de uetustum. Somnus optimum dysentericis reme-
dium. Quod ad curandi rationem attinet, scien-
dum quidem utendū esse remediis adstringentibus
obtundentibus, resiccantibus, & urinam mouentibus,
atq; adeo fluxionem transferentibus. Quæ adstrin-
gunt, hæc sunt: lapathi semen, rhus (sumach uocant)
galla, malicorium aridum, rubi radix, ladanum, aca-
tia, hypocisthidis, balaustium, folia salicis, symphyti
(consolidam maiorem nominant hodie) radix, fo-
lia & semen: rhēon ponticum, si haberi potest: althææ
radix, equisetum. coralli, mastiche, coagulum leporis,
sanguis draconis, cortex thuris, lemnia terra, uerba-
sci radix, mora acerba, acini uue, plantaginis semen,
similiter folia & radix, maceris cortex. Obtundunt

Potus.

Curatio.

Adstrin-
gentia.Obtund-
tia.

I iiii autem

Reſiccantia.

Si craſſiora inteſtina exulceratione laborauerint.

Clyſter abſtergens Infuſum conglutians.

Dolor leuans infuſum.

Si in teſtibus ſit exulceratio.

autem ⁊ contemperant humorum morſus ⁊ acrimoniam, amyllum, tragacantha, gummi arabicum, adeps caprinus, hircinus, ⁊ ſuillus, anſerinus ac gallina ⁊ ceus. Reſiccat coagulum leporis, cornu ceruinum uſtum, teſte cancerorum fluuiialium, ⁊ ſaluia. Vrinam mouentia pete ex ſuo Capite. Quod ſi itaq; craſſiora inteſtina exulceratione laborant, clyſteres adhibeantur, primum quidem abſtergendi ui præditus, quilibet eſt qui. ℞. Aquę decoctionis hordei integri lib. i. mellis roſacei colati. ℥. i. ſacchari rubei. ℥. s. uitellos oui num. ii. olei roſacei. ℥. iii. miſce, fiat clyſter. Facta abſterſione, ea quę glutinare poſſunt infundantur, quale eſt quod. ℞. Roſarum rub. plantaginis, foliorum ſymphyti, polygoni (corrigiolam uocant) uerbſci. añ. M. i. gallarum, rhois obſoniorum. añ. 3. ii. burſę paſtoris. M. s. balauſtiorum. 3. i. oryſę roſte. 3. i. radicis ſymphyti. 3. s. Decoquantur ſingula in aqua chalybeata, donec tertia pars abſumatur. Dein. ℞. Colaturę lib. i. ſucci plantaginis. 3. ii. acatię, hypocithidis. añ. 3. ii. boli armenię, ſanguinis draconis. añ. 3. i. adipis caprini. 3. i. oleoꝝ roſacei, myrthini. añ. 3. i. s. miſce, fiat infuſum. Interdum dolor tam uehemens eſt, ut non ſolum obtundentia, uerumetiam ſtupeſactia medicamenta ſint iniicienda. In quem ſanẽ uſum cõuenit hoc uti clyſteri, quod. ℞. Lactis caprini aut uaccini lib. i. butyri ſalis experti. 3. i. adipis caprini. 3. i. s. tragacanthę gummi arabici. añ. 3. i. uitellos ouorum numero. iii. M. pilularum de cynogloſſa. 3. i. olei roſacei. 3. iii. miſce, fiat clyſter. Si uehementiori ſtupeſactione opus fuerit, opii grana aliquot pro pilulis de cynogloſſa adice, nempe tria aut quatuor. Ceterum ſi in tenuibus inteſtinis exulceratio conſiſtit, tunc remedia quę per os ſumuntur, magis deſiderat. Cõuenit itaq; decoctus ex rebus adſtringentibus ſuprà cõmemoratis, adiectis ſyrupis roſaceo ⁊ myrthino, cū aliis quę in Cap. de Diarrhœa dicta ſunt, exhibere.

Poteſt

Potest etiam hoc medicamentum assumi, quod. ℞. De cocti radice symphyti, aut alterius medicamenti adstringentis. ℥.iii. syrupi rosacei. ℥.i. syrupi myrthini. ℥.s. pulueris trochiscorum de spodio, seminis plantaginis, boli armenie. añ. 3.ii. misce, fiat potio. Extrinsicus præter ea quæ commemorata sunt in Capitib. de Diarrhœa et Lienteria, ad mouendum erit hoc ceratum, quod. ℞. Oleorum masticini, rosacei, myrthini, cotoneorum. añ. 3.ii. farine hordei, fanogreci, añ. 3.ii. s. rosarum rub. plantaginis. añ. 3.ii. balaustrorum, sanguinis draconis. añ. 3.ii. boli armenie. 3.ii. hypocistidis, acatie, mastiches. añ. 3.ii. cum cera et resina quod satis est, fiat ceratum. Possunt et multa alia ad exemplum illius componi, quæ commemorare singula et superuacaneum et inutile iudico.

Extrinsicus
que
adhibenda
Ceratum.
optimum.

Detensio.

Cap. XI.

Tενεσμός est assidua et quæ differri ad deuitari non potest, desidendi seu egerendi cupiditas, quæ tamen nihil præter modica cruenta, uel mucofa, egeritur. Latinis tenesmus, barbaris medicis nostri temporis tenasmus. Fit interdum propter frigiditatem extrinsecus occurrentem, humores acres, biliosos, aut pituitas, salsam, ulcus, aut inflammationem in intestino recto obortam. Interdum etiam stercoris in intestino cæco coacti obstructio tenesmus efficit. Causas extrinsecas de sermonibus egri intelliges, quia nimirum podice attigit res frigidas, aut hyberno tempore frigus nimium pertulit, aut in aqua frigida diutius commoratus est. Humores ex iis quæ excernuntur dignosces, quæ uel biliosa aut pituitosa erunt. In ulcere purulenta ac saniosa excernuntur, et in ano doloris pungentis sensus inest. Inflammatio tumorem recti intestini, et dolorem grauius unâ cum febre efficit, Stercoris multitudinem grauis distentionis sensus circa anum uentrem sequitur. Curandi ratio

Tenesmus.

Causa.

Signa.

Curatio

iuxta

Si a frigore.

iuxta causarum diuersitatez uariatur. Si itaq; tenes-
mum frigus precesserit, uinum meracum calidum bi-
bendum dato, ac pectinem, inguinaq; ac inter anum
et scrotum intercapedinem, ^{ἡ εἰς ἄλλοις} Græci uocant,
oleis ac fomentis calidis irrigato ac foueto: qualia
sunt rutaceum, et liliorum alborum. Furfures autem
in uino decocti, ac sacculo excepti, commode sedi
adhibentur. Clysteres quoq; ex decocto mentastri,
origani, calaminthe, chamæmelo, abrotono, semine
anisi, fœniculi, et similibus cōfecti, adiectis oleis ane-
thino, chamemelino, liliaceoq; iniicere oportet. Por-
rò mirifice confert, si statim ab excreatione admo-
ueatur later perquam uetustus, et à fumo denigratus,
una cum complexis in eo paleis tusus, deinde feruen-
ti aceto subactus, lintheoloq; illigatus sedi subdi-

*Si a bilio-
sis humo-
ribus.*

tus. Cæterum si à biliosis humoribus in ano ac in-
testinis detentis fiat tenesmus, clysteres quibus abster-
gendi atq; abluendi inest facultas iniiciendi sunt, q̄-
lis est qui. ℞. Decocti hordei lib. i. sacchari rub. ʒ. i. s.
mellis rosacei. ʒ. i. uitellos oui numero. ii. olei rosa-
cei. ʒ. iii. misce, fiat enema. Vitet omnia acria eger, ac
uratur mediocriter frigidis et humidis, q̄ bilis feruo-

*Si a pitui-
tosis.*

rem obtundere possint. Si a pituitosis humoribus
procreetur, tum curabitur ut is qui à frigore factus
est, adiectis tantum clysteribus iis quæ pituitam ua-
cuare possunt medicamentis, benedicta nimirum la-
xatiua, aut eclegmate Indi, uel diaphœnicō. Si uero
ab inflammatione oriatur tenesmus, ptisanæ succus,
paucis rosis rubeis simul cum eo decoctis infundat.

*Si ab in-
flammatio-
ne.*

Aut uehementiori infestante inflammatione. ℞. de-
cocti plantaginis. ʒ. v. olei rosacei. ʒ. ii. oui albumen
unum. misceantur omnia, et iniciantur per clysterē.
Extrinsecus perington, hoc est, locus inter scrotum et
anum, oleis rosaceo et myrthino irrigandus. Aut ad-

Fomentus

hibeatur tale fomentum, quod. ℞. Rosarum rub. plā-
taginis. añ. M. i. balaustiorum. ʒ. iii. sidiorum. ʒ. i. bac-
carum

carum myrthi. 3. ii. foliorum rubi. 3. i. Decoquantur singula in aqua sufficienti, donec tertia pars absumat. In eo decocto imbuta sponsia sedi adhibeatur. Vbi opus est suppuratione aut digestionem, fomēta ex decocto radicis altheę, fœno gręco, chamomillę, meliloti, & furfurum composita adhibenda erunt. Si uero ab ulcere fiat tenesmus, primū abstergentia infusa, deīn glutinantia, haud iecus quam in dysenteria, admouenda. Unguentum etiam hoc sedi inditū fert, quod. ℞. Olei rosacei. 3. i. s. mucositatis tragacanthę, gummi arabici. añ. 3. iii. cerusę, plumbi usti. añ. 3. s. aloęs, thuris. añ. 3. i. cere quod latis est, fiat unguentum, quo linamenta imbuta sedi indantur. Si dolor immensus fuerit, prædictis opii. 3. i. addi potest. Si a sterco-
ris multitudine oriatur tenesmus, tum clysteribus lenientibus paulatim sterco-
ra educi debent, hoc nimirum uel simili, quod. ℞. Maluę, altheę, mercurialis, betę, foliorū uiolę. añ. M. i. se. fœnogręci, lini. añ. 3. s. Buliant omnia in aqua sufficienti, donec tertia pars absumpta fuerit. ℞. Colaturę lib. i. & dissolue in ea casię fistularis. 3. i. s. olei cōmunis. 3. iii. salis triti. 3. i. fiat enema. Porro hoc etiam unice cauendū erit, ne purgantia tum medicamenta bibenda dentur, quō-
inde summū egrotanti exitium immineat, attractis aliunde exq; toto corpore ad priorem copiam sterco-
rum excrementis, ut diffusē in Paradoxis docuimus.

Si ab ulce-
re.Unguen-
tum.Si a ster-
coris co-
pla.
Clyster

De coli doloribus. Cap. XII.

Dolor qui in laxiore intestino, quod colon ap-
pellatur, suboritur, ob multas causas fieri solet
potissimū uero quatuor. Primū, propter cras-
sos & pituitosos humores intra coli membranulas
subsidentes. Secundo, propter flatulentos spiritus, quibus non sit exitus. Tertio, ob inflammationem, intesti-
num hoc distendens ac male habens. Quarto, pro-
pter acres & erodentes humores, qui colon dictum
intesti-

Causę.

Signa.

Intestinum infestant. Quibus crassus pituitosusq; humor dolorem excitat, hi per totum abdomen in alto excruciantur, præsertim uero ubi coli situs est, ibi quasi tundi ac perforari intestinuz sentiunt. Tormina quoq; affligunt, ructus, nausea, uomitio uaria, potissimū pituitæ. Aluus grauer impedita nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Stercus autem quandoq; excretuz, bouino simile uidetur, leue et flatus plenum. Præcedens horum causa est, continuus ciborum quàm maximè frigidorum crassiq; succi usus, satietas, cruditas, otium, et iis finitima. Qui autem ex spiritu flatulento dolent, tensionem magis experiuntur. Quibus uero propter internam inflammationis feruorem dolor accidit, hos febris haud ignaua uexat, urinq; quoq; simul et stercoris retentio accidit, pulsus hos etiam iuxta uentrem exercet, sitis, ardor, nausea, et uomitiones potissimum bilis, quæ nihil leuant malum. Hæc q; omnium grauissima est, q̄ in ileum transitionem minatur. Quibus acres rodentesq; succi dolorem mouent, sicut etiam qui inflammationem experiuntur, hos ardor, sitis et uigilia torquet, imò et febricula, sed minus quàm illos. Urina redditur acris, et biliola deiciuntur. Sæpius autem alui deiectio maiorem excitat cruciatum, grauiusq; irritant calidiores cibi potusq; assumpti. Quo uero pacto coli et renum affectus discernendi sint, docet

Curatio Galenus lib. 6. de Affe. loc. Cap. 2. Viſus et curandi ratio iuxta causarum diuersitatem uariatur. Quia

doloris co itaq; crassi ac lenti humores doloris causa existunt,

li a crass uictus ratio in uniuersum extenuans sit. Panis itaq;

et pituito quo uescitur eger, recens ac in clibano aut furno p-

sis humo bē sit coctus, Ex carnibus conueniunt in primis uo-

ribus. lucrum, gallinæ nimirum, perdicum, palumborum,

Viſus ras turturum, et columbaruz. Fugienda omnia uolucrum

tio exte genera, quæ in aquis degunt. Ex quadrupeduz ani-

nuans. mantium genere conueniunt carnes uitulinæ et hæ-

dinæ.

dinæ. Legumina omnia uitanda, quòd huic passio-
 ni incommoda sint. Inter olera conueniunt apium,
 asparagus, et similia. Allia quoque cruda, et cepas de-
 uorare, haud nocebit. Et ut summam dicam, alimen-
 ta sint boni succi, et concoctu facilia, satietasq; ac
 cruditas uitetur. Bibendum uinum subadstringens,
 album, tenue, pellucidum, mediocri ætate, temperatu-
 ra dilutiore. bibaturq; modicè. Quod uero ad cu-
 randi rationem attinet, si crassi et glutinosi humo-
 res dolores contraxerint, medendum quidem sic ut
 non uehementer calefaciamus, quippe ab huiusmo-
 di præfidiis diffunduntur et inflantur omnes frigidi
 ac crassi humores, qui intestina distendendo augent
 dolores. Conuenit itaq; ipsos diffecare et còcoque-
 re citra uehementem calorem, et per eorum quæ mi-
 nime inflant, usum. In exacerbationibus igitur irri-
 gationes fiant ex oleo rutaceo, chamæmelino, et ane-
 thino. Item fomenta, et sacculi ex floribus chamæme-
 li, anethi, meliloti, seminibus lini, fœnogræci, althææ,
 et milio. Mirificè autem conferunt clysteres ex oleis
 iam commemoratis, et decocto prædictarum herba-
 rum, aut cucumis syluestris radicum, adiectis cumi-
 no, uel ruta cum adipe anserino, uel gallinæ, confe-
 cti ad eum modum. ℞. Maluæ, althææ, chamæmeli,
 mercurialis, anethi. añ. M. i. origani, calaminthæ, pu-
 legii. añ. p. i. seminum lini, fœnigræci, cumini, smyr-
 nii. añ. 3. iii. Coquantur singula in aqua fontana, do-
 nec tertia pars absumatur. ℞. Colaturæ lib. i. hieræ
 picræ. 3. s. benedictæ laxatiuæ. 3. v. ecligmatis Indi. 3.
 i. s. mellis rosacei colati. 3. s. oleorum chamæmelini,
 anethini, rutacei. añ. 3. i. uitellos oui nume. ii. salis cò-
 muni. 3. i. s. misce, fiat engma. Glandiũ etiam admo-
 tiones, illitionesq; sedis, ex succo cyclamini cũ mel-
 le et nitro, uel centaurio minore cum melle et nitro.
 Glandes autem sic còponi debent. ℞. mellis còcti. 3. i. s. Gl. m.
 spèruz hieræ picræ. 3. i. colocynthidos. 3. i. salis gémæ.
 3. s. mi

Curatio :

Anodyna

Clyster.

Gl. m.

Vomitus. B.s. misce, fiant glandes oblonge. Vomitus etiam ante canam, si quis facile uomat, præ omnibus auxiliatur. Porro ubi facta iam euacuatione dolores producuntur in multas horas, in solium olei calidi, aut si hoc fieri non potest, in hydrelæum descendere alienum non est. In seffus etiam utilis ex decocto altheæ, pulegii, foliorum lauri, fœnigræci, chamæmeli, artemisiæ, anethi, & similibus. Conuenientissimum uero ad colicos medicamentum, uinum absinthites existit, si plibatione à balneo opus habent. Estq; etiam non sititibus ualde commodum. Decoctum quoq; herbæ ipsius, ubi semel tantum ebullierit, pari modo ad uinum quod alias pro consuetudine bibunt, admixtum, uti

**Vinum ab
sintbites.** liter à balneo præbetur. Castoreus etiam assidue potatum, totius affectionis malum demolitur, omnibusq; medicamentis præstat. Datur eis drachma una in tribus cyathis aquæ mullæ. Quod si dolor non conquieuerit, propinandum erit medicamentum diatrionpipereon, uel theriaca. Quod si uero dolor est uehemens, mediocriter lenientibus ac mitigantibus uti conuenit medicamentis ab inferioribus partibus

**Stupefacta
uentia.** inditis, aut potis. Nam quæ ualenter stupefaciunt uitare oportet, quod paulisper quidem leniant, sed diuturniorem affectum efficiant, dum materiam incrassant, meatusq; intestini condensant. Anodynis itaq; propriè uocatis medicamentis, quorum aliqua initio Capitis dicta sunt, iterum utendum. Quæ autem à tota substantia colicis auxiliantur, multa sunt. Lupi autem stercus maximè album, ex aqua aut uino albo tenui summè conuenit. Melius autem stercus censetur, quod non in terram delapsus reperitur, uerum in fruticem aut herbam excretum. Mirum etiam in modum colicos iuuat, amuleti instar illis ægroti alligatum idem lupi stercus. Reliqua apud Aëtium lib. 9. Cap. 31. descripta habes. Porro si flatulentus spiritus doloris causa fuerit, clysteres qui flatum discutiunt

**Quæ a tota
substantia
conferunt
colicis.**

**Coli doloris a flatu
ientis spiritibus.**

scutiunt infundendi, qualis est qui. ℞. Abrotoni, origani, pulegii, calaminthæ, chamæmeli. añ. M. i. rutæ, mente, parietariæ. añ. M. s. seminum anisi, fœniculi, carei, cumini, anethi, smyrnii, dauci. añ. 3. ii. Decoquantur, donec tertia pars absumpta fuerit. ℞. Colaturæ lib. i. hieræ picræ, benedictæ laxatiuæ. añ. 3. s. castorei. 3. i. specierum diacumini. 3. ii. oleorum rutacei, anethi. añ. 3. i. s. salis cõmunis. 3. i. misce, fiat enema. Potest etiam prædictis addi ecligma de baccis lauri, quo ad discutiendos flatuosos spiritus nihil est efficacius. Proderit etiam eius ecligmatis quantitatem nucis auelang, in decocto aliquorum incidentium medicamentorum indies propinare. Extrinsecus autem abdominibus quæ flatus dissipant fouendum, ac irrigandū erit. Sunt autem præter ea quæ dicta sunt, nigella, ammi, oreoselinum, amygdalæ amaræ, piper nigrum, mentastrum, bacce lauri, absinthium, semen urticæ, acorus, maiorana, et cinnamomum. Ex iis itaq; cataplasmata, fomenta, aut iacculos conficies, Quod uero reliqua omnia uincit, et incantamenti cuiusdam simile quid efficit, Galeno lib. 12. Ther. meth. Cap. ultimo teste, est cucurbita maxima leuis cum copiosa flamma toti abdomini affixa. Aeger etiam à diluti uini, et frigidæ aquæ potu, lactis et aliorum refrigerantiis, ac flatuosos spiritus gignentium alimentorum usu, sibi caueat. At uini potius meracioris potu, uictusq; ratione aliqua calefaciente ac incidente utatur. Præterea inflammatione intestinū exercente, uena in cubito aperienda est. Si uero urinæ difficultas superet ac dominetur, ex maleolo sanguis detrahendus erit. Prædictis etiam utendum remediis, exceptis acerbis, et uehementer purgantibus. Enematis uero potius lenientibus, item cataplasmatibus, et irrigationibus, et in oleum descensu utendum. Cucurbitulas etiam iis affigimus. Victus autem ratio tenuis sit, et fere febricitantium, donec inflammatio soluetur.

Curatio.
Clyster.

Flatus dissipationis.

Cucurbitula magna

Victus.

Coli doloris ab inflammatione curatio

Victus.

Coli doio
ris ab acris
bus & ro
dentibus
humorib.
curatio.
Enema.

Balnea.

Vitæ.

Stupefacientia.

tur. Atqui si propter acres rodentes quæ humores dolitant egri, per sedem infundere conuenit ea quæ humores eluere, atq; citra mordacitatez purgare possunt: cuiusmodi est ptisanæ succus, aut decoctum fœnigræci, seminis lini, chamæmeli, & althææ, cum adipe recenti anseris uel gallinæ, & rosaceo oleo. Conuenit autem hoc potissimum enema, quod.℞. Foliorū uiolæ, intybi domestici utriusq; foliorum althææ, chamæmeli. añ. M. i. s. seminum fœnigræci, lini. añ. ʒ. s. Buliant in aqua sufficiens, donec tertia pars absumpta fuerit.℞. Colaturæ. ʒ. xiii. casie fistularis. ʒ. i. hieræ picæ. ʒ. vi. olei rosacei. ʒ. ii. olei anethini. ʒ. i. pinguedinum anseris, gallinæ. añ. ʒ. iii. uitellos oui numero. ii. misce, fiat enema. Non autem solum uacuare, uerumetiam temperare infestantem humorem oportet. Quapropter balneis ex dulci aqua utendum: ea enim mitigare, & somnum conciliare possunt. Exhibendus etiam syrupus uiolaceus & rosaceus, & alia eiusmodi, quæ contemperare, ac uim mordacium humorum obtundere ualent. Utendum etiam cibo sordibili, ptisana nimirum, ac piscibus saxatilibus. Abstinentum acribus omnibus tum cibis, tum medicamentis, fomentis, irrigationibus, cataplasmatibus calentibus, necnon uini portione, potissimum ueteris. Et ut rem paucis perstringam, tota uictus ratio humidior & frigidior sit. Quum autem dolor nihil remiserit, sed uehementius subinde sequerit, ad stupefacientium usum confugere oportet. In hac enim passione, non solum quod sensus stupefaciunt, sed & quia humores renues incrassant, caloremq; refrigerant, opitulantur. Inter ea uero potissimum philonius conuenit, de quo usq; ad integram drachmam exhibere licebit. Et catapostia de cynoglossa inscripta, ex una drachma, ut antea quoq; dictum est, sex conficiendo pilulas, unāq; ante cubitum exhibendo, mirifice conferunt.

De ileo.

Ileos, passio est intestinorum tenuium, grauissi- Ileos.
 mos et letales dolores inferens. Sic dicta à circū
 actione doloris. ἰλεός siquidem Græcis est cir-
 cumuolui, et circumagi. Hinc est quod Latinis con- Conuolu-
 uoluulus et uoluulus dicatur. Barbaram sectantes ulus et u-
 medicinam, Iliacam nominant. Contrahitur id ui- tulus.
 riū continua ciborum corruptione, et cruditate, ma- Causa.
 xime autem à pinguibus carnibus. Oboritur etiā ex
 plagis ac ictibus quibusdam, iis locis ubi tenuia inte-
 stina sita sunt factis. ex frigore uehementi constrin-
 gente, ac recrementa retinente. Contingit et iis, qui-
 bus intestinum in scrotum una cum stercore delap-
 sum est, indeq; uolenter retrusum, ex eoq; inflamma-
 tum existit. Fit etiam ob ueneni potionez, et ob indu-
 ratum stercus, circa tenuia intestina impactuz. Famī-
 liaris est hæc passio pueris, euadunt tamen beneficio
 naturalis humiditatis. Senibus uero nō ualde fami-
 liaris est: si tamen ipsi hanc passionem incidant, ferē
 nunq; conualescunt. Accedit egris dolor uehemen- Signa.
 tissimus, et tumor aliquis in tenuium intestinorum
 parte eminet, ut uideatur intestinum ad chordę simi-
 litudinem conuolutum: unde etiam cordapson nō Cardap-
 nulli hanc passionē appellauerunt. Adest etiā stoma- sos.
 chi nimia humectacio, exolutio, ruētus inanes nihil
 alleuantes, murmura intestinorum, cohibitio perfe-
 cta stercoris et flatuum. Si uero intendatur adfectus,
 omnia sursum feruntur, ob idq; uomitus pituitæ ac
 bilis accedūt, frigiditas totius corporis, dolorq; plu-
 rimis etiam spirandi difficultas. Morituris autez am-
 plius sudor frigidus, urine difficultas, podex ita ad-
 strictus ut neq; specilli extremuz suscipere possit. Ali-
 quando et stercus uomitu reiicitur. Siquidē igitur à Curatio
 cruditatibus, ac multis uariisq; cibis ingestis fit ma- ilei et cru-
 luz potissimū ubi crudus cibus adhuc insidere uētri ditatibus.

K uidea

uideatur, uomitus concitandus erit. si uero nihil cru-
dorum ciborum in uentre contineatur, omni cona-
tu emendandum est, quo tum flatus, tum stercorea infra
trahantur: idq; per clysteres, glandes, & illitiones, ma-
gna diligentia in singulis adhibita perficiendum.

Enema.

Fiat itaq; tale enema, quod. ℞. Mercurialis, rutæ, fo-
lorum althææ, centaurei minoris. an. M. i. hyssopi,
calaminthæ; absinthii. añ. M. i. s. radicis althææ. ʒ. i. ra-
dicis cucumeris syluestris. ʒ. i. s. seminum lini. fœni-
græci. añ. ʒ. iiii. seminis cumini. ʒ. 2. Bulliāt in aqua suf-
ficiēti, donec tertia eius pars absumpta fuerit. ℞. Co-
lature. ʒ. xiii. benedictæ laxatiue. ʒ. i. butyri recen-
tis: mellis rosacei colati. añ. ʒ. s. oleorum rutacei, ane-
thini. añ. ʒ. i. s. salis. ʒ. i. misce, fiat clyster. Infundendus
est ante cibum; urgente uero malo etiam à cibo. Pre-

Glands.

cipiendumq; ut quamdiu quidem queant egrotantes
retineant. Glandes quemadmodum in coli dolori-
bus parādæ; adiectis semine rutæ; cumino; & brassicæ
caulib. Longiusculas etiam facere oportet; ut pfun-
dius penetrare possint. Cyclamini succo; aut melle
cum nitro podex illinendus. Hoc deniq; malum ca-
taplasmatis; & fomentis; sicut in Cap. de Colicis cō-
prehensum est; curare oportet. Conueniunt autē po-
tissimuz fomenta ex lanis oleo, in quo cuminū; ane-
thum; ruta; & nasturtium decocta sint; madefactis.

Fomenta.

Cataplasmata autem ex semine lini; fenogrecō fari-
na hordeacea, loliacea; ruta; cumino; anethi semiue
& apii. In solium etiam aqua & oleo confertum descē-
dere conuenit. In aqua uero althea; ruta; anethuz; &

cucurbite

alia quæ dicta sunt decoquantur. Post hæc cucurbi-
tæ affigantur: primum quidem ad remotos locos; le-
ues; deinde ad ipsos etiam dolore affectos; scarifica-
tionesq; profundiores fiant. Purgationes etiam assu-
mere conuenit; potissimum ubi primum per ea quæ
dicta sunt; stercorea p̄mū ad inferiora tracta fuerint.

**Purgatio-
es.**

Mirifice ipsis conducit; si uomuerint; anethum co-
ctum

Etum potumq; . A potu autem panem in aquam feruentem conice, eiusq; frustra calida confestim edenda præbe. Si uero à uenenoſo medicamento quis in ileon incidit, aquam tepidam multam bibendam dabimus, uomereq; cogemus. Deinde oleum calidum in potu dandum, aut pinguia iura, ut rursus uomat. Postea ita parumper quiescant, & deinde statim theriacen cum uino dissolutam accipiant. Cibi eis exhibeantur boni succi. Quod si obstructio perseuerauerit, alius lacte scisso, cum modica aloë, aut alio medicamento purgante uacuanda erit. Si ab inflammatione ileos orta fuerit, à uenæ sectione auspicandū erit, deinde cucurbita inflammatis partibus per ambitum sacrificatis affigenda, & enemata ex decocto maluæ, fœnigræci, seminis lini, cum oleo & butyro immittenda. Extrinsecus etiam ea quæ inflammationibus conducunt, & dolorem leniunt, ut in Capite etiam de Coli dolore dictum est, apponenda. Et in inedia ad tertium usque diem seruandi. Si ex intestini in scrotum delapsu ileos accidat, confestim tentandum est, ut decubitu sursum uersus uergente adornato, delapsum intestinum ad inguinū pariter retrudatur, atque leniter citra uiolentiam ac compressionem, ligatur a fasciæ adhibita cōtineatur.

Ilei à uenenoſo medicamento ratio.

Ilei ab inflammatione cura.

Ilei ex delapsu intestini in scrotum curatio.

De lumbricis. Cap. XIII.

Lumbricorum, ἑλμινθας Græci uocant, tres sunt uniuersæ differentiæ. prima teretum seu rotundorum, altera latorum, tertia eorum quos ascarridas nuncupant. Ελμινθες στρογγύλοι, hoc est, teretes lumbrici speciem habent omnibus perspicuam; nempe secundum crassitudinem rotundi sunt, longitudine uero palmares, & aliquando longiores, & aliis frequentiores sunt. In gracilibus plerunq; intestinis consistunt, & superiorem uentriculum subeunt, ideoq; frequenter per os reiciuntur, quibusdā & è narib. redduntur.

Lumbrici.

Teretes.

K ii tur.

Lati.
Ceiria.
Tentia.

Ascarides

Causa.

Signa ro-
tundorum

tur. Atq; hoc genus infantibus & pueris, atq; his qui ad pubertatem accedunt peculiare est. Lumbrici lati à Grecis medicis *κεῖρια*, hoc est instite, à similitudine quam ad institas habent: qua ratione etiā *ταβία* ab iisdem uocantur quod instar, fasciarum sint lati & longi. Incredibilis enī longitudinis sunt tenuē, ut Plinio autore lib. 11. Cap. 33, tricenum pedum alii quando uisē sint, aliquando etiam plurius. Nihil autem est latus lumbricus, nisi permutatio intrinsecus tenuia ambientis intestina membranæ, in corpus quoddā uiuum, & animalis modo mobile. *Ασκαρίδες* tenues ac breues, uermibusq; similes lūbrici sunt. In extremo longanone, & anī fibula (sphinctere; nominant) initio reperiuntur. Origo omniū generū est ex cruda, crassa: pituitosaq; materia: & putredinē accommoda: qualis in pueris aliisq; uoracibus colligitur. Sequitur eos qui rotundos lūbricos continent, incredibilis morsus intestinorum & uentriculī tussiculēq; tenues ac exigue, & frequenter irritantes, quū tamen nihil reiiciatur. Nonnullos comitatur singultus, & somnus cum tremore: & qui his occupatur, sine ratione expergiscuntur, nonnulli & cum clamore exurgunt & prosiliunt, & iterum sopiuntur. Quidam uero & linguam foras protrudunt ac exeunt, oculosq; claudunt, taciturniq; sunt, excitantibus indignantur, ob imbecillitatem uigilare nequunt. Quidam autem oculos sanguine suffusos habent, & pulsum inē qualem, obscurum, deficientem, & recurrentem. Quibusdam etiam appetitus perditio accedit. Pueris insuper dum dormiunt manducatio lingue, cui accedit conformatio oris in modum lātentium, aut accipientium cibū. Plerisq; uero alius delicit, corruptos egerens cibos, & tympani modo inflatur. Reliquum corpus sine ratione contabescit, neq; esurie precedente, neq; euacuatione immodica facta. Atqui non in omnibus omnia quę iam cōmemora-

mora

morauimus signa sunt singulatim inquirenda, sed quæ reliquis præpollent, et principatum tenent: aliquando uero et plurima. Latus lumbricus continuos stomachi morsus infert, et ad cibos impotentes ac incorrigibilem appetitum. Nam quod animatum euasit in intestinis obiectum rapit alimentum, ut alio statim opus sit: et nisi assumpserit, intestina rodantur. Consequitur sic patientes, corporis gracilitas et imbecillitas, assiduusque famis sensus. Infallibile autem ac certissimum indicium, si cum recrementis quædam cucurbitæ semini similia excernantur. Ascari des uehementem pruritum in ano excitât, assidueque ad egerendum irritant: et qui hoc malo afficiuntur, ut plurimum ab excretionem melius habent. Victus ratio calida et sicca sit, potissimum si febre ægrotantes uacauerint, cibisque utantur probi succi, et qui facile in membra digerantur, nec lumbricorum effectricem causam adaugeant. ideoque omnia quæ pituitosos humores procreare possunt, fugienda. liberius nutriantur, famemque minime ferant: quod lumbrici nisi cibum habeant quæz consumant, postea ipsa solida corpora arrodant. Dabitur autem cibus tunc præcipue, quum non prosus inaniti fuerint. Vinum bibant aquosum. Ceterum curandi ratio non differenda: quod multi nulla lumbricorum ratione habita, corrofi ab iisdem, et conuulsi intererint. Curatio uero tam rotundorum quam latorum in hoc consistit, ut hos prius occisos, expellamus. Occiduntur autem amarior potissimum medicamentis, inter quæ simpliciora hæc sunt: Absinthium, abrotonum, calamintha, marubium, dictamus, hyssopus, ruta, folia persicorum, coriandri semen, cornu ceruinum, lupini, menta, pulegium, origanum, centaurium minus, filix, gentiana, aristolochia rotunda, esus alliorum, brassicæ semen, et helenii radix. Inter omnia autem laudatissimum remedium est aloë. Quia uero infantes aloë non gra-

Signa latorum.

Signa ascari-
dum.

Victus.

Curatio.

Simplicia
medicamenta
lumbricos occi-
duntia.

K iii ulcer

niter propter suam amaritudinem admittunt, supinis fasciola ipsis detentis ore adaperto ac diducto per fistulam quandam ualido munitam canali, inuitis illam iniiciemus. Ex dictis itaque medicamentis simplicibus, uaria componi medicamenta possunt, nimirum decocta, pulueres, cataplasmata, emplastra, et unguenta. Conuenit autem is puluis: præter alia qui. ℞. Seminis lumbricorum. 3. 2. centaurii minoris, absinthii, cornu ceruini usti. añ. 3. 1. calaminthe, pulegii, origani. añ. 3. s. abrotoni, menthe, lupinorum, foliorum aristolochie rot. añ. 3. 1. aloës. 3. 2. milice, fiat puluis, de quo detur drachma una, aut semis, pro ætatis et habitus corporis ratione in lacte, aut melle, aut syrupo de dulci radice. Nam debent ea quæ lombricos enecant, cum dulcibus liquoribus propinari, quo citius medicamenta dulcedine illa affecti lumbrici amplectantur. Extrinsecus umbilicus felle taurino, aut hoc unguento illinendus, quod. ℞. Olei amygdalarum amararum, olei de absinthio. añ. 3. 1. fellis taurini. 3. s. centaurii minoris, absinthii, lupinorum. añ. 3. 2. foliorum persicorum; cornu ceruini usti, aloës, abrotoni. añ. 3. 1. cere quod satis est, fiat unguentum. Vel imponatur toti uentriculo hoc ceratum, quod. ℞. aloës, absinthii, faring lupinorum. añ. 3. 2. nigelle, menthe, origani, pulegii, marubii. añ. 3. 1. centaurii minoris, calaminthe. añ. 3. s. oleorum de absinthio, amygdalarum amararum. añ. 3. 2. olei costini. 3. 1. fellis taurini. 3. s. cum cera et resina. q. s. fiat ceratum. Ad imagines illos possunt componi emplastra et cataplasmata, ita ut peculiaribus horum paradigmata ascribere minime sit necessarium. Ab inferioribus et partibus nullam iniicere copiosiore expedit, quo lumbrici mellis dulcedine illecti, deorsum descendant. Ceterum enecatos iam per pharmaca prædicta lombricos, citra dilationem expellere oportet. Vitiosa enim ex ipsis exhalatio procedit, quæ et appetitum et concoctionem lædit.

Extra.

Composita.

Puluis.

Unguentum.

Ceratum.

Lumbrici
enecati ut
expellendi.

Extrahuntur autem per glādulas suppositas, aut me-
dicamenta purgantia assumpta: potissimum uero p-
hieram picram, & pilulas communes (quę alio nomi-
ne pestilentiales uocantur) quę sanè mirifice in edu-
cendis lumbricis conferunt. Porro qui lumbricis Si tu
cum alui profluuo infestantur, eos fluore inspissan- uulum a
do, & concoctionem tum per cibos, tum per cataplas cedat.
mata in melius permutando, curare oportet. In quā-
tum enim profluuium inualefcit, tantum etiam lum-
brici interquiescunt. Quare diligenter conandū ut
aluus adstringatur, firmitasq; ei adiciatur. His itaq;
plantaginis succus propinandus, uel ipsa etiam ari-
da plantago assumenda. ex æquo enim utriq; & fluo-
ri alui & lumbricis efficax est. Cataplasmata etiam,
cerata & unguenta ex cruda hordeacea farina, mali-
corio, acatia, hypocisthide, & similibus adstringenti-
bus concinnanda, adiectis iis quę ad lumbricos in-
terficiendos sunt prædicta. Cōferunt autem adstrin-
gentia & hoc etiam nomine extrinsecus admota, qđ
uentriculum ex amarorum medicamentorum as-
sumptione læsum iterum corroborent. Licebit & in
hoc casu uermes terrenos exiccatos, & in puluerem
redactos, cum hydromelite exhibere. Ascarides in
infantibus uacuandi sunt cum glandibus ex melle &
sale confectis. In prouectioribus, clysteribus ex de-
cocto absinthii, centaurii minoris, calaminthe, lupi-
norum, & aliorum supra commemoratorum, oleis
adiectis, compositis. Post clysteres longanon sim-
plicibus quidem acatia, hypocisthide, rhois succo,
aut alio adstringente sublinendus est. Coacta. n. ab
adstringentibus caro corroboratur, aptitudinemq;
ad animaliorum generationem amittit, atque asca-
ridas ipsas excludit. Hoc uero & pueris, & qui perfe-
ctæ sunt ætatis conducit, efficacissimumq; existit.
carnem ueterem salitam, pinguedine derata, sublon-
gam & rotundam formabimus, atque ita adapta-

Ascarid
Curatio

K iiii tana

tam podici atq; sphincteri intrudemus, lig amētoq; adhibito, quandiu sustineri possint, inditaz sinemus deide soluemus, simulq; alcarides illi adherētes educemus. Posthęc p̄dicta infūdēmus, atque illinemus.

De hēmorrhoidibus sedis. Cap. XV.

Hemor-
rhoides.
Cæcæ.

Apertæ.
Causa.

Signa.

Curatio.
cæcæ.

Dolores.
Sedantia.

Hemor-
rhoides
aperiētia.

A i possoidē uenarum in sede sunt explicationes dilatationes uē, à sanguinis defluxu sic appellatæ. Harum aliæ cæcæ, quæ scilicet intumescunt, & nih il aut parum admodum sanguinis excernunt. Aliæ apertæ, quæ uidelicet certis quibusdam temporibus panduntur, & sanguinem emittunt. Fiunt autem hēmorrhoides, propter copiam sanguinis faculenti & melancholici, quem iecur ad iplas reponit. Signa uero p̄ quæ affectus deprehenditur, satis manifesta sunt. oculis enim conspiciuntur cæcæ, & dolorem uehementem, potissimum in excernendo stercore, excitant. Apertæ sanguinem fundunt, qui latere sic laborantes haud potest. Quum itaq; cæcæ apparuerint hēmorrhoides, & magnos in ano cruciatus excitauerint, corpusq; plethoricum fuerit uena poplitis aut malleoli incidenda erit. Alius etiam affatim leniter subducentibus medicamentis molliēda, ne arida stercora dum excernuntur, dolorem faciant. Apponenda quoque ea sunt, quæ dolorem, ubi uehementis fuerit, mitigare possunt. Ex quorum numero est mica panis in lacte macerata, & cum oui uitello decocta, & instar emplastri admota. Prodest etiam balneū ex decocto maluæ, foliis uiolæ, meliloti, fœnigræci, chamemeli, foliis althæ, semine lini, floribus uerbasci, & similibus apparatus. Vel si eo uti non poterit, lang, aut spongię in decocto illo madefactę doleti loco adhibeantur. Quod si prædicta nihil contulerint, sanguinem ab iis elicere oportet. Quapropter cyclamini succum, aut cepæ, aut fel bubulum lana illitum intra anū imponere oportet. Idem etiam potest

potest centaurii minoris succus, stercus columbinū
 staphysagria, folium ficus, si cum eo fricentur, et me-
 dulla colocynthidis in oleo amygdalarum amara-
 rum macerata. Potissimum uero hoc emplastrum
 confert, quod. ℞. Stercoris columbini. ℥. s. seminis
 staphysagrie, lupinorum añ. 3. i. s. amygdalarum ama-
 rarum. 3. i. medullę colocynthidos. 3. s. succi cycla-
 mini, cępe añ. 3. i. misceantur singula, et ad formam
 emplastri reducantur, adiecto si opus erit oleo amyg-
 dalarum amararum. Glandes etiam oblongę ex radi-
 ce cyclamini paratę. in anum inđi possunt. Hirudi-
 nes etiam in harundine incluse, ita ut caput exerant,
 hemorrhoidibus ut adaperiantur, imponi solent.
 Has ubi amouere non poteris, cinere illarum capiti
 insperso decidere sua sponte facies. Ceterū si aper-
 te fuerint, et sanguinem modicę per certa interualla
 fuderint, minime supprimendę sunt: quod huiusce
 modi sanguinis eruptio hac passione decentos ho-
 mines a multis malis immunis reddat. Id quod in pri-
 mis testatur Hippocrates, qui sic scriptum reliquit:
 Habentes hemorrhoides neq; laterum dolore, neque
 pulmonis inflammatione, neq; depascenti ulcere, ne-
 que furunculis, neq; terminthis, pariter neq; lepre,
 neq; uiriliginibus corripuntur. Quod si uero im-
 modicę ac iusto largius sanguinē fundant, sic quod
 egri hoc malo cōtabescant, ac illorum robur deiicia-
 tur, supprimendę erunt, quod aliās periculum sit. ne
 aqua intercus, iocinore ob immodicam euacuatio-
 nem refrigerato, sequatur. Cibi itaq; erūt iis qui su-
 prā modum inaniuntur pauci sanguinis, efficaces, et
 minime recrementicii, quiq; siccant et adstringūt: cu-
 iusmodi est alica, et oryza. Exoleribus intybus, cicho-
 rium, portulaca, et similia. Cibus rhu obsoniorum,
 aut succus immaturarum uuarum admisceatur. Si
 ulres plurimum prosternantur, carniū expresso,
 cui succus cotoneorū admixtus sit alēdus eger erit.

Empla-
strum.

Glandes

Apertari
curatio.6. Epid.
par. 3.
aph. 29.
“

“

Victus

Vino

Curatio. Vina bibat adstringentia. Ceterum si plenitudo corporis affuerit, uenæ interioris in cubito dextræ manus sectio proderit. Si minus, auersioni per cucurbitulas hypochondriis & iecori affixas studendum. In quæ ulum manibus & brachiis etiam uincula iniicere, & frictiones asperas adhibere conuenit. Preterea intra corpus assumenda sunt ea quæ adstringunt, ut sunt syrupi rosaceus, myrthinus, cotoneorum, coralli rubei, bolus armenia, pastilli de succino, de ebore (quos de spodio hodie nominant) de terra lemnia, & alia quæ in Capite de Cruento sputo commemorata sunt. Extrinsecus ea etiam apponenda, quæ sanguinem promanantem sistere possunt. Ex quorum sanè numero, Aëtio lib. 14. Cap. 5. teste, aloë, est cum posca applicata. Idem etiam potest squama ferri, aut plumbum ustum. Vnicè autem confert medicamentum quod describit lib. 5. Ter. meth. Galenus. Id accipit thuris partē unā, aloës partis unius semissim. Hæc cum oui cādido donec ad mellis crassitudinem redeant subiguntur, & mollissimo leporis pilo excepta uasis imponuntur, fascia ex tenui lintheo forinsecus alligata. Proderunt etiam unguenta, balnea, infusiones, fomenta, & alia eiusmodi ex medicamentis adstringentibus; quorum multa in Cap. de Diarrhoea, Lienteria, Dysenteria, & Tenesmo dicta sunt composita. Sacculos tamen in uino rubeo & adstringente priusquam adhibeantur bullire, aut saltem eo irrigare cōuenit. Quapropter si qua hic desiderabis medicamenta, ea ex Capitib. superioribus, in quib. de sanguinis suppressione agitur, petes. Superuacaneū enim sepius iisdē de reb. uerba facere.

De procidentia ani. Cap. XVI.

Causa. **A**ccidit ut interdum propter resolutionem aut imbecillitatem musculorum obliquorum sedē sursum reuellentium, anus procidat, atq; adeo aduobus

à duobus quidem relatis musculis nō queat retrahi, sed manib. aut medicamentis auxiliatricibus egeat.

Quod cum factum fuerit, considerandum in primis, num anus ab inflammatione liber sit. tum enim statim impulsus, in pristinum locum protrudi ac reponi debet. Vt autem intrusus ne iterum egrediatur retineri queat, adstringentia extrinsecus apponenda sunt. Primum itaq; oleo rosaceo calente circumlinendus, aut uino adstringente detergendus anus, ac deinde in suum locum repositus, deligandus erit. Idq; faciendum statim ubi eger excreuit, ne cōfestim ad egerendum necessitas ipsum urgeat, atq; adeò iterum anus procidat. Linimentum ex acatia & hypocisthida cum uino adhibendum. Incoquuntur etiam in aqua donec rubescat, galla, balauſtia, glandularum calyces, malicorium, bellis minor (primulam ueris nominant) rhu obſoniorum, cortices cotoneorum, & similia, & deinde ex huiuscemodi decocto inſessus & lotiones parentur. Possunt etiam postquā uino aut decocto adstringenti sedes abluta fuerit, arida admo- ueri ac inspergi medicamenta. In quem usum confer bolus armenia, thus, sanguis draconis, galla, acatia, myrrha, hypocisthis, cornu ceruinum uſtum, & similia, quæ ex superioribus sunt petenda. Porro si anus ob inflammationem tumidus imponi nequeat, ubi plenitudo fuerit, uena primum secāda erit uomitusq; ciendus. Sedi apponenda etiam quæ adstringunt, & reprimunt, idq; statim inter initia faciendum. Quod si uero plenitudo nulla adsit, eger in sessione utatur ex decocto chamæmeli, malug, altheg, seminibus lini, fœnigræci, & similibus parata. Aut in aquā calidam concendat, & ei ad tempus immoretur. Spōgia etiam aut lana in decocto prædicto madesacta admoueatur. Anus deniq; oleo chamæmelino, aut anethino, quouiq; reponi possit, i^llinendus. Postq; uero reconditus iam est, tum suprā commemoratis medicamentis adstringentibus, utendum erit.

De rimis

Curatio.

ῥαγαδὺς

Causa

Condylo-
mata.

Cura.

Vnguen-
tum.

Rime sedis quas Græci ῥαγαδὺς uocant, sunt scilicet suræ, quæ in musculo anum claudente, quem sphincterem nominant, aut in circulo, & extrema ani corona fiunt: similes iis quæ in labiis ob Boreæ flatum asperiores accidunt. Ob acrium humorum defluxum: aut inflammationem: aut condylomatium (quæ nihil aliud sunt nisi eminentiæ seu rugæ quædam reduplicatis ani corpusculis præter naturam insurgentes) extensionem eueniunt. Si ab acris humoribus fiunt, illi primum omnium purgandi erunt. Si ob condylomata: illi idem purgatione inter initia utendum. Alius denique toto curationis tempore mollicida, cibis humectantibus ac pinguibus, ne aridum sterco coagulationem remoretur. Ex eorum sanè numero sunt malug, spinachie, lac amygdalarum dulcium, ora sorbilla, iura pinguis, & iis similia. Ragadibus uero hoc unguentum adhibendum, quod. ℞. Olei rosacei, myrthini. añ. 3. i. thuris, mastiches, lithargyri, sanguinis draconis. añ. 3. i. aloës, plumbi usti, cerussæ, balauftiorum, boli armeniaci. añ. 3. s. cere albe quod satis est, fiat unguentum. Aut tale, quod accipit Olei rosacei. 3. i. s. gallæ, myrrhe, terræ lemnicæ. añ. 3. i. radice symphyti, aluminis scissilis, plumbi usti. añ. 3. s. oui assati vitellum, cere quod satis est, fiat unguentum. Prædictis unguentis ter die rimas circumungito, lotas prius decocto rosarum, gallarum & sidiorum (sic uocant putamina malorum punicorum.) Si patientem partem ardor & inflammatio affligit, unguento candido caphurato, illinenda erit.

De imbecillitate iocinoris. Cap. XVIII.

Causa.

Imbecillitas iocinoris ab intemperie ipsa produci-
tur calida, frigida, humida, uel sicca. Calida in-
temperies, tum eos qui prius adsunt humores, tum etiam

tiam hos qui per uenas mesenterii ad ipsum iecur deferuntur, adassat et comburit. Frigida uero intemperies, pituitosum et crudum humorem, qui iam in ipso continetur, crassum et lentum egregie; mobilem reddit, eum uero qui ad ipsum defertur, semicoctum. Ceterum sicca intemperies, sicciores et densiores humores facit. Humida autem, tenuiores et magis aquosos.

Calida igitur intemperie circa iecur existente, colliquationes fiunt, primum quidem humorum, deinde carnis etiam ipsius iocinoris, et euacuatur per uentrem bilis foetens ac crassa, abundeque colorata. Sitis denique infestat, appetentia deicitur, urina rufa, pulsus celer est. Vbi uero frigida intemperies affuerit, neque assidue excretiones, neque multe fiunt. Durat uero passio diutius, et per certos aliquot dies profluit et ipsis uenter maiori copia. ceterum egesta non similem foetorem habent iis quae per calorem sunt colliquata, neque colorem etiam neque consistentiam: sed speciem praeseferunt sanguinis putrefacti, et in grumos congelati: et si quis diligenter consideret, neque sanguis niger est, neque grumus, sed ueluti limus et fex quaedam sanguinis crassi, proxime ad atram bilem accedens. Quin plures et discretu iudicatu ue difficiles colores circa huiusmodi passionem in excrementis apparent. Reliqua etiam omnia prioribus contraria erunt. In sicciore autem intemperie, excrementa adhuc sicciora et pauciora uidentur, egriusque magis siccant. In humida uero, humidiora et plura erunt excrementa, sitisque minus infestabit. In huiusmodi igitur passionibus primus curationis scopus sit, ut intemperiem ad contrarium reducamus. Calidam enim intemperiem semper refrigerare oportet, frigidam uero calefacere, similiterque humidam resiccare, et siccam humectare. Ceterum omnibus iecorariis medicamentis, tum quae per os sumuntur, tum quae forinsecus imponuntur, aliquid ex adstringentibus ammiscere

Sigla.

Curatio.

Calida in
temperiei

Cōfectio

Unguen-
tum.

Epithema

scere oportet, quo firmitas ac robur uisceris conseruetur. In calida igitur intemperie quod ad uictus rationem attinet, utendus erit ptisanæ cremore, et aliis cibis mediocriter refrigerantibus, lactucis, intybis, cichorio, sonchis, pane ex aqua. Pullis item gallinæ, perdicibus, auibus montanis, carnibus utulinis, cum omphacio aut limonibus decoctis. Ex fructibus uescantur passulis, limonibus, et amygdalis dulcibus. Vinum omnino circūciditur, nisi alterā ob causā, nempe uentriculi imbecillitatem, hoc requirant; tunc enim tenue et dilutum aliquod exhibendus. Bibant autem pro uino succum malorum puniceorum, et syrupū acidum, simplicem, oxy saccharumque, cum decocto hordei, aut intybi domestici. Arcendi autem in summa ab omni cibo et potu melle condito, et admodum calido ac incidente. Per os denique, quod ad medicamentorum rationem attinet, sumant saccharum rosaceum, diarhodon abbatis, et diatriasantalī confectiones. Aut confectionem hanc, quæ. R. Specierum diarhodon abbatis. diatriasantalī. añ. 3. i. s. seminum intybi domestici utriusque, rosarum rubearū añ. 3. 2. santalorum alborum, cassuthę, floris iunci odorati. añ. 3. i. passularum. 3. i. sacchari. 3. vi. dissoluti in aquis cassuthę et endiuie, fiat confectio rotunda. Quin et Philonis antidotus semel tantum exhibita, omnem aliquando calidam iecoris intemperiem mirabiliter sanauit. Extrinsecus adhibeantur fomenta ex rosaceo, chamemelino, cotoneoque oleis parata. Aut absinthium, aut palinule prædictis oleis incoquantur, et in iis lana aut spōgia madafacta, ei loco ubi iccur situm est imponatur. Potest etiam huius unguenti esse usus, quod accipit. Oleorum rosacei, cotoneorum, nymphę. añ. 3. ii. santalorum alborum et rubeorum, rosarum rubiarum. añ. 3. i. ramentorum eboris. 3. i. s. seminis intybi domestici utriusque añ. 3. i. aceti. 3. i. s. caphure gr. 2. cere quodlibet satis est, fiat unguentū. Epithemata

hemata etiam in hoc affectu non parum conducunt,
 que in hunc aut similem modum parabuntur. ℞. Suc-
 ci intybi domestici latifolii, lactuce, oxalidis, rosarū
 ymphae. añ. ʒ. iii. succi sempuiui. ʒ. i. s. acetī. ʒ. i. rosa-
 rum rub. santalorum rub. rametorum eboris. añ. ʒ. i.
 pecierum diarhodō abbatis, diatriasantali. añ. ʒ. i. s.
 caphure. ʒ. s. misce, fiat epithema. Adhibeantur autē,
 epithemata estate frigida actu, hyeme uero calida.
 Vbi autem frigida in iecore intemperies fuerit, cale-
 facientibus, ac robur addentibus. utendum est. Utatur
 itaq; cibis concoctu facilibus et calefacientibus. Ex
 oleribus satureia, hyssopo, foniculo, oreoseli-
 no, abrotono, saluia et similibus. Cibi condiantur
 aromatis calefacientibus, cinnamomo, gariophyllis,
 et iis similibus. Vinum bibant tenue, fuluum, et odo-
 riferum. Fugiant esum piscium, fructuum frigidorum,
 ocium, et quicquid refrigerare iecur potest. Per os su-
 mant hoc decoctum, quod accipit Radicum apii, fœ-
 niculi, oreoselini. añ. ʒ. i. eupatorii (quod agrimoniā
 hodie uocant) hyssopi, mentę, absinthii, cichorii, cas-
 suthę, origani, calaminthę, asari. añ. M. i. seminū ani-
 si, foniculi, dauci, cumini, carei. añ. ʒ. ii. iunci odora-
 ti. ʒ. i. s. mastiches. ʒ. i. florū chamemeli, rosarum rub.
 añ. M. i. cinnamomi electi. ʒ. i. s. Buliant oīa in li. i. s.
 uini, et aque fontanę lib. i. donec tertia pars absum-
 pta fuerit, dein colentur, et colaturę adiciātur syru-
 pi de eupatorio. ʒ. iii. syrupi de absinthio. ʒ. i. misce,
 fiat potio. In hunc usum conferunt etiam confectio-
 nes calefacientes, diacinnamomi nimirū, dianisi, cō-
 serua saluię acorū conditū, pimpinellę radices cōdi-
 tę, et huiusmodi. Extrinsecus illinenda olea calida,
 nempe nardinum, chamemelinum, absinthinū, et simi-
 lia. Cōfert hoc uti unguento, quod. ℞. Oleorū absin-
 thini, nardini. añ. ʒ. i. s. succi eupatorii. ʒ. ii. cinamomi
 gariophyllorum, ligni, aloës. añ. ʒ. ii. spicę, iūci odo-
 rati, mastiches. añ. ʒ. i. cere qđ satis est, fiat unguentū.

*Frigida in
 iecore.*

Decoctum

*Unguen-
 tum.*

Potest

Ceratum. Potest etiam usus esse eius cerati, quod. ℞. Farinę fœ
nigręci, lupinorum. añ. 3. ii. radicis iridis, asari. añ. 3.
i. eupatorii, absinthij, meliloti, iunci odorati. añ. 3. s.
gallię moschataę. 3. i. seminum anisi, feniculi. añ. 3. s.
mastiches. 3. 2. misrhę, thuris. añ. 3. i. oleorum masti-
chini, nardini, rosacei, anethini. 3. i. cerę & resinę qđ
satis est, fiat ceratum. Et istius epithematis, [quod. ℞.
Epithema se. anisi, fœniculi, ammeos. añ. 3. i. s. cinnamomi, ga-
riophyllorum, iunci odorati. añ. 3. i. Decoquatur in
lib. i. s. aquę usq; ad medietatis assumptionē, coles,
& colaturę adiciatur succorum absinthij, eupatorii
añ. 3. 2. specierum diacynamomi, diagalange. añ. 3. i.
cassutę. 3. 2. aceti. 3. 2. misce, fiat epithema. In humida
Humida autem intemperie uictus ratione desiccate utendum
intemperie. carnibus nimirum uolucrum assis, uino tenui, & su-
dore mouētibus, laconico, balneis naturalibus. Pa-
rum uero bibendum ac comedendum: pisces: quoq;
in uniuersum omnes, ac fructus quibus humectandi
uis inest: deuitandi. Per os sumendus syrupus de ab-
sinthio: dialacę & diacurcumę confectiões. Ex-
trinsecus etiam quę exiccant citra insignem calorē
adhibenda: de quibus omnibus infra in Capite de
Anasarca copiose dicemus. Sicca iecoris intempe-
Sicca in rics haud secus atq; hectica febris curatur: hoc solo
temperie quod supra monuimus non neglecto: ut semper hu-
meantibus medicamentis misceantur: quę robur
uiscerū addere possunt. Et ut rem paucis perstringa-
mus: in sicca intemperie balnea sufficiunt dulcium
aquarum: & humectans uictus ratio: de quibus in
Curatione febris hecticę copiosissime dicemus.
Ex hoc itaq; loco petenda erunt: quę hic desideran-
tur. Cæterum inter ea quę à proprietate totius sub-
stantię efficacia existunt: optimum est lupinum ie-
cur: quod sanē diligenter trituz: drachmę unius pō-
dere cum uino dulci aqua calida diluto præbetur.
Hoc enim multiplici experimento cognitum: oibus
iecoris

iecoris intemperiebus comodum existit: utpote proprietate totius substantię hanc efficaciaz habens, nō calefaciendo, aut refrigerando.

De obstructione iocinoris.

Cap. XIX.

Iocinoris obstructio à flatibus uaporosis et crassis, concoctūq; difficilibus fit. Interdum autem et à crassis uiscosisq; humoribus, in finibus uenarū ex sima iocinoris parte enatarum, per quas ex uētre et intestinis alimenti digestio ad iecur contingit. Porro quū uaporosi et crassi flatus multitudo coaceruatur, quę exitum non habet, atq; adeo obstructionem efficit, non grauitatis circa dextrum hypochondrium solum, sed et distentionis sensus oboritur. Obstructionem uero à crassis uiscidisq; humoribus consequitur grauitatis cum dolore sensus, aliquando quidem obtuse, aliquando uero uehementis: et quandoq; quidem absq; febre, quandoq; cū febre. Crassa enim et uiscosa ac multa, oīno amplius reliquis obstruunt, et maximē quādo egri à cibo uehementiori motu utuntur. Si uero acria sint et multa quę in cibo sumuntur, dolor ex obstructione uehementior fit, quum obturata corpora simul et tensionem perferant, simulq; pungantur. Cibi his dandi sunt calidiores, et qui aperiendi obstructiones facultatem habent: nempe porrum ex oxymelite, asparagum, fœniculum, oreoselinum, cappares, reliquaq; obsonia ex condimento aliquo calefaciente, quōq; obstructiones auferat, incocta. Vitanda sunt alimenta crassi succi, balnea, et exercitia à cibo. Vinouatur tenui, ac ueteri. Ultra uictus rationem attenuantium quoq; et obstructionem tollentium medicamentorum quā celerrimus requiritur usus: obstructio enim inueterata non tantum in iocinore, sed in omni corporis parte putrefactionem operat, febremq; accendit. Pręclare aut et citra molestiā ab obstructio.

Cause

Signa

Victus

Curatio

L ne le

Simplicia ne leuant inter simplicia medicamenta, lupi iecur,
obstructio fumaria, eupatorium, chamæmelum, acori radix, dra-
gem tola cunculi radix, asarum, anisum, apium, absinthii, ca-
gentia. sia, iris, glycyrrhiza, rha ponticū uerum, lupini, cap-
 pares, ammi cassutha, oreoselinum, pistacia, amygda-
 læ amaræ, spica nardi, stœchas, gentiana, plantaginis
 radix, semen, ⁊ folia sicca, anagallidis fœminæ suc-
 cus, cichorium, halicacabum, intyba utraq; , aspara-
 gus, ⁊ ruscus. Ex iis uaria componi medicamēta pos-
 sunt: potissimum uero decocta: adiectis oxymelite
 simplici: scyllitico: syrupo acido composito: de ab-
 sinthio: hyssopo, calamitha: marrubio: ⁊ similibus.
 In hunc usum exhibendī etiam pastilli de eupatorio:
 de absinthio: de rhabarbaro: ⁊ similes. Conferunt
 etiam confectioes dialacce ⁊ diacurcume. Inter cē-
 tera autem non solum iucundum: uerum etiam utile
 est: ut pistacia decem aut duodecim per noctem in ui-
 no Aruifio (quod corrupta uoce malmasinum ho-
 die uocant) macerata, in aurora coctione iam facta
 sumantur. Extrinsecus etiam admouenda epithema-
 ta, unguenta: emplastra ⁊ cerata: quæ in Ca. superio-
 re de Curatiōe frigidaē intēperiei iecoris dicta sunt.
 Hæc medicamenta sufficient, si malum non inuetera-
 tum fuerit. Si enim in uetustatem incidat, uenę etiā
 sectio: ⁊ purgatio: si nihil prohibet: adhibenda erūt.
 In hunc usum exhibenda catapotia de rhabarbaro,
 de agarico, ⁊ similia medicamenta, quę crassos ⁊ len-
 tos humores per aluum purgare possunt. Vacuato
 iam corpore, ea quæ suprā comprehensa sunt propi-
 nanda medicamenta erunt. hoc autem potissimum
Ecligma. ecligma, quod accipit R adicis iridis, radicis chamæ-
 pityos, seminū fœniculi, anisi apii, añ. 3. ii. asari. 3. ii. s.
 cinnamomi, 3. i. gingeris, carei, chamæmeli añ. 3. i. stœ-
 chadis, gentiane, marrubii añ. 3. ii. cū oxymelite scy-
 litico quod satis est, fiat ecligma. Hoc mirificē ob-
 structioes, non solum eas, quę in cauo, uerū etiam
 quæ

quę in gibbo iocinoris herent, quandoquidem per urinas uehementer expurget, tollit.

De inflammatione iocinoris. Cap. XX.

IN iocinore perinde atq3 in aliis uisceribus, ob easdemq; causas, fit inflammatio. Inflammato autē iocinore omnib. quidem ex quo in dextro hypocondrio dolor & grauitas est, qui suprā ad iugulū usq3, infrā autem ad spurias costas peruenit. Tumor quoque dextri hypocondrii consequitur. Huic dolori accedit febris acuta, tussis exigua & sicca, fitis in exhausta, cibi fastidium difficultas spiritus. Lingua primō rubicunda apparet, postea nigra: bilem uomunt puram, atq3 etiam uitellinam, post autem & cruginosam. aluus adstringitur, color corporis subuertitur in arquati morbi speciem permutatus, singultus quoq3 consequitur. Accessionis etiam tempore quidam delirio apprehenduntur, & acré urinam excernunt. Quando uero priuatim caua iocinoris inflammationem patiuntur, nausea, uomitus, cibi fastidium, & ardor ac sitis intenduntur. Si uero gibba ipsius inflammatio exercet præter alia superius commemorata, tumor manifestus quoque in superficie oculis & tactui conspicuus est. Hęc quidem uehementem grandemq; inflammationem testantur. Sin obscura quædam fuerit, iubebimus ægro magnam edat respirationem. Et si dextrum hypocondrium dolere asserat, moderata iecoris inflammatio censetur. Quod si iuxta situm incumbētium iecori musculorum oblōgus inflammationi tumor appareat, prædictorum nullo præsentē, illos ipsos inflammatione laborare agnoscemus. Porro iecore inflammato, sanguinis detractionem experiri oportet, si nihil id fieri impediat. Incidenda autem in dextro cubito uena interna, ita ut substratam arteriam obseremus: quæ si non appareat, media: si uero neq3 ipsa ap-
L ii pareat,

Causa.

Signa

Curatio.

pareat: superior. Copiosus autem, & quantum satis est si uires ferre queant, educendus. Sanguinis missione facta, post modicum interuallum simplici ac leui clysteri aluus eluenda, maxime si non sponte egerat. Extrinsecus cucurbitę cum scarificatione affigendę. Fomentis etiam utendum ex lanis oleo imbutis, cataplasmatibus, ceratis, & epithematis. In quibus adhibendis in summa hoc precipiendum est, ut adstringentia emollientibus semper admisceantur. Fomentum itaq; fiat ex oleo cotoneorum, aut mastichino, aut rosaceo, aut myrthino, adiecto uino odorifero. Aut adhibeatur spongia madefacta in decocto absinthii, meliloti, rosarum rubearum, chamemeli, plantaginis intybi domestici (quam endiuia uocant) & similia. Cataplasmata uero, & emplastra ex semine lini & fœni gręci, farina hordeacea, malis cotoneis, meliloti flore, absinthio, & similibus, in hunc modum componenda sunt. *R.* Farinę hordeaceę. *℥*. s. carnis cotoneorum contusę. *℥*. iii. absinthii, florum meliloti, iunci odorati. *an.* 3. ii. seminis lini. *℥*. i. oleorum rosacei, cotoneorum, chamemelini, absinthii *an.* 3. s. aceti 3. i. misce, fiat emplastrum. Cerata sic confici possunt. *R.* Carnis palmularum. *℥*. iii. myrrhę in uino ueteri adstringente maceratę, styracis, mastiches. *an.* 3. ii. florum meliloti, comę absinthii, chamemeli *an.* 3. i. s. croci. *℥*. s. oleorum cotoneorū, mastichini, rosacei. *an.* 3. i. cerę & resinę quod satis est, fiat ceratum. In hunc usum etiam epithemata ex decocto herbarum supra nominatarum, aut succis rosarum, plantaginis, absinthii, chamemeli, & similibus componi possunt. In quibus omnibus componendis unicę studendum, ut adstringentia ubi uehemens adhuc est inflammatio, relaxantibus & emollientibus pręualeant. contrā uero remittente uehementi calore, emollientia adstringentibus. Cauendum pręterea, ne prędicta actu frigida admoueantur, sed prius modicę calefacta. Porro in

Fomentum

Emplastrum

Ceratum

Nihil actum
frigidum

rd in inflammatione iecoris ubi magni circumstant
dolores etiam medicamenta dolorem leuantia in po
tu sunt exhibenda: ita tamen, ut assiduus eorū usus
deuitetur. Simplicibus autem potionibus frequen
tius utendum. Senecionis itaq; decoctum tanquam
maximè commodum, aut succus glycyrrhizę cum a
qua calida exhibendus. His non minus confert in
tyborum succus, adiecto modico melle. Ad hoc enī
quod refrigerat, ac firmitatem uisceri addit, etiā ora
uenarum iecoris expurgat. Ceterum aluus etiam ir
ritanda est, urticę uel mercurialis coctorum esu. In
declinatione etiam morbi aluus per clysteres inaniri
postulat. In quem usum polypodium & epithymium
ex mulla porriguntur. Idq; potissimum, si in cauo ui
sceris fuerit inflammatio. Cava enim iecoris per al
uum, gibba uero per urinas expurganda sunt. Por
rd in iecoris inflammatione, exquisitissimo uictu,
Galeno. lib. 13. Ther. meth. monitore, est opus. Poscit
autem iecur ipsum cibos, qui obstructa recludant.
Talia uero omnia sunt tenui consistentia, & quę ci
tra rorsionem detergunt: cuiusmodi est ptisana, mul
sa Alimentum igitur optimum est, sic patientibus,
cremor ptisanę, in quo apium decoctum sit. Ius etiā
pulli gallinacei, in quo oreoselinum decoctum sit,
dari potest. Bibat mulsam, aut decoctum hordei, uel
intyborum domesticorum. Cæterum si inflamma
tio, principium permutationis ad suppurationem iā
suscepit, tum omnia prædicta augebuntur, dolores
nimirum, febres, delirium, anxietas, cibiq; fastidium.
Adiuuare igitur permutationē ac puris eruptionem
oportet, ut quā celerime fiat, ne maiora inde cor
pora corrumpantur, per usum uidelicet istius cataplas
matis qđ ꝑ. R. radicis altheę. 3. i. s. seminis faxnigræci,
lini. añ. 3. i. i. foliorū altheę malug. añ. M. ii. caricarum
numero. vi. Buliāt in aqua donec mollescant, dein
cōtūdantur, & fiat cataplasma. Neq; uero inconueni

L Iii enter

iecore in
inflammatio
ne laborā
te adhiben
dum.

visus.

Si inflama
tio ad
suppuratio
nem
tendat.
Maturatio
lis.
Cataplas
ma.
Empar
strum

enter etiam emplastra, quæ puris permutacionem iu-
uare possunt, adhibentur: quale est quod. ℞. Farinæ
hordeaceæ, farinæ fœnigræci. añ. 3. iiii. radicis althææ. 3.
iii. s. radicis liliorum alborum. 3. i. s. seminis lini. 3. i.
florū chamemeli, meliloti. añ. p. i. Buliant oīa in aq̃
donec ad mellis crassitudine perueniant. deinde ad
de olei chamemelini. 3. i. olei liliacei. 3. i. s. ⁊ buliant
iterum, fiatq; emplastrum. Ex prædictis possunt fieri
cerata adiectis butyro, iadano, resina, ⁊ cera. Quum
autem perfecta suppuratio fuerit, dolores remittent,
omnesq; accessiones mitiores apparebunt. Ceterum
rupturæ tempore dolor rursus magis augetur: qua-
re etiam tunc rupturam adiuuare oportet, per sterco-
ris caprini ⁊ colubini, seminis urticæ, sinapi, aliorūq;
ad superficiem attrahentium usum: ⁊ per potiones
calorificas, ut est decoctū polii, fumaricæ, radicis cha-
medryos, ⁊ thlaspeos. Facta ruptioe, aqua mellis, aut
ciceris decoctum, aliaq; quibus abstergerendi facultas
inest, quæ infra in Capite de Renum exulceratione
commemorabuntur, propinanda. Et si puris trans-
missio per uenas fit, urinam mouentia admiscenda
sunt. Sin per aluum, ea quæ leniter subducunt, serum
nimirum caprinum, tamarindi, castiaq; fistularis exhi-
benda. Dein facta abstersione, quæ conglutinare pos-
sunt propinanda.

Abstergen-
tia.

De ictero.

Cap. XXI.

Icterus.

Causæ.

Icterus est bilis, modo flauus, modo atrox, per uniuersum corpus effusio. Latine regium, ⁊ arquata passio-
nem uocant. Celsus etiam auriginem appellat. Harum omnium appellationum causas alibi expli-
cauimus. Fit interdum ictere nihil patiente bilis ef-
fusio ad cutem in morborum iudicationib. Nonnū-
quā ubi citra febrem sanguis ab extranea aliqua oc-
casionē corrumpitur, ac biliosus efficitur, sicut à ue-
nenaturū bestiarum moribus contingere cōsuevit.

Quin

Quin & fieri potest propter inflammationem, aut naturalis tēperiei iocinoris aut lienis permutationem. Fit etiam aliquando ob imbecillitatem uesicę bilis susceptricis, quę biliosum humorē, ueluti consueuit in seie ex iocinore non attrahit, & ob id impurū sanguinem relinquit. Aliquando autem propter obstructionem, aut debilitatem uasorum, quorū ora ex ea ad iecur deferuntur, biliosum humorem non attrahit, atq; adeo icteron efficit. Interdum etia; fit ppter meatus, qui ad intestina uadit, obstructionem. Quare ad icteri causas probē discernendas, excrementorum figura & color necessario considerantur, quum in aliquibus multum colorata per flauam bilem appareant, quemadmodum etiam in aliis urinq. In quibus enim ratione iudicationis bonę in febribus biliosus humor ad cutem prorumpit, iis & excrementa, & urinq. naturali modo se habere uidebuntur. Si autem cum febris & biliosis deiectionibus inuadat, & in dextro hypochondrio grauitas adsit, feruens icteris inflammatio significatur, cuius ui sanguis in bilē mutatus, per uniuersum corpus deferitur. Sin feruor citra grauitatem in ipso substat, ex sola calida icteris intemperie uitius gignitur. Quibus uero citra febre una cum grauitatis alicuius sensu circa dextrū hypochondrion alba excrementa deiciuntur, in his uesicę bilis susceptricis meatuum obstructionez esse factam putandum est. Si uero citra grauitatem talia deiciantur, uires esse infirmas, aut attractricem quę ex iecore attrahit, aut eam quę ad intestina propellit existimandum est. Statim iis etia; urinq. biliosissime affatim excernuntur. Porro in quibus atq; bilis humor una cum sanguine ad cutem est delatus, hi omnino grauius patiuntur. Consequitur eniz ipsos tristitia preter rationem, & mordacitas eorum quę circa uentrem sunt, difficultasq; spirandi, & cibos auersantur, & nigras urinas excernūt. Stercora uero chaf

signa

L iiii cantū

canti colorem referunt, et alius iis magis resiccatur. Ceterum eos qui ex pallida bile regium morbum contrahunt, nulla mordacitas eorum quæ circa uentre sunt consequitur, neque etiam in tantum auersantur cibos. Stercora alba egeruntur, urinae autem crocei coloris, turbatae tamen permanent. Communiter autem omnibus ictericis pigricies ad motum accidit, et ad dulces cibos animum habent alienatum. Pruritus etiam uniuersi corporis comitatur. Alba oculorum, et partes faciei temporibus propinque, itemque male pallorum ostendunt. Venæ etiam sub lingua replete reperiuntur, et abundantem humorem significant. Icterici igitur, qui ratione bonæ iudicationis febribus perfecte solutis sunt facillime curantur, si lauacris aquarum dulcium utantur, ac olei discussorii perfractione, omnibusque quæ cutem rarefacere possunt; qualia sunt, oleum chamæmelinum, anethinum, irinum, et similia. Victus quoque rationem uniuersam in iis humectiorem constituere oportet, et ut humorum crassitudinem attenuare possit. Qui ex uirulentorum animalium moribus ictero corripuntur, curandi ferè, sunt sicut ille qui à rabido cane morfi sunt, de quibus suo loco diximus. His qui ob calidam iecoris intemperiem, aut inflammationem arcati sunt, curatio superius comprehensam, ubi de iecore agebatur, ad mouenda erit, eamque integram in hoc Capite transferre oportet, ne eadem nobis sint sepius repetenda. At si propter obstructionem uesicæ fellis susceptricis fiat icteros, tum duo maxima remedia principatum obtinent, sectio uenæ, et purgatio. In quibus igitur multitudo sanguinis una cum bile in toto corpore abundat, et quos circa iecur aut lienem grauitas aut distensio infestat, in iis nihil uenæ sectione commodius fieri potest, si nulla alia re id facere prepediaris. Secunda uero est uena in dextro cubito interna iecore patiente, liene autem in sinistro, sanguisque particu
latini

Curatio.
Si ratione
iudicatio-
nis bonæ
accidat.

Si ex mor-
su uirulen-
torum.
Si ob intem-
periem aut
inflammationem ie-
coris.

Si ab ob-
structione.

**Venæ sec-
tio.**

latim et per uices est detrahendus, ne per coaceruatam euacuationem uires egri prosternantur. Neque uero ineptè clyster adhibetur, si à uenę sectione excludimur. A uenę autem incisione etiam non incommode clyster iniicitur, qui propter stercoreum euacuationem spirandi facilitatem inducit, intestinaq; irritando ac mordendo, humores ad cutis superficiem delatos, ad ipsa retrahit et reuellit. Sit uero talis, aut huic similis. ℞. Intybi utriusq; marrubii, eupatorii, adianthi, origani, absinthii. añ. M. i. seminū anisi, fœniculi, oreoselini, asparagi. añ. ʒ. ii. s. radicū glycyrrhi ʒē, apii, fœniculi. añ. ʒ. i. Buliāt in aqua sufficiēti. dein colature. ℞. ʒ. xiii. Casię fistularis. ʒ. i. hierę picrę. ʒ. s. ecligmatis de succo rosarū. ʒ. ii. oleorū anethini, irini. añ. ʒ. i. s. salis. ʒ. i. fiat clyster. Ceterum purgationes huic morbo magis proprię et familiares sunt, sic tamen ut eduliis et potionib. iteq; medicamentis humores prius attenuentur. Cibis itaq; utendum cōcoctu facilibus et extenuantib. uolucris montanis, piscibus saxatilibus, oleribus quę urinā cient præsertim intybis, asparagis, smyrnio, fœniculo, et similibus. Carnes ferinę mansuetis magis sunt aptę. Pro liquamine seu embammate ualet acetum, in quo aristolochia macerata sit. A fructibus abstinendum. Bellaria sint amygdalę sed modicę sumantur: et cicer, modicę torrefactum. Eius etiam decoctum assidue potatū, non parum confert. Vinū cōuenit albū et tenue, non ualde uetustum. Quod ad medicamenta ipsa attinet, sumenda sunt quę in Cap. de Obstructione iecoris, et in Lib. primo de Extenuandis pituitosis humoribus Cap. 8. dicta sunt. Potissimum uero apii, adianthi, calaminthes, uerbenacę rectę, rubię radicis, aristolochię, serpilli, hypericiq; decoctum. Extenuatis iam et preparatis humoribus, pharmacum quod flauā bilem purgat exhibendum. Sunt autem purgationes icterici, dādę fortiores; ob uentris enim siccitatem

Clyster.

Viſas

Purgatio.

tatem imbecilliores, inefficacesq; in ipsis cognoscuntur. Quæ autem præ aliis conferunt, est dilutū R h barbari lib. i. Cap. 7. descriptū, ac hiera picra, ecligma de succo rosaceo, de psilio, & diaphanicon. Quod si primo purgante medicamento nihil proficias, rursus ad ea quibus obstructions tollēdi facultas inest reuertendum, & post triduum rursus uiolentius purgandum. Si liene patiente malum oriatur, ad Caput de Melancholia, & Obstructione lienis recurrendū.

*Viscera
utraq; re
purgālla*

Postea quæ uiscera repurgant exhibenda sunt medicamenta. In quem usum radix cyclamini trita potatata confert. hæc enim non solum repurgat uiscera, uerumetiam ad bilem in uniuersa cute excludendā per sudorem aptissima. Quare post eius potionē sudoris exclusionem per uelamenta ac concalescentiam in lecto iuuare oportet. Dantur ex ea drachmæ dug, aut tres, ex aqua mulsa. Preclarè quoque facit corticis raphani succus, uino meraco dulci pmixtus aut uino mulso, ita ut succi. 3. 2. uini. 3. i. contemperentur. Vermes etiam terreni exiccati ex uino mulso per triduum dati ieterum per lotium eicient. Itē casturhe succus mirificè etiam prodest. Ceterum medicamenta quæ in potu accipiuntur omnia, si fieri potest, in balneo exhibeantur, ubi nimirum egri in solium calidum conscenderint. Plurimum quoq; diēte uirium refocillatrici hoc tempore intentū esse oī, per quam facultas excretrix reparetur, & si qua pars læsa sit corroboretur, ac præsens coloris corruptio repurgetur. Quapropter conueniunt exercitia, gestationes, inunctiones ac exudationes. In hunc usū pyriateria conferunt, in quib. oleum, in quo serpillum aut rosamarinus herba decocta sit, corpori illinēdū. Quod si uero quippiam ex ietero circa facies & oculos relinquatur, uring autēz appareant purg, aliusq; consueto more egerat, narium infusis utendum. In quem

*Vitiatus
color ocu
lorum &
faciei ut
amouēdus*

quem usum cyclamini succus, item nigella cum aceto, anagallidis et betæ succus infunditur. Acetum est acerrimum naribus attrahat eger in folio desidens, contineat que pressis naribus paulisper, et mirifice uacuabitur.

De aqua inter cutem.

Cap. XXII.

HYdropis seu aque inter cutem tres sunt species. Alia enim ασκίτης, alia τυμπανίτης, et tertia αναστάσις. ασκίτης, υποσάρεκα, σάρεκα της λευκοφλεγματίας dicitur. Ascites est, quum inter membranam peritonæus appellatam, et intestina plurimus aquosus humor coaceruatur. sic dicta, quod ασκίς, id est utri modo membrana ipsa repleta esse uideatur. Tympanites est, ubi flatus ac spiritus superfluus plurimus in iisdem uentris locis congregatur. Anasata est, ubi per uniuersam corporis molem humor diffeminatur, ut instar spongiarum aut papyri uniuersa caro permeada facta appareat. Fit hydrops, ob insignem iecoris frigiditatem, aut ob alias partes uehementer refrigeratas, quæ iecur in eundem affectum deducere ualent. Coafficitur autem iecur lieni refrigerato, aluoque et intestinis, maximè iis quæ iuxta ieiunum intestinum sunt, pulmonique et renibus, ac septo transuerso. Contingit etiam ex immodica hæmorrhoidum euacuatione, aut ex fluxu menstruorum, aut eorundem retentione, aut ab alia quadam magna uteri affectione, duritiæ nimium, aut simili. Multi autem et a podagra et coxendicum dolore uexati, aquam inter cutem incidunt. Frequentissime autem eos qui malo corporis habitu præditi sunt, item ab ictero infestatos, hydrops consequitur, celiacam item affectionem et dysenteriam. Communiter omnis hydrops spirandi difficultatem, et tumorem, et grauitatem, et uitiatum colorem inducit, ex uirore nimio.

Aque inter
cutem tres
species.
ασκίτης

Τυμπα-
νίτης.
αναστά-
σις.

Causæ.

Signa.

Signa.

rum

Curatio.

tuo simile euadit. Curatio à sanguinis detractiōe
 auspicāda, maximè si passionis origo ex hemorrhoi-
 dibus aut menstuis suppressis est, & uirtus atq; ætas
 permiserint. Hac enim ratione plenitudo quæ infe-
 stat exhauritur, & languentis natura exonerata ala-
 crior fit, & mali causa minuitur, & deinde necessario
 minore negotio redit sanitas. Prauis humorib. per
 uenæ sectionem detractis, ad purgantium medicamē-
 nū præsidia deueniendum. Quod si tamen extenua-
 tione ac humorum ad expulsionem præparatione o-
 pus sit, decocta & alia quæ suprà in Capitib. de Ieco-
 ris imbecillitate & obstructione dicta sunt, exhibean-
 tur. In quem etiam usum syrupi de absinthio, de in-
 tybo (quam endiuia nominant) de eupatorio, & by-
 zanthiis barbaris dictus, exhibendi. Purgantia ue-
 ro medicamenta simplicia sint R habarbarum, & aga-
 ricus. Composita uero, cataportia de rhabarbaro, de
 hiera simplici, de agarico, & similia. Conuenit etiam
 inter initia hiera picra, quod hæc obstructiones lax-
 xet, & uisceribus robur addat. Quapropter cauendū,
 ne ualida, quæq; nullum iecori robur adiiciunt me-
 dicamenta exhibeamus. Infestans humor sensim &
 paulatim per purgantia medicamenta uacuandus.
 Semel enim & confertim euacuantes, mirificè ui-
 res deicimus, iecurq; refrigeramus. Singulis itaq; se-
 ptimanis aluus subducenda, semperq; à mitiorib. ad
 aliquantulum ualentiora transeundum. In hunc igi-
 tur usum conueniunt ecligmata diaphanicon, & In-
 di. Pulcherrima etiam purgatio conficitur ex radice
 sambuci in uino decocta. Prodest itidē & ebuli radix:
 eadē namq; sambuco & ebulo uis est. Porro reliquo
 curationis tempore, quo purgantib. medicamentis
 abstinet, exhibenda quæ iecori robur addunt, quorū
 multa suprà de Imbecillitatis eiusdem & Obstructio-
 nis curatione dicta sunt: & quæ urinam mouere pos-
 sunt. In quem usum exhibebimus confectiones dia-
 rhodon

Robur ad
 dentia iec-
 ori, & uri-
 nam mouen-
 tia.

rhodó.abbatis,aromatici rosacei,dilaccæ,diacurcu
mæ pastillos de eupatorio,rhaharbaro, & absinthio:
theriacam item, & similia.Proderit autem unicè hoc
medicamento uti,quod R.Specierum diacurcumæ,
dialaccæ.añ.3.i.specierū diatriasantali,diarhodó ab
batis.añ.3.s.specierum aromatici rosacei.3.i.rhabar
bari selecti.3.s.seminum intybi domestici latioris,
melonum,foeniculi.añ.3.ii.absinthii,chamemeli,cal
suthæ.añ.3.i.nucis myristicæ,iunci odorati,spicæ nar
di.añ.3.s.sacchari.3.i.misce,fiat tragea.Mirificè etiā
hoc conferet,quod R.Seminum carei foeniculi,ani
si.añ.3.ii.cumini,seminis hyperici. añ.3.i. seminum
ammi,petroselini,dauci,smyrni (leuisticum uocāt)
añ.3.s.radicum iridis,asari.añ.3.i.absinthii.3.i.gly
cyrrhizæ.3.i.sacchari æquale omnibus pondus:mi
sce,fiat tragia.Animaduertēdū autem,ficciora medi
camenta magis quā liquidā anasarcis competere.
Ceterum non prætēmittēdum,quin extrinsecus ea
etiam adhibeantur medicamēta,quæ humores defic
care possunt:qualia sunt cataplasmata,emplastra, &
unguenta, aliaq; medicamenta resiccandi facultate
prædita.In quem usum cataplasma ex farina hordea
cea,fabaceaq; foenigræco,radice ebuli,baccis lauri,ab
sinthio & origano in uino decoctis confectum, & to
ti uentris capacitati impositū conuenit. Itē stercus
bubulū conuenienter resiccātū,non ineptè cum po
sca,aut oxymelite iponitur,infarcta ac superinsper
sa sulphuris quarta parte.Caseus quoq; recens mul
tū coaguli habens optimè ad omnes tumentes par
tes impositus facit.Deniq; stercoris columbini,ster
coris caprini,bupthalami, & chamemeli,æquales par
tes tuse,in acerrimo aceto & melle coctæ adhibeātur.
Emplastris etiam utēdum ex fermento,caricis,nitro,
iride,meliloto,saluia,pulegio,cardamomo.sulphure
uiuo,baccis lauri,staphysagria,sale,ammoniaco,ma
stice,thure,abrotono,aristolochia rotūda, fimo colū
barum

Tragea.

Extrinsecus
que
admovent
medicamē
ta.
Cataplas
mata.

Empla
stra.

Vnguentum.

barum cum oxymelite confectis. Ceterum omnia im-
pinguantia et resinosa cerata uitanda sunt, ueluti quae
inflant, et tumores, eo quod diffilationem impediunt,
distendant. Tamen debent assidue et crura et manus,
aliquaeque tumefactae partes in sole, aut iuxta ignem hoc
medicamento inungi, quod. ℞. Vnguenti agrippae.
℥.i. pinguedinis suillae. ℥.i.s. farinarum seminis lini,
sanigae, fabaceae, hordeaceae. añ. 3. i.s. seminum al-
thae, nigellae, dauci. añ. 3. i. sulphuris uini. 3. iiii. boli ar-
meniae. 3. 2. radicis iridis. 3. 2. s. aluminis scissi, thuris.
añ. 3. i.s. euphorbii. 3. i. oleorum irini, liliorum albo-
rum, chamemelini. añ. 3. i.s. cum cera quod satis est, fiat
unguentum: quo liquefacto, ex eo sepe tumores illi
nendi. Itaque dictis addantur ea quae supra in Vi-
tus ratione sunt exposita.

De ascite. Cap. XXIII.

Signa.

Vi-
tus.

Curatio

Clyster

IN hac uenter totumque abdomen intumescit, eoque
concussio talis auditur sonus, qualem uter aqua
non omnino plenus reddere solet. Reliquae uero
partes corporis, superiores praecipue, minime inflan-
tur. Vi-
tus ratio in hac aqua inter cutem specie sit
ex montanis auiculis, et aliis concoctu facilibus, et bo-
num procreantibus succum, haud secus quam in prio-
re. Curatio
Curandi ratio a purgantium medicamentorum
usu auspicabitur. Quapropter ea medicamenta quae
in Cap. precedente commemorata sunt, egrotanti-
bus exhibenda. Superat autem omnia reliqua, bras-
sica marina (quam soldanani et soldanellam hodie
uocant) in potu assumpta. Haec enim in euacuanda
hydropicorum aqua mirificum ostendit effectum,
adeo ut multi solius eius usu sanitati sint restituti.
Datur ex ea drachmae duae, plus aut minus, iuxta cor-
poris diuersitatem, in uino, aut sero lactis. Confe-
runt etiam catapotia de sagapeno, et drachmae duae
aut tres succi radicis iridis, adiecta sacchari uncia
una. Clysteres et adhibendi acres, nisi uenter sua spo-
te hu-

te humescat: tunc enim exiccare ipsum magis conue-
nit. Commendatur autem eiusmodi, qui ꝛ. Florum
daphnoidis (laureolam uocant.) 3. 2. polypodii, aga-
rici añ. 3. i. s. cassuthę. 3. iij. decoquantur in uino aut
aqua ꝛ. Colature. 3. xii. benedictę laxatiuę. 3. s. ec-
ligmatis Indi. 3. 2. s. mellis. 3. i. olei rutacei, chamę-
melini, irini añ. 3. i. salis gemmę. 3. i. s. misce, fiat enę-
ma. In eū etiam usum colocynthis, cartamus seu cni-
cus, baccę lauri, semē anisi, ammi, ꝛ. carei, ruta, radix
cucumeris syluestris, adiectis aliis decoqui possunt.
Post auxilia prædicta, uentri uniuerso ex præscriptis
cataplasmatibus ꝛ. emplastris q̄daz imponantur. Adhi-
beantur et inunctiones, exercitia, urinā ꝛ. sudores mo-
uentia auxilia, de quib. oib. suprā copiosę diximus.

De tympanite. Cap. XXV.

IN hoc uitio uenter inflatur, distenditurq; ꝛ. con-
cussus tympani sonitū edit: reliquę uero corpis
partes emaciantur. Viētus rationez prioribus si-
milem obtinet. tñ cuz magna ex parte ē flatibus oria-
tur, unice uitanda sunt omnia flatuosa. Aegrotanti
autē multa exercitia, ꝛ. sitis ingens, strenuō auxilia-
tur. Curatio aut ipsa à purgantibus medicamentis
inchoanda. Clysteres et, quib. flatus discutiendi fa-
cultas inest, infundere opz, qualis est qui ꝛ. Radicū
apii, fœniculi añ. 3. i. seminum anisi, fœniculi, dauci,
smyrni, oreoselini, cumini añ. 3. 2. carei. 3. iij. rutę, a-
sari, foliorum ebuli, meliloti añ. M. i. Buliant in aq̄
sufficiente, quoad tertia pars absumpta fuerit, Cola-
ture ꝛ. lib. i. hierę picę, benedictę laxatiuę añ. 3. s. ec-
ligmatis de baccis lauri. 3. iij. oleorum rutacei, ane-
thini añ. 3. i. s. salis. 3. i. s. misce, fiat clyster. Danda et
sic affectis ea quę urinā mouent, ꝛ. iis q̄ flatus discu-
tere ꝛ. digerere possunt. tum intrinsecus tuz extrinse-
cus utendū. Qualia certe multa in Cap. de Coli do-
lorib. ad qđ recurrendū erit, dicta sunt. Venter itaq;

Signa.

Viētus.

Curatio.

Clyster.

M indies

Sacculi. indies panico, milio, sale, furfurib. foliis rutæ, chame-
meli florib. cinere calido, sacculis insutis, fouendus.

Ceratum. Potest etiā hoc adhiberi ceratum, quod ꝑ. Floꝝ cha-
memeli: meliloti añ. 3. i. s. mētaſtri: ſatureiꝑ, aſari añ.
3. i. ſeminū aniſi, fœniculi: rutę, cumini, dauci. añ. 3.
i. cardamomi. 3. s. myrrhę, caſtoꝛei. añ. 3. i. oleoꝝ ru-
tacei. 3. iii. anethini. 3. i. s. refinę ⁊ cere quod ſatis eſt
fiat ceratū. Cucurbitulę ꝑꝛeterea leues, cū multa flā-
ma, crebro toti uentri ſuffixę, mirifice ꝑꝛofunt. Ven-

Cōfeſtio ter etiam aſpero linteo tantisper dū robur excitetur
ꝑꝛefricandus. Intriſecus utendū cōfeſtionibus dia-
niſi, diacumini, ⁊ ex baccis lauri: uel iſta, q̃ ꝑ. Spēꝛū
dianiſi, diacumini añ. 3. i. Specieꝝ eclignatis de bac-
cis lauri. 3. i. Specieꝛū diagaſange. 3. s. ſeminūꝝ aniſi
carei, dauci, fœniculi añ. 3. s. folioꝝ rutę, ſe. apiꝝ,
ſmyrni añ. 3. i. ſacchari. 3. vi. diſſoluti in ſuccis fœ-
niculi ⁊ apiꝝ, fiat cōfeſtio in morſulis. Quę hic deſi-
derantur alia, ꝑꝛete ex Cap. de Coli doloribus.

De intemperie lienis.

Cap. XXVI.

Cauſa.

Quemadmodū reliquę corporis partes octo
intemperierum generibus affliguntur, ita ⁊
lien. Verūꝝ frequentiffime frigidaꝝ ⁊ humi-
dam iuſtinet intemperiem. Singularum autem cau-
ſas non eſt cur referamus. eꝛdem enim ſunt, quę alia-
rum partium corporis. ꝑꝛetendę itaqꝝ ex Lib. Galeni
de Morborum cauſ. Cap. ꝑꝛimo, ſecundo ⁊ tertio.

**Signa in-
temperiei
huiꝛ, qua
utatis.**

Frigida.

Signum autem certum ⁊ compendioſuꝝ intemperiei
in liene, ea quę eduntur ac bibuntur exhibeant, ⁊ q̃
forinſecus cuticulę iuxta ſiniſtrum hypochondꝛiuꝝ
accedunt. Si enim frigida intemperies iuxta ipſum
fuerit oborta, omnis cibus ⁊ potus qui efficaciter re-
frigerare ꝑꝛoteſt, facile ⁊ manifeſte lienem lædit. Om-
nia etiam frigida extrinſecus admota offendunt,
atqꝝ adeo frigidam lienis arguunt intemperiem. Eaꝝ
uero ipſam omnia calida conſolantur. Quod ſi ca-

Calida.

lida

lida fuerit lienis intemperies à nullis quæ in cibo aut potu exhibentur, aut etiam extrinsecus accedunt, dolorem perfert. Et si quidem caliditas augetur, non solum nihil tumori apponitur, sed et contractiones amplius sustinet, præsertim si febris adsit. Cæterum et cibi et potus calefacientes, et quæ extrinsecus corpori calorem addunt, calidas etiam intemperies augent et exacerbant. Solatio aut sunt eis omnia refrigerantia. Similiter etiam sicce intemperiei in liene signa colligere oportet, maximè quum pro magnitudine propriæ naturæ non eminet. Ea item quæ extrinsecus corpori adueniunt, atque intra ipsum deuorantur, si exiccandi facultate prædita sunt, lienem exiccant. Porro ubi humida intemperie lien laborauerit, atque ea amplius inualuerit, in tantum eius excrementum facit, ut etiam uentrem ac iecur pertingat. Spes quoque doloris una cum prædictis signis infestantem intemperiem demonstrabit. In calida enim et frigida intemperie minus dolent, aut nihil omnino, neque quicquid etiam in humida: minimum uero in sicca. Ex prædictis etiam coniecturam facere licet compositarum in liene intemperierum. ferè enim in totum ubi calida intemperies fuerit intensa, sicca eam consequitur, et ad frigidam inueteratam humida concomitatur. Quandoquidem uero et humores in lienis confluente tumores producant, eorum quoque diligentem considerationem facere oportet, quales nam sint tandem, ex his quæ iam dicuntur. Bilioso enim fluore existente, uniuersum corpus calidius apparebit, etiam si non adsit febris, oculique et urinæ per bilem coloratæ. Siccitatem semper accusabit eger, et de siti conqueretur, ac bili os infestante. Cibus fastidit, et uigiliis infestatur, frigidamque desiderat, una cum hoc quod linguam subflauam habet. Si uero atre bilis sit fluore, color tum in lingua, tum in reliquo toto corpore apparebit, et appetentia aderit ciborum, moestique ac subtri-

Siccæ.

Humidæ.

Signa in
temperiei
cum fluore
substantiæ
Biliosæ.

Atre bilis.

M i i ftes

Pituitosus ægri sunt. Aut uero ubi pituitosus humor in lienem deferatur, consimilis pituitosis aderit color, ægriq; minime sitient, et cibum appetent, nisi salsa fuerit pituita: tunc enim cibum fastidiunt ægri, potusq; magis sunt appetentes. Quin urine quoq; pituitosæ sunt, ipsiq; ægri secundum mores pigri sunt et segnes.

Sanguinea. Quidam uero ex eis qui frigidam affectionem habent, magnum et durum lienem acquirunt. Quod si sanguineus existat in lienem confluens humor, possibile est ipsum colorem tum iuxta linguam, tum circa cutem permutari. Inter appetentiam aut ciborum et fastidium, medio quodam modo habent ægri, reliquisq; magis languent, etiam si non parem uisceris tumorem habeant. Venæ uero uniuersi corporis, sanguine plene apparent, et urine subfulvæ. Hæc signa fusius ex Aëtio narrauimus, quod nimirum communia sint, et omnibus reliquarum partium corporis intemperiebus adaptari queant. In uniuersum quidem lienis intemperies nude qualitatis ferè citra tumorem sunt. Eas itaq; tum per cibos ac potus, tum per simplicissima medicamenta, ac fomentum irrigationes, quæ intemperiei contraria sunt, corrigere oportet. Calidam igitur curabis, sicut iecoris, per cibos ac potus frigidos, inunctiones ex rosaceo et melino, atq; per alia quæ Cap. 18. huius Libri sunt dicta. Frigidam lienis intemperiem haud secus atq; iecoris, per ea quæ moderata calefaciendi uir prædita existunt. In humida lienis intemperie, præter ea quæ Cap. paulo antè citato commemorata sunt, proderit quinquefolii radix, plantago sicca, spuma et flos salis, ammoniacum, succus salicis, et similia, si ex iis affuso sufficenti aceto unguentum aut ceratum conficiatur, qualia paulo post describemus. Cōuenientissime etiam huic sunt frictiones, quæ discutiendi facultatē obtinet. Siccam lienis intemperiem balneum dulcium et calidarum aquarum, curat: inunctio item ex oleo dulci. cibi citra

tra.

tra refrigerationem humectantes, uelut est ptisanæ succus. Porro si intemperie cū substantiæ fluore liē afficitur, tum ubi sanguinea fuerit, ex uena cubiti interna sinistri brachii (quam lienarem uocant) sanguis mittendus erit. Aut si ea inueniri haud possit, ex ea quæ inter annularem et auricularem uocatos digito sita est. Dein adhibenda intrinsecus et extrinsecus quæ lienis robur adiciere possunt medicamenta, qualia sunt cortex radicis capparis, scolopendrium, hæmionitis, ammoniacum, scylla, tamarix, absinthium, adianthos, iris, calamintha, et similia, quæ iecoris quoque firmitatem et robur conseruare ualent. De quibus omnibus copiosius in Cap. de Lienis inflammatione dicemus. Si reliquorum humorum substantiæ cōfluxerint, primum redundans humor purganti medicamento uacuandus erit: dein reliquo tempore quæ intemperiem relictam corrigere, et lienem etiam corroborare possunt, adhibenda.

Curatio
intemperiei
cum fluore
substantiæ.

Lienē cor
roboran
tia.

De lienis inflammatione. Cap. XXVII.

Lien ut reliquæ corporis partes inflammatione corripitur, quoties sanguis præter naturam ad eum confluit. Cognito citur grauitate et tumore sinistri hypochondrii, qui ad tactum non cedit, dolore et distensione loci, febre, et estu. Irruentis uero humoris copia, ex magnitudine et uelocitate generationis ipsius inflammationis. Viētus ratio eorum qui inflammatione lienis laborant simplex sit, eaque quæ facile concoquantur, in cibo exhibeantur, uelut est alica lota, ptisanæ succus, panis madefactus, et eiusmodi. Si uero inflammatio diutius remoretur, etiam auicularum carnes eis concedendæ, et pisces petrosi aquis degentes. Bibat eger decoctum cinnamomi, aut uinum aquosum. Curatio ipsa à uenæ lienaris, aut eius quæ inter minorem et annularem digitum est, incisione auspicetur, si nihil sit quod eam

Causa.

Signa.

Viētus.

Curatio.

Venæ lienaris.

Incisio.

M iii fieri

Quæ im-
ponenda
lienī,

Fomenta.

Cataplas-
ma.

Curatio
lienī s in-
durati.

feri uetet. Venter etiam per clysterem assidue elua-
tur, potissimum si uenę incidendę medela relinqua-
tur. Deinde imponentur lienī medicamenta adstring-
gentia, quę id quod influit reprimere, et lienis firmi-
tatem conseruare possunt. Non sunt uero sola ad-
stringentia adhibenda, sed admiscenda erunt ea quę
ci tra euidentem calorem extenuant, secant, atque re-
laxant, ne scilicet crassus in eo succus obturatus ue-
hementius incrassescat, quemadmodū Galenus lib.
13. Ther. meth. diligenter monuit. Itaq; si moderata
fuerit inflammatio lienis, uinum uetus ac austerum
tenuiumq; partiū oleo dulci permixtum, et lana suc-
cida exceptum imponemus. Si uero maior sit calidi-
tas, rosaceum sit oleum, aut melinum, et chamæmeli-
num cū aceto. Verbi gratia ℞. Olei rosacei, cotone-
orū an. ʒ. ii. olei chamæmelini. ʒ. i. aceti optimi. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.
misce. Quod si olea prædicta non adsint, folia rubi,
aut mala cotonea in oleo decoquantur, et quædam
etiam tenuium partium addantur, uelut est absin-
thium et pulegium. Cauendum etiam, ne actu frigida
lienī imponamus, ea quę extrinsecus admouentur
medicamenta. Post irrigationes ac fomenta ad cata-
plasmata, in quorum compositionem hordeacea fa-
rina, et loliacea, caricas, et lini semen assumantur. Cæ-
teterum cauendum ne post irrigationes et ea cataplas-
mata locus denudetur: sed ubi hæc fuerint sublata,
mox emplastrum aut ceratum, qualia in Cap. de Ie-
coris inflammatione descripsimus, imponatur. Si
quidem similia genere medicamenta, ambo uiscera
postulāt: tanto autem ualentiora lienis sint, quanto
crassiore utitur alimento. Quare ex iis quę de ioci-
nore diximus, ad lienis curationem exempla trans-
sumes: quibus semper ferē acetum, et quippiam quod
lienī gratū sit eiusq; robur peculiariter tueri possit,
adiicias. Verum ubi inflammatio in scirrhum degene-
rat, non solū extrinsecus, sed etiam intrinsecus ualē-
riorib.

tiorib. medicamentis uti conuenit. Intrinsicus itaq; ualidissime portiones (nam eas sine molestia tolerāt) exhibendę. Ex quarum numero, primas partes sibi uendicant cortices radicū capparis, hemionitis, myricæ radix atq; germina in aceto uel oxymelite cocta. item centaureę minoris succus epotus, & lupinorum amarorum decoctum, cum ruta & pipere assumptum. Anagallidis fœmine scrupulus cum posca, aut oxymelite potus mirificè confert. Extrinsecus fomentum tale adhibeatur, quod ℞. Centaurii minoris, hemionitidis, rutæ añ. M. i. radicis corticis capparis. 3. i. Decoquantur in aceto: & postquam decocta fuerint, spongia in decocto irrigata leni calida imponatur. Vel potest esse huius unguenti usus: quod ℞. Oleorum de capparibus, liliorum alborum, irini añ. 3. i. medullę ossium cruris bubulini. 3. i. s. mucositatis radicis althę, fœnigręci, se. lini añ. 3. i. pinguedinis tauri, gallinę, anserinę, añ. 3. ii. corticum radicum capparis, tamaricis, costi, centaurii minoris añ. 3. i. ammoniaci, bdellii, chalbani añ. 3. s. gummi prius in aceto dissolutis, cum cera quod satis est, fiat unguentum. Emplastra denique & cerata multum conferre solēt. Componatur itaq; tale, uel simile, quod ℞. Oleorū liliacei, irini, de capparib. añ. 3. i. farinę hordei, fœnigręci, seminis lini, añ. 3. i. corticū radicis capparis, hemionitidis añ. 3. i. s. radicis althę. 3. s. bdellii, ammoniaci, galbani añ. 3. i. s. opopanacis, myrrhę, thuris añ. 3. s. cum resina terebinthina & cera quod satis est, fiat ceratū. Ceterum oportet medicū diligenter ad affectū respicere, & pro eius ratione tū addere, tum adimere aut emollientia, aut attenuantia & discutientia, aut quę robur addunt. Victus etiam ratio ubi durities perfecta fuerit, attenuatoria sit. Acrum etiam rerum comestio per interualla, & potus exiguus conuenit. Vinum sit non ualde uetus, quod aqua permisceatur, in qua ferrum sæpe ignitum extinctum sit.

Fomentum.

Unguentum.

Ceratū.

Victus.

M iiii Con.

Conuenientissimum enim lieni indurato remediū existit, candens ferrum in aqua, aut uino, aut posca subinde extinctum. Plurimum etiam fiducię in exercitationibus ponendum, quibus ante cibum uti conuenit, corpore superuacuis non abundante. Manifestum autem est, quod uociferationes quoq; oportune, et in tempore assumptę, eis summę opitulantur. Cucurbitulę etiam cum scarificatione affigendę.

De lienis obstructione. Cap. XXVIII.

Acidit, ut interdū non solum propter attracti-
cis facultatis imbecillitatem, uerum etiā meatus, per quem atrę bilis feculentus humor ex iecore ad lienem deriuatur, obstructionem, ut impurus ac uiciosus humor in totū corpus distribuatur. Quod ubi contigerit, color corporis uitiatus ad nigrēdinem uergit, et nonnunquam immedicabilia ulcera hoc modo patientes habent. Cause obstructionis lienis ex iis quę in Cap. de Iecoris obstructione dicta sunt innotescunt. Cognoscitur ex grauitate, quę est circa dextrum hypocondrium, uitiato corporis totius, pręsertim uero faciei, colore: spiritus difficultate, et aliis quę ex prędictis suprā innotescunt. Curatio. Curatur is affectus uictus ratione extenuatoria, et medicamentis obstructionem tollentibus, de quibus abunde dictum est in Cap. de Iecoris obstructione. Vtraq; enim uiscera similibus genere medicamentis indigent: lien tamen tanto fortiorib. indiget, quanto crassiore utitur alimento. Quapropter quatenus ad humorum crassorum ut uacuationi promptius obediant preparationem attinet, iisdem certe medicamentis opus erit: hoc duntaxat obseruato, ut sint ualidiora, et commixta habeant quę robur uisceri addere queant. Post preparationem uacuandi sunt humores per ea medicamenta, quę crassos et feculentos humores purgare possunt, de quibus iam sæpe dictum

Cause.

Signa.

Curatio.

Preparatio humorum.

dictum est. Posthæc intrinsecus adhibenda sunt, quæ
suprà de Iecoris affectibus, potissimum eius obstru-
ctione cõmemorata sunt. Forinsecus autem unguen-
ta & cerata, quæ in Capite præcedenti produximus,
admouenda erunt.

De renib, cruentam vrinam excernentibus. Cap. XXIX.

Renum fit nonnunq; passio, in qua tenue san-
guinis serum mingitur. Accidit autem ppter
renum imbecillitatem, urina nam subinde iecer-
nere à sanguine nequeuntium. Aut propter amplitu-
dinem osculorum, ex uena caua urinam ad renes ex-
colantium. Quum enim ampliores ac patentiores
meatus fuerint, quiddam etiam ex sanguine uenæ e-
mittunt, aliaq; item crassa. Sæpe renes etiã iuxta cir-
cuitus quosdam sanguinẽ excernunt, simili modo
ut ex hæmorrhoidibus in sede fieri consuevit. Quidã
etiam sanguinem ex renibus excernunt, propter ue-
næ rupturam in renibus, factam. Veluti cõtingit is
qui graue onus leuarunt, aut ualde saltarunt, aut ex
alto ceciderunt, aut aliud quippiam tale uiolentum,
ut est exercitium, aut coitus nimius, pertulerunt. Ali-
quando autem ob acres ex supernis defluentes hu-
mores, erosio uenarũ contingit. Cæterum si passio
propter renum imbecillitatem contingat, sanguis
qui excernitur, seorsus admodũ est. Sin ob osculo-
rum amplitudinem, tunc nihil dolitant. Si certis cir-
cuitib, excretio fiat, tum uel plenitudo est totius cor-
poris, aut consuetorum exercitiorum neglectus, aut
membrì cuiusdam, abscisio præcessit. Si propter uenæ
rupturam, tunc copiosissimẽ sanguis excernitur. Si
uero ab erosione, tum sensim & paulatim excernitur
dolorq; renes excruciat. Curabis itaque eam cruen-
tẽ urinẽ excretionem, quẽ propter renum debilita-
tem, aut amplitudinem osculorũ urinas ad renes ex-
colatiũ accidit quietẽ, cibis adstringẽtib, potione

Cause

signa

*Curatio
urinẽ crue-
ntẽ ab im-
becillitate
renum.*

uini

et nasor
et etus
amplitudi
ne.

Curatio si
percutit
cutis, aut
propter
uenarum
rupturam, aut
erosionem
accidat.

uini nigri, et aliis que in Cap. de Cruento sputo co-
prehenia sunt. Ab iis autem potissimum que urinam
ciant, et a coitu omnino abstinendum. In potu autem,
præter ea que in Cap. iam citato dicta sunt, exhiben-
da symphyti radice decoctum, et tragacantha in ui-
no nigro macerata. Sistit etiam sanguinis ex renibus
eruptiones cornu ceruini usti drachma una ex uino.
Folia item salicis cum uino; lapidis hematitidis drach-
ma una. Mirifice quoque confert polygoni decoctum.
Bolus denique Armenia drachme pondere sumpta, Sy-
rupus rosaceus, myrthinus, pastilli de succino, de ter-
ra Lemnia, et de spodio nominati. Quillum præte-
rea lac unice commendatur, si ieiuno .℥.iiii. quibus
drachma una boli armenie commixta sit, exhibean-
tur. Forinsecus renibus et lumbis imponatur ea que
ad sanguinis per sputum reiectionem, et in Capite de
Dysenteria, aliisque sanguinis eruptionibus descripta
sunt, et quecunque una cum eo quod adstringunt et
resiccant, etiam robur addere possunt, qualia sunt ru-
bi folia, et quercus. glandes, itemque myrti baccæ,
malicorium et balaustia, et similia. Post hæc habi-
tus corporis cibis, lacte, ac auicularum carnibus,
suillis etiam mactis reficiendus est, quo uniuersum
corpus ad pristinas uires reducatur, et renes corro-
borati proprium munus, obeant et serosum humo-
rem à sanguine secernant et excolent. Porro si renes
secundum circuitum sanguinem excernunt, aut pro-
pter rupturam uene, aut acres ex supernis deflue-
res homores: tunc statim uena que in cubito est secan-
da erit. His quidem qui per circuitus sanguinem ex-
cernunt, paulò antè circuitum, reliquis uero statim
à principio. Ceterum sanguinis detractionem partiri
melius erit, ut paulatim eis reuulsio et auersio fiat. Lo-
ci autem circa renes spongiis posca imbutis coope-
riantur, aut lanis succidis cum rosaceo et aceto. Post
hæc emplastra, unguenta, et cerata locis paulò antè
citatis

citatis descripta, imponenda. Cōmodè etiam cucurbita adhibetur, præsertim si suspicio sit inflammatio nem ad esse in his, qui ob uenę rupturam sanguinem mingunt. Conueniunt etiam potiones suprā, et in Cap. de Sputo cruento commemoratę. Aeger interea etiam à salis et acribus omnibus arcendus. Vbi uero iam sanguinis excretio cessauerit, uictus ratione utendum est, unde non multus sanguis gignatur, maximè in iis qui per circuitū excreuerunt, et luperne corporis partes assiduè exercendę. In iis autem qui ob uenam ruptam sanguinem mingunt, si exulceratio in locis relinquatur, ipsam post sanguinis suppressionem curabimus, per ea quę in Capite de Renum exulceratione dicentur.

De inflammatione renum. Cap. XXX.

Renes ob plurimas causas inflammatione corripiuntur. Nam et humores corrupti, et plage, et attritiones, et medicamentorū potiones inflammationem procreant, et præsertim equitationes cōtinuę et uehemētes. Accedit egris dolor pulsatis retro iuxta primam dorsi uertebam, paululum suprā spurias costas. Distendit aut dolor sursum usq; ad iecur, præsertim dextro rene affecto. Deorsum uero usq; ad uesicam et pudendū, lumbosq; et coxendices, per ætinem item et fœmora. Consequitur etiam stupor propinqui cruris, et neq; rectā erigi possunt, neq; pedibus ingredi. Et siue sternutatio, siue aliqua alia cōcussio irruat, uehementi dolore lancinātur. Frigent eorum extrema, et magis surę ac pedes. Adest urinę emittendę difficultas, minguntq; assiduè ac laboriose, in principio quidem tenuia et aquosa, in quib. nihil subfidet: inflammatione uero in peius proficiente, rubicundiora: deinde etiam crassa et mucosa, adsuntq; febres uehementes. Quod si adhuc amplius inflammatio augeat, hæc omnia sunt uehementiora. His

Causa.

Signa.

Villus.

Chratio

Urinam
 provocā
 tia non ex
 hibenda.
 Clysteres

ra. His accedit nausea, et stomachi morsus, et uomitus bilis. Quidam autem ipsorum usque ad animi deliquium anguntur et exudant. Siftitur ipsis venter adeo ut inflentur, et assidue ructus emittant. Sequitur fastidium uehemens: et quibusdam continuè sunt exacerbationes: quibusdam uero per interualla. In uniuersum autem ventris egestio, et urinae multa excretio dolores ipsos precedunt. Aegrum in mollissimo lecto decumbere oportet, ac primo die cibo abstinere, non tamen in multos dies inediam extendere. Urinae enim acriores per inediam redditae, uehementissimos morsus infligunt. Itaque in principio sorbitionibus tenuibus morsus lenientibus nutrire oportet, ut est ptisanæ succus, aut hordei alica. Malua etiā inter holera summè confert. Potus sit decoctum cynamomi. Et in summa uictus ratio sit talis, qualis in aliis inflammationibus. Inter initia, quod ad curandi rationem attinet, sanguis statim detrahendus est. Secunda autem erit quæ in poplite est, secundum rectitudinem renis patientis. Post uenæ sectiones ad ea quæ extrinsecus admouentur procedendum, cataplasmata nimirum, fomenta, linimenta, emplastra, et similia quæ mediocrem refrigerandi ac leniendi uis obinent, ex oleis rosaceo, cotoneorū, chamemelino, farinis hordeacea, fabacea, foenigræci, et similib. quæ in Capiti. de Inflammationibus iecoris et lienis dicta sunt, composita. Cauendum hoc tempore, ne ea medicamenta quæ urinam cient bibenda dentur, Galeno sic monente lib. 13. Ther. meth. obledunt enim, mordaces humores inflammatis partibus inducendo. Clysteribus autem mollibus, potissimum si venter nihil deiecerit, utendum: ex maluæ decocto, aut seminis lini et foenigræci, aut succo ptisanæ confectis, cum oleo uiolaceo, aut chamemelino. Ceterum copia non multa infundatur, ne repleta intestina comprimant renes. Quod si dolor per ea quæ extrinsecus imponuntur non

non leuabitur, cucurbita lumbis ac iliis est adhibenda, & fissuris impactis plurimus sanguis est attrahendus. deinde iterum spongiarū fotu utendū, & aliis q̄ dolorem leuare possunt. Vbi perfectè iam sedata ac cōsumpta fuerit inflammatio, id quod cognoscitur doloris omnimoda remissione, tunc etiam p̄ urinā prouocantia purgandum erit. à concoctis enim inflammationibus urinę prodeunt multæ & crassæ, & in iis bonum est quod subsidet, atq; adeo morbum prorsus iudicant. Porro si per prædicta medicamenta affectus nō propellatur, & neq; dolor, neq; febris, neq; grauitas horum usu conquieuerint, urinæq; difficultas ac frequens stillicidium egrum molestauerit, pus hac in parte colligi indicium est. Tunc itaq; quàm celerrimè suppurationē, ac puris eruptionem adiuuare oportet. Qua in re spongiæ aqua & oleo assidue imbutę proderunt, fotus gratia admotę. Eūdem etiam usuz cataplasmata præbent, quę ex farina hordeacea, fursu ribus, ficubus, althea, & similib. supra in Cap. de Iecoris inflammatione dicta sunt, cōstant. In solium quoq; ex emollientibus herbis, malua, althea, chamemelo: lini semine: fœnogræco, paratum descendere summè confert. Quod si uero perfecta iam suppuratione (id quod cognoscitur: si febres & dolores minores fuerint; grauitatis autē sensus circa renem affectum remanserit) ruptura moretur; in potu exhibenda quę urinaz ducunt; ut est fœniculi: pulegii: origani, & similib. decoctū. Hęc enī rumpunt interdum suppurationem, & pus per urinā expurgant. Quod si autem usus illorum nihil contulerit, acrioribus clysteribus aluus subluenda erit; uelut est alliorum; raphani syluestris, ac radicis cucumeris syluestris decoctum. Oportet uero admiscere oleuz: quo infusa lubrica reddantur. Hęc itaq; per clysterem infundenda, iubendiq; ægri quo plurimo tempore apud se detineant, consueuerunt enim

Suppura
tionis in
gna.

Ruptura
facta in
dicia.

enim sepe ipsam suppurationem rumpere: una cum hoc quod uentrē emollire solent. Ruptura uero facta: caruncule parue: oblonge, cum urina excernuntur. Et si quidem ulcera fuerint maligna: humores foetidi: liuidi: et mucosi: si uero benigna, pus ipsum album: et equale, et leue: absque odore graui: excernitur. Quae uero deinceps sint adhibenda medicamenta, in Capite de Renum ulceribus dicemus.

De calculo renum.

Cap. XXXI.

Causa.

Renum calculis prouecti etatis homines frequentius quam pueri apprehenduntur. Causae autem generationis horum calculorum existunt, assidue cruditates, unde humoris crassi et terrei multitudo congregatur, et ardor igneus circa renes caliditas, qui humores ad assans: eos cogit: et in lapides indurat: ad modum toforum qui in aquis reperiunt, quae in greis praesertim balnearum uasis coquuntur.

Signa.

Accedit egris grauis in renibus dolor, aculei infixi sensum praebens: tumore tamen nusquam foris apparente. Spina egre flecti potest: crus quod est directo est renis affecti, stupet: adest fastidium, et uomitus. Urina circa obdurationis principium pauca, aquosa, mingitur. Postea uero perfecta eius suppressio contingit, aliusque nihil excernit: uerum: cupiditates multas ad egerendum facit. Excernitur autem aliquando sanguis: propter uiolentiam calculorum. Urina etiam arenosam subsidentiam habet, potissimum ubi lapis ex renibus fuerit emotus. Quas singulas ferè notas Hippocrates etiam iis uerbis complexus est: In renem dolor grauis quando cibo replentur inuadit, pituitamque uomunt. Quum uero dolores intentiores fuerint, eruginosa, atque tum leuiore quidem sunt. Dolor autem leuantur, quando cibo uacui fuerint. Aene rufescent, cruentaque mingunt. Stupor cruris quod est directo est. Hec ille. Porro leues, et rotundi facile

6. Epid.

Par. 1.

Aph. 5.

cile excernuntur: non item, qui alia quacunq; forma præditi sunt: maxime tamen ob longi & asperi difficulter excernuntur. Ceterum quum lapis in renibus obturatus uehementissimos dolores intulerit, ne scilicet sanguinis multitudo adtensione & dolore affectam particulam procumbat: in corpore plenitudine laborante: & robusto: cōfestim poplitis uena, iuxta Hippocratis loco iam citato consiliū: incidenda erit, eius nimirum cruris quod stupet, & e directo renis patientis est. Qui uero uitioso humore seu cacochymia laborant, iis purgatio redundantis humoris conuenit. neq; omittēda hæc est, nisi aliud quippiam id fieri prohibeat. Id quod etiam Hippocrates iussit: dum iuuenes elleboro esse purgaudos ait. Verū si uenę sectionem, aut purgationem adhibere minime licebit, aluum per clysteris infusionem eluere oportet. Quod tum potissimum faciendum erit, ubi multa in intestinis excrementorum copia fuerit. Cauendum tñ unice erit, ne sint ualidiores, atq; adeo ne aliunde humorū copiam ad intestina trahant, ne meatus urinarii angantur & comprimantur: sed sint tales, quę duntaxat excrementa in intestinis detenta uacuare possint. Vt est huiusmodi, qui ꝑ. Maluę, altheę; mercurialis: trichomanis (polytriciū nomināt) helxines: hoc est parietarię añ. M. i. si symbrii, cardamines, id est nasturtii aquatici. M. i. s. seminum oreo selini, apii, fœniculi, lini añ. 3. iii. radicis acori ueri. 3. i. s. furfuris. 3. i. Buliant in aqua iuste quantitatis, & colentur. Colature. 3. xi. casię fistularis. 3. i. hierę picre. 3. s. mellis rosacei colati. 3. i. s. oleoꝝ anethini: rutacei, chamemelini añ. 3. i. salis. 3. 2. misce, fiat enema. Naq; clysteri. assidue: aliis fere omnib. neglectis remediis (ut facere pleriq; hodie solent) utendū, sed bis aut ter, sic tamen ne ultra ꝑsuetuz tps retineant. Retenti enim cōpressionez atq; angustiam renum, & meatum urinarioꝝ efficiunt, ut copiose Lib. 2. Paradox.

Curatio.

Vena sec
ctio.

Purgatio

Clyster.

Laxantia**Unguen-****tum.****Vrinam****mouentia****Deducen-****tia ad re-****nes.**

dox. Cap. 15. diximus. Excrementis alui expurgatis, quæ laxare meatus possunt medicamenta adhibenda erunt. In quem usum hoc unguento renes et lumbi inungendi, quod ʒ. Oleorum anethini, amygdalarum dulcium añ. 3. 2. olei chamæmelini, 3. i. s. adipis gallinacei, anserini añ. 3. 2. butyri salis experti, 3. i. cere quod satis est, fiat unguentum molle. Infectionibus item utendum ex decocto calaminthes, origani, parietarię, sisymbrii, cardamines, brassicę, foliorum althęę, malue, et similium. Aut eger in solium tepidum frequenter demittendus. Fomenta etiam locis admodum commoventur ex furfuribus, cum foliis althęę decoctis. Item cataplasmata ex farina tritici, seminibus lini et fœnigręci, lupinorum, peucedani radice quam tenuissimè trita, et chamæmelo. Oportet autem coaceruatim alia super alia cataplasmata adferre, priusquam primū frigescat. Aut si non libeat, calefactorio alio extra cōtegere ne refrigerentur. Id quod commode fieri potest per saccellos, aut alia uaporiaria cataplasmati imposita. Hęc interdum ad lapidis purine eiectionem sufficiunt. Quod si uero non contulerint, ea etiam quę urinam cient bibenda dabis. Vrinam autem multam hęc ducunt, acorum, hypericum, oreoselinum, semen lithospermi, hoc est, milii solis, ammii, dauci, et fœniculi, asarum, radix bryonię, rubię tinctorum, cortex capparis, asparagus, et similia. Deducunt autem ad renes ea quę calculos confringunt, peucedani radix, apius et radícula. Lapides autem in ipsis renibus confringunt et atterunt, si onadianthum, bdellium, uiticis seu agni semen, rusci radix, saxifraga, beronica, ciceris iusculum, lithospermum, tecolithos (qui lapis iudaicus dicitur) xanthium, althęę semen et radix, et eiusmodi. Horum singula partim decocta, partim tenuissimè trita, præbeto bibenda. Porro ea quę urinam cient, ac lapidem frangunt, tunc exhibere conuenit, quum uehemen-

tes

tes dolores remittunt: id quod accidit, lapide iā trāsmoto, & ex sede sua agitato. Quod si obfirmati ac uehementer impaſſi ſint lapides, plurimus potus uītandus, itemq; ea quę urinam ducunt, cum enim ſecum excrementorum copiā ad renes deducant, meatus etiam urinariorum plus obſtruunt, atque calculi ex renibus tranſitum impediunt. Fomentis autē ac cataplaſmatis, & inſeſſionibus membra (ut diximus) relaxanda, & uenter per leuia infula ac inſeſſus euacuāndus, ne urinarīi meatus comprimantur. Poſthęc autem doloribus aliquantulum lenitis, etiam cucurbitulę utiliter ipſis adhibentur, & præſertim preſſius affixę, inflammatione uidelicet id non impediēte. Adeo enim coaceruatim tranſinouent ſepe cucurbitę ipſos lapides, ut repente dolores ſupprimant, lapide nimirum in ueſicę amplitudinem trāſueſto. Qua propter in principio ſupernē à rene cucurbitę ſunt affigendę, & ad inguina attrahendę obliquē, ſecundum meatuum urinariorum ſitum. Cæterum delati ex renibus in ueſicam lapides, & præ magnitudine circa collum ueſicę detēti, ſepe in extremum periculum egrum deducunt, tum propter dolorum acumē, tum quod urinam excernere non permittunt. Decubitus igitur formam in talibus moliri oportet, ita ut ſupini ſituentur, & longē altiores coxarum uer-tebras habeant. Deinde multiformiter eos commouere, quo omnibus machinamentis adhibitis lapidem ex ipſo ueſicę meatu excidere faciāmus. Quod ſi hac ratione nihil profecerimus, catheter inſtrumentum proliciendę urinę aptum immittendum, eoq; lapis à collo ueſicę amouendus, & urina educenda. Si uero ex ueſica quidem excidat calculus, iuxta medium autem meatum ipſius pudendi obfirmetur, & uulnerando exulcerationis periculum inducat, aqua calida paulatim ab alto pudendorum partibus donec robore ſuffundantur, inſtillanda.

cucurbit.

N aut

*Preserua
tio a lapi
de.*

*Pulvis ad
calculos
renes.*

aut pudendum in olenm calidum, quod relaxandi
uim obtinet, demittendum. Decoctum etiam quod
dam ex iis que urinam ducunt, plurimum exhiben-
dum est, iubendusq; eger ut multam urinam congre-
get, eamq; postea emingat, ac diligentius expellat: ita
enim detractus lapis celeriter excidere conuevit.
Quum uero neq; hoc modo eum extrahere posse-
mus, secandum erit pudendum, uulnuscule supernè
iuxta glandis magnitudinem incusso. Inferne enim
secare non expedit: quandoquidem fere semper in fi-
stulam proficit, ac postea per ipsam fissuram urina ex-
cernitur. Lapide amoto preseruare hominem oportet,
ne rursus renes lapide infestentur. Tuetur autem
a calculis ne fiant, cibus boni succi, concoctu faci-
lis, et moderatus, dein exercitia mediocria, rarusq; le-
guminum omnis generis, frumentaceorumq; ulus,
item casei, lactis et que ex ipso preparantur obsonio-
rum: uini nigri, copie carniū, et omnium summa-
tim crassi succi, ac nimis calidorum et acrium. Ae-
gros etiam admonere oportet, ut à cœna sæpe uo-
mant, et absinthium assidue bibant, et per tempus cer-
tum uenam secant, siquidem sanguis abundare uidea-
tur, aut conuenienti temperaturę ipsorum purganti
medicamento utantur, si uitiosi humores coacerue-
tur. Oportet etiam ipsam aquam per omnem uictum
purissimā esse, et percolatam. Vinum item tenue, al-
bus, urināq; ciens, neq; ualde uetus. Utantur quoq;
per interualla medicamentis urinā mouentibus, hoc
potissimum, quod multę est efficacię. ꝛ. Radicū fœ-
niculi, asparagi, ananthes: id est filipendulę añ. 3. 1.
radicis rubię tinctorum. 3. 1. radicis aristolochię ro-
tundę uocatę, althę añ. 3. 1. liquiritię raie. 3. 2. lapi-
dum ex spongiis marinis: techoliti seu Iudaici añ. 3.
1. seminum annui, dauci, oreosolini, saxifragę albę,
fœniculi: anisi: li. hospermi añ. 3. s. seminum melonū
citrulli, excorticatorū añ. 3. 1. s. seminis halicacabi,
hoc

hoc est alchechengi. 3. s. helxines seu parietarie, mala-
ue añ. 3. 1. polii montani, adianthi, pulegii, asari añ. 3.
s. sanguinis hircini arefacti & preparati. 3. 1. bdellii,
ammoniaci añ. 3. s. lapidum seu oculorum cancri, cin-
namomi selecti, iunci odorati (squinantū nomināt)
añ. 3. 2. Singula redacta in puluerem minutissimum,
misceantur. Detur de hoc drachma una q̄rto quoq;
die, aut singulis hebdomadis matutino tempore in
uino renui. Alia remedia pete ex cap. 3. Vesicę calcu.

De renum ulceribus.

Cap. XXXII.

VLcera renum accidunt propter uenarum quę
in iis sunt rupturam. Item suppurationem in-
flammationis, & acres ac mordaces humores
huc delatos. Deprehenduntur renes exulcerati do-
lore in lumbis cum grauitate & sine impedimento
urina redditur, id quod in uesicę ulceribus non fit.
Vrinę pus mixtum reperitur, carnosus particulis, aut
pilis innatantibus: iuxta Hippocraticā sententiā, quę
sic habet: Si sanguinem, aut pus mingant, aut renum
aut uesicę exulcerationem significat. Et statim post-
hec: Quibus in urina crassa existente caruncule par-
ue, aut ueluti capilli una exeunt, his a renibus excer-
nuntur. Vitet eger cruditates, & supra quam conue-
nit satietatem. Ne quid crudum in cibo accipiat: &
neq; quod egre concoquitur: aut facile corrumpi-
tur: aut inflationes parit. Maxime tamen uitet quę fa-
cile acescunt. Item omnia acris & feruentia, & q̄cunq;
bilem gignere possunt, ut est longa sitis, inedia: & im-
modica condimenta. Vitanda etiam omnis' delassa-
tio & immodica equitatio: maxime uero quę fit in
equo, uigiliasq; & omnem uehementem concitatio-
nem: & e conuerso perpetuum ocium, & balneorum
assiduitatem. Utatur pane recenti decenter appara-
to. Carnibus uolucrum montanarum: hœdis: & si-
milibus carnem teneram habentibus. Piscibus saxa-
tilibus: squamosis, in craticula assis. Cacer fluuialis

Causa.

Signa.

4. Pph. 79

“

“

“

“

Vicius.

N ii mirifi

s. Aph.
90.

Curatio

Vomitus.

mīrificē, sorbito ex ptisana amyllum cum lacte coctū confert. Dandum ⁊ lac ouis permixtum, ⁊ iusculum gallinę pingue. Qua etiam sorbilia per se conueniūt, Ex olerib. autem malua, intyba, rumex, portulaca, lactuca: omnia tamen cocta, neq; quicquam crudum (ut diximus) uoret eger. Ex fructibus uua passa non incommoda est, ⁊ nuces pineę ⁊ amygdalę decorticatę tamen, ⁊ probē mundatę, Multus potus, ⁊ meracior uitandus. A frigide etiam potu in totum abstinendum. Frigidum enim ut ait Hippocrates, ulceribus inimicum. Pro potu utatur uino diluto, ac parum adstringēte, aut lac caprinum, aut ouillum, aut amygdalinum bibat. C oitus non solum ulceribus, uerum etiam omnib. aliis renum passio nibus infensissimus est, ⁊ maximē senib. ⁊ natura imbecillioribus. Vrinam cientia uitet. Balnei sit rarus usus. Naturales uero aquas experiri non inutile fuerit. aluminosas uidelicet, sulphurulentas, ⁊ consimiles. Frigida lauare commodissimum est: suprā modum enim ulcerationes egre sanabiles, tū externas, tum internas destruit. Conferent etiam naturales aquę, post matutinā deambulationem potatę. Curandi ratio, si ob acres humores accidant renū ulcera, ab humorum uitiosorum ac erodentium purgatione auspicietur. Qui autem sic afficiuntur, eos uomitu etiā uacuare oportet. Non solum uero ad uitiosos humores uacuandos confert uomitus, uerum etiam si quis omni mense audacter uomuerit, is renū ulcus ⁊ quicquid inde mali accidere potest, dissoluet quod, humorum motum planē in contrariū auertat. Sūt etiam interea deuoranda quę morsus obtundūt, ut malua, intybum, rumex, portulaca, semina melonū, cucumeris, cucurbitę, syrupi uiolaceus, rosaceus, nymphę, ⁊ corundem conseruę hodie nominatę. Vacuatis humoribus, aqua mulsa bibenda, aut fœni gręci decoctū cū melle, aut cucumeris, aut maluę, aut melo.

melonum semen cum hydromelite. lac etiam cum melle præbendum, recens mulctum et calidum, ad ulcera enim purganda conducit. Serum item caprinum, decoctum hordei et uuarum passarum, et glycyrrhiæ, quæ mirifice confert, perinde atque eius succus. Quum uero munda fuerint ulcera (quod inde tibi palam fiet, si neque testorium etiam ulceri obductum cum urinis excretum appareat, neque etiam pus excretum sit fœculentum, sed subalbum, et leue, et equale, et paucum) tunc ea quæ resiccant, adstringunt, et glutinantia medicamenta erunt adhibenda. In quem sanè usum datur bolus armenia, gummi arabicum, tragacantha, amylium, terra Lemnia, et similia. Præter cetera autem is pulvis mirifice conducit, qui est. Terræ Lemniæ, boli armeniæ añ. 3. i. s. tragacanthæ, spodii, hoc est eboris usti añ. 3. i. amyli, nucum pinearum tostarum añ. 3. s. seminum lini, cucumeris repurgati, melonum, singulorum .3. ii. seminis apii. 3. ii. sanguinis draconis. 3. i. Conterantur singula, et redigantur in puluerem tenuissimum, de quo dentur quotidie ieiunio egrotanti. 3. ii. cum lacte recens mulcto. Extrinsecus etiam quæ renes exiccare ac roborare possunt admoveantur emplastra, cerata, et unguenta ex oleis, rosaceo, myrthino, farina hordei, thure, mastiche, rosæ rubeis, et similibus composita, quorum copiam in præcedentibus quibusdam Capitulis habes. Plura est ad institutum facientia dicemus in Cap. de Vesicæ ulceribus.

Glutinantia.
terra.
pulvis.

De Diabete. Cap. XXXIII.

Diabetes diuturna est passio circa renes consistens, multum potum inducens, unà cum hoc quod quicquid bibitur, simul ut et quale assumptum est per urinam redditur. Quidam uero hanc passionem aquam inter cutem ad matulam, Galeno Cap. ultimo Libri de Symptomatum differentia recte, et urine fluorem seu leuitatem, atque ab inextinguibili siti dip-

Diabetes
quid.

N iii sacon

Causa.**Signa.****Curatio****Vitis.**

sacon uocant. Origo ipsius ex retentricis renum facultatis imbecillitate contrahitur attractricis uero tanto robore, ut totum corpus ob immodicum calorem exhauriat. Renum itaq; propria passio diabetes existit, qua uidelicet immodicè humorem appetunt, ipsumq; propter debilitatem retentricis in eis facultatis continere non possunt, sed eum aceruatim in uesicam excernunt. Concomitatur egros pertinax sitis, neque ulla satietas ex alicuius liquoris exhibitione contingit: adeoq; assidue potum assumere coguntur, propterea quod citissime per urinam expellatur potatum. Viscera ipsis uri uidentur, uniuersum habitum gracilem habent, et tabes totius corporis accedit. Scopus curationis in eo consistit, ut humorum acredinem deleamus, sanguinemq; ac cum eo permixtum serosum humorem ad motum tardiores redamus, et renum intemperiem corrigamus. Mox itaq; ubi coeperit malum, nodum ad perfectionem progressum, optimum est cubiti uenam seccare, et moderate sanguinem auferre. Utendum etiam mediocriter urinam cientibus, quæ uitiatum in renes imbibitum humorem repurgare possunt. Quod si uero inueteratum sit malum, neque uenæ sectio assumatur, neque quicquam quod urinam cit exhibeatur. Hæc enim corporis tabem et colliquationem, quæ sponte sua in hoc malo fit, accelerant. Concidunt enim in inueteratis uires, et ex uenæ sectione totum corpus acrius redditur, et urinam cientia in ipsis multiplicat malum. Maximum autem remedium huic passioni, ut statim potatum reuomatur. Sit autem perquam frigidus ipse potus reliquaq; uictus ratione conuenit uri frigidior. Cibi itaq; exhibeantur boni succi, quiq; difficulter commutari possunt, et mordacitate careant, et qui mordacitatem obtundere ualeant ut sunt oua sorbilia, halica ad sorbitionis formam, apparatus,

apparata, carnes porcine macre coctæ. Neq; uero in commodè exhibetur eis caseus recens compactus, salis expers, et lac per filices aut ferrum ignitum scissum, ieroso humore adempto. Pro sorbitione etiam ptisanæ succus frigidus probatur. Ex oleribus autem intybum, lactuca, portulaca. Ex fructibus, pira, poma mala punica. Inter pisces, saxatiles conueniunt. Bibat uinum rufum, crassum, aqua amplius dilutū, ad saluginosorum humorum prolutionem, qui sitim inducunt. Vinum enim corporis temperaturam ad dulcorem permutat. Conuenit etiam in potu, ex libere succum malorum granatorum, rob de ribes, aut oxyacantha, et similia. Quod ad medicamenta ipsa attinet, polygoni seu sanguinarie succus rectè ipsis ex uino nigro propinatur. Symphytum item, palmularumq; et baccatum myrti, pirorumq; decoctū. Sirupi, rosaceus, myrthinus, et similes. Pastilli quoq; de spodio hodie nominati, ex succo polygoni, aut uino nigro præbendi. Extrinsecus hypochondriis lumbis, et pectini illitiones, cataplasmata, et cerata refrigerantia adhibenda, qualia sunt quæ ex aceto rosaceo, polenta, lactuca, lenticula palustri, paritaria, foliis uitis, portulaca, et similibus apparatur. In huc usum proderit inunctio ex oleis rosaceo et myrthino, aut illitio ex succo solani, aut pampinorum uitis facta. Farina etiam hordei, aceto et rosaceo subacta, cataplasmatibus modo hypochondriis imponenda. Aut ut edum hoc emplastro, quod ʒ. Farinæ hordeaceæ. ʒ. s. pampinorum uitis, extremitatum salicū, burse pastoris an. p. i. corticum granatorū. ʒ. ii. s. portulacæ. M. i. seminum cotoneorum. ʒ. i. rosarum rub. M. i. s. Buliant singula in aqua, donec ad mellis crassitudinem perueniant: deinde addantur olei rosacei. ʒ. ii. olei myrthini. ʒ. i. et denuo buliant, et fiat emplastrum. Ex prædictis potest fieri ceratū, adiectis hypiocisthede, acatia, bolo armenia, resina et cera. Ceterum

Empla-
strum.

N iiii run

Sudores rum sudores quoque excitandi erunt, ut nimirum
ut excludi uitiosi humores ad exudationem uertantur. Optima
di. uero est in dolio facta ex herbis aut alijs rebus cali-
dis euaporatio ad sudandum, eo modo, ut caput ex-
tra dolium promineat. Vel uas aqua calida plenum
pedibus egrotantis in lectulo decumbētis admovea-
tur, et sudor eliciatur.

De uesicæ calculo. Cap. XXXIII.

Pueri lapsi
de uesicæ
magis la-
borant,

Causæ.

Signa.

Curatio.

Medica-
menta lapi-
des atterē
ita.

Generatur in uesica lapides pueris frequentius
quàm etate prouectis. Voraces enim sunt pue-
ri, et perpetui motus, et cibus utcumq; oblati et
nociuis utuntur, et neque horam cibum capiendi ser-
uant ordinatam: quinetiam priusquam prior assum-
ptus cibus concoquatur, alium ingerunt: et quum
uehementius à cibo moueantur, crudus et incoctus
in uenas cibus distribuatur. Mollia autem sunt ipso-
rum corpora, et quæ facile cedant eiusq; rei gratia ob-
turationem circa renes non perferunt. Quum autē
crassissima lotia in uesicæ amplitudinem perferantur,
ibidem uelut fex et limus aquæ subsistunt, ac postea
ex loci caliditate desiccata lapidescunt. Cæterum a-
quæ impuræ, et multo limo refertæ, itemq; duriores et
uehementer frigide, lapidum generationem adiuu-
ant. Pruriunt laborantes crebro, et contrectant pu-
denda, intenduntq; et continuò ad mingēdum urgē-
tur, ac stillicidio urinæ uexantur.

Curatio huius mali eadem ferè est, quæ renū, cum
calculo afficiuntur. In hoc tamen diuersa, quòd uali-
diora medicamenta exigant uesicæ calculi: et quòd
uesicæ adhibenda sunt, quæ tum renibus admovebā-
tur. Lapidēs autem in uesica oborti, iis potissimum
medicamentis atteruntur: semine fœniculi, smyrnii,
granis pœoniæ nigris, radice fœniculi, artemisia, cha-
memelo, althææ radice et semine, sio quod circa a-
quas nascitur, adiantho, rumicis radice, lapidib. spō-
giatum

giarum, techolito, lithospermo, lapide qui ab egris per lotium electus est trito et potato, semine xanthii, cortice capparis, abrotani semine, hyacinthi, et similibus, quæ in Cap. de Calculo renum sunt commemorata. His accedit laudatissimum remedium, passer troglodytes, qui minimus passerculus est, iuxta sepes et muros uictum queritans, ut Paulus et Aëtius tradunt, caudam semper subrectam et albo colore retro interpunctam habens, et iuxta summum alæ lineamentum cinerei coloris. Hic, inquam, totus sale conditus, et crudus in cibo acceptus, morbum perfecte sanat. Calculos enim iam creatos per urinam expellit, in posterumque generari prohibet. Sanguis denique hircinus ad calculos cum renum, tum uesicæ præsens remedium est. Nam præexistentes soluit, atque ita per lotium excernit, ut etiam alii amplius non gignantur, præterea et dolorem sedat. Quomodo autem is sanguis colligendus sit, docet Aëtius Libro undecimo Capite duodecimo. Porro si uesicæ lapides per lotium excerni non queant, sed in meatu sint obturati, et urinae suppressionem inducant: egrum supinum decumbere oportet, ita ut coxarum partes magis sursum uergant, indeque huc atque illuc multiformiter commouere, quo ex meatu excidet lapis: post uero ita adhuc supinum et positum sursum uergentem mingere iubere. Si uero neque sic excernere possit, per catheterum instrumentum urinam prolektare. Deinde ea quæ lapidem in uesica atterere ualent medicamenta adhibenda. Quod si neque per hæc curatio procedat, ad sectionem transeundum erit. Post exitum lapidem uictus ratio constituenda est, ne eos renasci contingat, quam in Capite de Calculo renum memorauimus.

De san-

De sanguinis ex uesica eruptione, & grumis
eiusdem. Cap XXXV.

Signa.

Curatio
eruptio-
nis san-
guinis.Grumos
sanguinis
dissoluen-
tia.

Rumpitur interdū uena in uesica: & partim qui
de sanguine foras mittit, partim uero intus co-
densatur. Sanguine autem condensato, & gru-
mis coactis, eger animo inquit, & pallefcit, pulsusq;
paruos obseuros, & densos habet, in amore angitur, re-
frigeratur, ac uiribus destituitur. Quum uero gru-
mus aliquando in urinarium meatum inciderit, is e-
tiam urine excretionem supprimit. Porro sangui-
nis eruptioni celerrimè auxilium ferre oportet. Qua
propter si nihil prohibeat, uenam in cubito ficare,
partita sanguinis detractioe conuenit, ut hac ratio-
ne sepe & paulatim sanguis detractus reuellatur. Ae-
gri uero in decumbendo sursum uersus collocentur,
& coxendicibus ipsorum leuandis & simul refrigeran-
dis spongię polca imbutę subdantur. Extremitates etiam
partes constringendę, & pectus ex spongiis polca im-
butis irrigandus. Virgente malo summe profunt cu-
curbitule iliis ac lumbis affixę. Utendum post irriga-
tiones cataplasmatibus ex polygono, rubo, plantagine,
balaustis. Item cerata ex hypocisthide, acatia, bolo
armenia, & similibus, in Capitib. de Sanguinis sputo
& Dysenteria commemoratis. Vesicę etiam infunden-
dus polygoni, plantaginis, aut millefolii succus, ad-
iectis acatia, bolo armenia, pastillis de spodio, & si-
milibus. Inseffus etiam ex consimili materia con-
structi conueniunt. Danda quoq; in potu medi-
camenta educationi sanguinis apta, ut sunt pæonie
grana rubra duodecim tenuissimè trita, terra Lem-
nia, hippuris, centaurii magni (rha ponticum ho-
die uocant) radix, thuris cortex, & similia.

Porro quibus sanguis in uesica in grumos cogitur,
primum tentandum est ut per medicamenta con-
uenientia diffundatur ac dissoluatur. In potu itaq;
regenda.

præbenda est attemisa, elychrisum (sticada citrinam nominant) absinthium, abrotanum, ramenta uitis, raphani semen, leporis coagulum aut hœdi, unumquodq; cum oxymelite. Oxymeli etiam per se exhibitum, mirificè prodest. grumos enim dissolvit, ut paulatim subinde per urinam prodeant. Extrinsecus etiâ balnea, unguenta, irrigationes, et alia quæ relaxandi uim obtinent adhibenda, quæ sanè singula, ex Capite de Renum calculo petenda sunt. Præter alia uero hoc ceratum confert, quod ꝑ. Oleorum liliorum alborum, chamemelini añ. ʒ. i. s. calaminthæ, cumini, foliorum sambuci añ. ʒ. iii. bituminis iudaici, ammoniaci. añ. ʒ. ii. coaguli leporis. ʒ. iii. abrotani, farinæ seminis fœnigræci añ. ʒ. s. ambari subalbidi (sperma cœti uocât). ʒ. i. cum resina et cera quod satis est, fiat, ceratū quod pectini imponatur. Quod si modo nihil proficias, sed urina supprimatur, necessitatē inducet catheteris adhibendi. Per quem ubi urinas eduxerimus, rursus prædicta in potu exhibenda, ac extrinsecus admouenda quæ ad grumorū dissolutionē conducunt. Si uero neque sic grumi dissoluantur, ad sectionem haud secus quam in uesica calculo laborante ueniendum.

Ceratum.

De inflammatione uesicæ. Cap. XXXVI.

Morborum qui circa uesicam oboriuntur grauissimus et maximè mortalis inflammatio existit. Consequuntur egros hæc signa. Febri acuta infestatur, et uigilant, et delirantes aliena loquuntur, et uomunt biliosa pura, et urinam reddere non possunt. Durus fit pectus et pubes cum uehementi dolore, et egerendi apertentia, ueluti in tenesmo fieri solet. Quod uero egeritur, tenue est, et subsidentiā non habet. Aliquando et inflationes sequuntur, et alius adstricta est, intestino recto ab inflammatione uesicæ compresso. His itaque si nihil aliud

Signa.

Curatio

visus. aliud prohibeat, sanguis citra cunctationes ex popli-
tis uena detrahendus. **Visus** quoq; ratio, quæ in
aliis inflammationibus ac febribus conuenit, adhi-
bendus. Extrinsecus iis utendum, quibus leniendi po-
testas inest. Oleo itaq; uesicæ regio, in quo anethuz,
Quæ ex- semen lini, aliquando etiam ruta & althea incocta
trinsecus sint, irriganda. Neq; enim frigida & reprimentia me-
adhibenda. dicamenta sunt adhibenda. Primum quidem, quod
uesica nervosa admodum sit. Frigidum enim, ut Hip-
APh. 18 pocrat. ait, inimicum neruis. Dein, quod frigida oc-
cludant ac stringant, atq; adeo urinx suppressiones,
quæ huic malo sua sponte sequitur, augeant. Et quò
ne humores inflammationem efficientes discutiatur
aut maturentur, prohibeant. Calida igitur medio-
criter admouenda potius, quæ quidem dolorem le-
uant, urinx fistulâ & meatû laxant, atq; inflammatio-
Clysteres nem ipsam discutiunt. Clysterib. etiam lenibus al-
uus subluatur, & post stercoreum eductionem, oleû ane-
thinum in intestinuz leniendi doloris gratia inilcia-
tur. Prestat aut & papaueris calicem simul cû oleo in-
coquere, & adipem anserinum aut gallinaceum recē-
Glans. tem in ipso oleo eliquatum simul infundere. In ue-
hementioribus doloribus cum oleo anethino. 3. i. pi-
lularum de cynoglossa infundere oportet: aut opiû
cum myrrha & croco lanę illitum in podicem inde-
re. In decoctum item seminis lini, fœnigræci, radicis
altheę, seminis dauci, & similiuz, infideat eger: admo-
neaturq; quo in aqua decocti desidens mingat. Vesi-
ca enim non satis robusta est ad amplectendam & ex-
pellendam urinam. igitur ipsum egrum aut aliquem
ex adstantibus scitè ac placidè pectinè premere opor-
tet: neq; id ultra modum, ne dolor inde intendatur.
Cæterum post clysteres, & in sessus, fomentis etiam
per aquam calidam & oleum in uescicis semiplenis ad-
motis utendum: aut sacculis, quemadmodû in Capî-
te de Pleuritide ostensum est. Quod si neq; sic ma-
lum

lum cesser, cucurbita una cuius scarificatione locis affigenda. Porro abstinendum ab iis erit, quæ urinæ uehementer citant, ac potio multa uitanda. Vbi euidens declinatio apparuerit, ad ea quib. discutiendi et emolliendi vis inest, de quib. supra sepe dictum est, transeundum. Catheteris immisione ad inflammata uesicam non temere utendum, nisi uris suppressæ periculum admodum urgeat. tum enim necessario ad eius usum confugiendum: non sanè quod mali molestiam tollat, sed ut urgentem urinæ suppressionem corrigat, et a precipiti periculo liberet. Post urinæ prolestationem, rursus ad eadem auxilia quæ mitigant dolorem ueniendum, usque quo inflammatio soluitur aut suppuretur. Solet autem sepe repente inflammatio solui, erysipelate iuxta cutis superficiem oborto, et permanente, neque rursus intrò recurrente. Imò et urina multa effusa, sepe iudicatum est malum. Quod si hæc appeant, nihilominus tamè iisdem remediis insistere oportet.

De stillicidio urinæ.

Cap. XXXVII.

Σταγγοῦσι α græcè, stillicidium urinæ latinè dicitur: et est, quum paulatim et guttatim urina destillat, ac assiduam ad mingendum irritationem facit. Hæc fit, aut ob acrimoniā, uel (ut hodie loquuntur) ardorem urinæ, aut ob exulcerationem uesicæ. Acrimoniā esse causam iudicabis, si urinæ biliosiores sint, totumque corporis habitus, uel et reliqua signa bilem testantur, et mordacitas circa uesicam pertingat. Vesicæ autem exulcerationem ex iis quæ suo dicentur loco deprehendes. Si itaque ob acrimoniā urinæ stillicidium accidat, tum sanè exuperantem uitio suum humorem quam celerrime purgare oportet. In quem usum præter ea quæ iam sepe dicta sunt, mirifice confert serum lactis caprini cum casia fistulari. Cibis et contemperantibus, et acrimoniam obtundentibus utendum: ut est ptisanæ cremor, malua, portulaca, uiola, et huiusmodi.

Σταγγοῦσι α.

Causa.
Signa.

Curatio

Ecligma.

Pulvis.

Clysteres

modi. Ab omnibus etiam acribus et falsis abstinendum: uino: exercitiis, ira, et tarda comestioe. hec enim omnia bilem in corpore aceruant. Piscibus. utendum laxatilibus. et balneo aquae dulcis, quod mirifice humores uitiosos comtemperare potest. In potu plurima aqua calida dulcis exhibenda, aut hordei decoctum cum syrupis uiolaceo et rosaceo. Vinum non prebendum, nisi dulcius: et dilutum. Optimum est et ipsum lac calidum potatum. In summa, quod ad uictus rationem attinet, utendum cibis humectantibus. ac aluum emollientibus iusculis. Ceterum eger assidue ad mictionem cogendus. Si enim acre recrementum diutius in uescamoretur, partes ipsas corrodit, et exulcerat. Quinet ad obtundendam humorum acrimoniam subsequens medicamentum porrigendum, quod est. Conserue uiolaceae. 3. iij. maluae. 3. 2. seminum melonum: cucumeris: cucurbitae excorticatarum an. 3. 1. gummi arabici nominati. 3. 2. cum syrupo de liquiritia, fiat ecligma. In hunc etiam usum prebendum decoctum dulcis radicis, aut iste pulvis, qui est. Seminis melonis excorticati, citrulli, cucumeris an. 3. iij. seminum cucurbitae, portulacae, lactucae, an. 3. 2. rosarum rub. 3. 1. succi dulcis, radicis, glandium an. 3. 1. s. Terantur singula: et fiat pulvis subtilissimus. de quo. 3. 1. s. quotidie mane in syrupo de dulci radice, aut zupapio uiolaceo, aut rosaceo dentur. Supra modum etiam conducit terebinthina resina, lota in aqua stillaticia rosarum, aut in tybi, nucis ponticae magnitudine, aliquando duarum trium uel accepta. Hec enim Galeno lib. 5. de Tuend. ual. teste, non solum aluum citra noxam soluere, atque adeo acres humores a meatibus urinariis auertere potuerunt etiam uiscera, renes potissimum abstergere. Et fuerunt, qui solo huius usu curati sunt. Clysteres etiam non parum prodesse constat ex decocto maluae, uiolarum, althaeae, foliorum salicis, nymphaeae, et aliis supra commemoratis apparati, adiecta casia fistulari, saccharo et

ro & oleo uiolaceo. Quod si uero acrimonia adhuc augeatur et per colem lac ipsum cum amylo in uesteam iniiciendum. In eum et usum decoctum papaueris albi iniicere oportet. Extrinsecus pubes oleis uiolaceo nymphaeae cum modico caphure inungendus. Si autem stillicidium urinae ob uesicae exulcerationem acciderit curatio ex proprio Capite petenda erit,

De difficultate urinae. Cap. XXXVIII.

ΔΥΣΟΥΡΙΑ & Graecis, difficultas urinae Latinis appellatur. Est malum, in quo urina egrè & difficulter excernitur. Fit ob uesicae imbecillitatem, atque adeo frigidam eiusdem intemperie, quae actione illius laedit. Causa facile ex uictus ratione praecedente, & ex egri sermonibus deprehenditur. Urina item alba, & aliis quae frigidam intemperie ostendere iam saepe diximus. Curatio per ea quae calefaciunt fieri solet. Pectinem itaque oleis calidis, rutaceo nimirum, anethino, siliaceo, scorpionum, & de castoreo fouere oportet. Admouenda etiam fomenta, & sacculi ex chamaemelo, abrotono: betonica: artemisia, ruta, calaminta, sabina & similib. herbis confecti. Aegrum etiam oportet in praedictarum herbarum decoctum desidere, ac inum uentrem contegere ac calefacere. Interdum etiam proderit per sedem earundem herbarum decoctum, adiectis oleis calidis infundere. Cibis praeterea utendum calefacientibus, & urinam ducentibus: uelut est pastinaca probè cocta, foeniculum, apium, asparagus, hipposelinum, & quicunque eius generis existunt. Urinam etiam commodè ciēt cancri, & herinacei terreni. Carnem enim illorum exiccare oportet: & drachmae pondus in potu accipere. Aromaticum denique decocta in potu exhibenda, aut eorundem confectioes dandae. Praeter alias uero summe conferunt, confectio diacalaminthae, dialaccae, & diacurcumae. Theriaca etiam in potu

Disuria.

Causa.

Curatio.

potu data, mirificè confert. Multa alia in hunc usuz
facientia ex superioribus Capitib. petenda erunt.

De suppressione urine. Cap. XXXIX.

Ischuria.

Causa.

Signa.

Iσχουρία, hoc est urine suppressio, maluz est in quo
egris in totum urina supprimitur & cohibetur.
Hec aliquando accidit ob imbecillitatem, uesica
ea quę in ipsa continentur arctè complecti ac expri
mere non potente. Interdum autē eius ceruicis mea
tu à crassis humoribus, aut lapide obturato. Qñq;
uero propter inflammationem, aut scirrhum, aut aliū
quempiam tumorem meatum angustum reddentem,
& perfecte obturantē. Interdum etiam ob caruncu
lam, aut callum in meatu natum. Sanguis etiam in
grumos cōcretus in uesica, suppressę urine causa exi
st. Pus item crassum per ipsam uesicam à renib. aut
iocinore, aut alia quapiam superiore parte excretuz,
urine suppressionem efficit. Accidit & sanis sepe uri
nam ipsorum cohiberi, aut ob negotioruz importu
nitatez, aut in concionibus, aut foro iudiciario, aut
somnia, si diutius continuerint mictionez. Afficitur
enim in iis cōprehensua & urinam obuoluens uesi
cę uis, ex immodica uidelicet repletione & tensione.
Imò quantum amplitudo ipsius uesicę expleta circū
tenditur, tanto angustior seipso fit meatus. Si pro
pter imbecillitatem fit, ex iis quę frigidam intēperiez
mōstrant deprehēditur. Si à crassis humo rib. ex ui
ctus ratione, quę precessi t. in ocio enim educatus,
multis cibis crassos uiscososq; humores generare
potentibus usus est. Si à lapide, eius notę, quę suprā
dictę sunt, precesserunt. Si ab inflammatioe, aut alio
tumore: dolore: febre: ac uisu facile dignoscitur.
Qđ si ob carunculam aliquaz aut callum suppressio
urine orta fuerit, ex precentib. ulceris notis, & ex
eo quod traiecto cathetere urina uacuatur, intellige
re possumus. Immissus etiam catheter in ea parte ubi
antea

antea ulcus esse coniciebatur, dolorem mouet: fracta sub cathetere carne, sequuntur cum urine excretionē & cruor & carnis fragmenta. Si gumi obturationem fecerint, sanguinis præcedit excretio, & effluxus. Vbi uero pus obstruxit, ex præcedentium notitia sciri licebit. Nam uel uesica uel renes antea malo aliquo laborauerunt, aut in parte aliqua renibus superiore præcessit abscessus: quo rupto: pus in renes, & subinde in uesicam transsumptus est. Reliqua causa de sermonibus egrotantis cognoscetur. Curandi ratio iuxta causarum diuersitatem alia atq; alia erit. Si enim propter imbecillitatem, & egrum neficæ sensum urine suppressio contigit, irritando submouere, ac excitare eius actionem oportet, & per insensum: fomenta: & alia quæ in Cap. de Difficultate urine dicta sunt, auxiliari. Vitanda tamen sunt ea quæ urinam ducunt: ne scilicet multitudine eius uesica distendatur. Aeger præterea sic figurandus: ut decliuis sit ceruicis uesicæ positus: ac subinde manibus supra pubem admotis, urina sensim, comprimendo tumorem, expellenda. Nitro etiam: aut pediculo uiuo, aut alio quod excretoriam actionem uesicæ irritare potest admoto, citius urina procedet. Si uero a crassis humoribus urine retentio oriatur, fomentis, insessionibus, ac cataplasmatibus ex herbis calidis compositis inchoanda. Hæc enim crassos humores dissoluere, ac incidere possunt. Præter ea quæ in cap. de Difficultate urine commemorata sunt, ualet hoc unguentum, qd̄ R. Oleum scorpionis, nardini: liliacei añ. 3. iii. sagapeni, bdellii: opopanacis añ. 3. i. pinguedinis anseris anatis añ. 3. s. radicis helenii, pulegii, calaminthæ añ. 3. 2. gummi dissoluantur in uino, & cū cera quod satis est, fiat unguentum. Vesicæ etiam iniiciendum oleum scorpionis: aut liliacens, aut aliud qd̄ crassos humores dissoluere potest. Quod si uero propter inflammationem, aut alium tumorem urina supprimatur,

Curatio

Si ȝ pter
imbecillita
tem.Si ob cras
sos humo
res.Si ob inflā
matronem,
aut alium
tumorem.

cura

curatio ex propriis Capi. petenda. Itidem faciendū,
 Si ob lapi si a lapide aut grumis urina suppressa fuerit. Lapis si
 des aut sa quidem ex loco excutiendus ⁊ dimouendus quē ad
 guinis grū modum Cap. 34. est prædictū. Sanguinis uero grū
 mos. dissoluendi eo modo. sicut Cap. 35. dictum est. Qd
 Si ob car si ob carunculam aut callum suppressa fuerit urina
 runculam balnea ⁊ alia remedia relaxantia, ac urinariam fistu-
 aut callū. lam dilatantia sunt adhibenda, de quib. in Capi. de
 Si ob ne- Calculo renum abunde diximus. In sanis autē qui
 goiorum ob negotiorum importunitatem urina diutius retē
 importu- ta uesicam debilem reddat, auxiliari oportet ipsi, ma-
 nitatem. nibus supra pubem admotis, ac urina sensim expres-
 sa; ueluti in Curatione suppressionis urinæ ex im-
 becillitate uesicę factę, fusius ostensum est.

De ulceribus uesicę, ⁊ eius ceruicis, Cap. XL.

Cause.

Signa.

EXulceratur uesica aut propter abscessum, aut ob
 tuberculum quod præcessit, aut ex ruptura, aut
 ob fluxionis erosionem, aut aliam similem cau-
 sam. Aegros dolor acutus uesicę omni quidem tē-
 pore comitatur, maximē uero tempore mictionis, ⁊
 excretionis puris. Et si quidem sordida fuerint ulce-
 ra, fœculenta simul excernuntur, ⁊ mucosa, ⁊ q̄ cras-
 sam subsidentiam ad modum farinę habent. Aliquā-
 do autem pelliculę tenues ad modum foliorum ⁊ la-
 narum cum urina excernuntur. Si uero serpendo de-
 pascant ulcera, subcruenta excernuntur, ⁊ saniosa,
 ac foetentia. Ad hæc accedunt difficultas emittendę
 urine, ⁊ pudendi arrestio, ac petulantia. Dolor autē
 non solum cum urinę meatus fuerit exulceratus, s;
 ⁊ quum in profundo exulceratio consistit. Cogno-
 scetur autem num in profundo, siue iuxta urinę fi-
 stulam sit exulceratio, ex eo, quod si in amplitudi-
 ne uesicę fuerit, dolor circa pubem consequatur. Si
 uero iuxta ceruicem uesicę ulcera existant, tempore
 mictionis tantū, ⁊ maxime ubi mingere incœperint
 ac ces-

ce cessauerint, dolor sentitur: atq; id amplius con-
tingit, si urinae sint acriores. Insanabilia uero, aut sal-
tem curatu difficillima sunt uesicę ulcera: tum quia
ipsa neruosa est: tum etiam quia ulcera eius urina, q̄
acris est natura, assidue cōtingit, eroditq; nec ut glu-
tinentur permittit. Verum quū sepe etiam pręter ex-
pectationem quędā eueniant, cura aggredienda est,
per quam si nihil aliud, certe accessorii dolores mi-
nuentur. Primum igitur persuadendū est egro ut de-
cumbat, et in lecto quietem toleret: idq; maxime, si
febres simul adsint. Deinde remedia febribus inter-
mittētib; adhibenda. Maximū uero hic fuerit lactis
potus, neq; post ullum aliud remedium secundo lo-
co id habendum. nam et asperitates lenit, et ulceratio-
nes eluit, malumq; abstergit. Reliqua uero uictus ra-
tio talis sit, qualis ea est quę in renum exulceratio-
ne adhibetur. Per medicamenta etiam egrum conso-
lari oportet, quę pubi imponuntur. Etsi quidem cū
inflammatione exulceratio consistat, cataplasmata
ex lini semine et fœnogręco, aliaq; quę suprā in Ca-
pi. de Vesicę inflammatione dicta sunt, apta erunt.
Porrō si exulceratio pascendo serpat, subadstringē-
tia extrinsecus apponenda sunt: atq; hęc quide; cali-
da, ut ob calorem quidem partes circūdolitantes le-
niendo iuuent, ob potestatem autem ipsorum uici-
nos locos depascere prohibeant. Utendum etiam iis
quę p catheterem infunduntur medicamentis. Infun-
dendum itaq; inflāmatis locis lac recens mulctum,
aut rosaceū optimuz tepesactū. Si uero nihil horum
adsit, aq̄ dulcissima tepida assidue infundenda, mor-
dacitatis tempore instante. Per sedem quoq; ptisanę
succus, aut decoctū ex semine lini cucumeris decor-
ticati, fœnigręci, malua, aut lac cū rosaceo infundē-
duz. Frequenter aut et in aquā calidā desideat eger, et
in decocta relaxantia: nā hęc dolores mitigant. Atq;
ubi ulcera iaz pascendo serpunt, p cathetere; in uesi-

Insanabi-
lia aut sal-
tem diffi-
cillima cu-
ratu cur-
uesicae uis-
cera.

Curatio.

Lactis po-
tus.

O ii cam

cam iniicienda sunt, quę depassionem sistere possunt: ut sunt acacia, hypocisthis, alumen, malicoriū, gallę, terra lemnia, bolus armenia, et similia. Quod si uero sordida sint ulcera, medicamenta infundenda sunt, quę repugnādi et abstergendi facultatē obtinent: uelut ē mulla dilutissima, uel lac cū paululo mellis, uel cū cucumeris semine decorticato. Si uero acrimonia cōsequatur et mordacitas, lac recēs mulctū cum optimo amylo infundatur, aut pompholyx: hoc est thurtia, plurib. aquis elota et exiccata, atq; deinde cū lacte diluta. Quū uero repurgata fuerint ulcera, adiuuare oportet quo ad cicatricem perducantur, atq; id per inessus adstringētes, et eiusdem facultatis emplastra, fomenta, et irrigationes. Ceterū si ad multum tempus exulceratio duret, tunc sanē et exacerbationes et interualla siue remissiones egros apprehēdūt. Quapropter in exacerbationib. quidē cataplasmata, fomenta, et irrigationes, leniēdi uim habentia adhibeantur. Remissionis uero tempore iis quę malum destruere possunt utendum. Pectini itaq; rubefacientia ac sinapimi imponantur, ac uictus ratione uirib. reparādis apta utēdum. Quod si non māsuescat malum, crustas circa pubē infligere oportet, aut per medicamenta aut per ferrū, si nēq; ut per multum tempus ulcera se per effluxionē repurgent. Non ineptē uerō medicamenta dolorē leuantia in potu exhibueris, si uehementes insint dolores. In hunc sanē usū cōueniunt pastilli de halicacabo, seu trochisci de alchichengi hodie nominati, cum opio. In uesicā quoq; iniicienda, quę dolores mitigare possunt.

De his qui re uenerē uti non possunt. Cap. XLI.

Qui mariti existūt, at re uenerē uti cupiūt et debent, igna autem et impotētia membra ab frigida eorūde intēperiē, aut aliud malū habēt, infernas partes exerceāt, et cibis utātur calefaciētib. et bonum

et bonum succum generantib. carnib. gallinarum, caponū, perdicum, phasianorum, iuuentū columborū, auicularum montanarū, passerū potiss. testiculis gallinorum, et similib. Edulia uero non solū bene nutritia, sed etiā flatuosa ipsis conueniunt: ueluti cicer, fabę alica, bulbi, porri, pastinacę radix et semē, nuces pineę amygdalę dulces, et similia. Oua item perdicis ad coitū excitant. Dormiant in mollib. lectis, legantq; quę ad coitū cohortantur, lectionib. itē assideāt. Naturalia cōtinuo ex oleis, unguentis, aliisq; calefacientib. medicamentis cōfricent. In quē usum hoc unguento uti licebit, quod ʒ. Oleorū liliorum alborū. ʒ. i. s. de castoreo. ʒ. s. piperis nigellę, pyrethri añ. ʒ. i. myrrhę. ʒ. s. euphorbi gr. iiii. cerę quod satis est, fiat unguentū. Medicamentis etiā quę seminis multitudinē augere, et calefacere possunt, utātur, qualia inter simplicia sunt eruca, sinapi, nasturtium hortense, semen rapī, urticę, arī radix, piper, satyrium, orminū, anisū, scylla, orchis: cuius quidem maior bulbus cum lacte potatus, tentiginem cit, minor uero cum aqua potatus, tentiginem remittit. Testes uulpis sicci triti bibiti, innocuā et minime uanam membri tentiginem faciunt. Partes etiā scinci renes amplectētes ad tentiginē pudēdorū excitandā bibuntur. Pudendū cerui arī dum urito, et ʒ. i. cum uino meraciore præbe. Inter cōposita isto uti licebit, quod ʒ. Confectionū diathospliri sarcoticon, diagalāgę añ. ʒ. iiii. diasatyriōn. ʒ. vi. nucum pinearum, amygdalarū dulcium, pistaceorū añ. ʒ. ii. lathyri. ʒ. i. radicis arī. ʒ. i. seminum erucę urticę, nasturtii hortensis añ. ʒ. i. s. caudę scinci. ʒ. s. nucis Indicę. ʒ. i. piperis lōgi, zingiberis añ. ʒ. i. s. scobis pudēdi ceruini. ʒ. i. cū saccharo, et syrupo de menta quod satis est, fiat ecligma de quo ante cōnam, aut ieiunis, per se, aut cum uino detur drachma una, aut duę.

O iii De seml

Vnguentum.

Simplicia medicamentorum condantia.

Ecligma

Γογορ

γοια.

Causa.

I *Γογορ* Græcè seminis profluvium Latine dicitur. Et est excretio seminis præter voluntatem, citra pudendi tentiginem. Fit ob retentricis in uasis seminariis facultatis imbecillitatē, aut ob aliud malum, quod seminariū uasorum partes eodem modo, quo expultrix secundum naturam facultas mouet: ueluti in comitialib. & aliis uiolentioribus cōuulsionib. contingit. Oboritur autem aliquando etiam ex seminariū uasorum fluxione. Semen quod profluit, aquosum, tenue, citra appetentiam coeundi, & ut plurimū quidem citra sensum, quandoq; uero cum uoluptate quadam promanans. Corrumptur sic patientib. sensim uniuersum corpus, ac gracilescit, præsertim circa lumbos. Consequitur & debilitas multa. Et si pudendo nō intento euenerit, retentricis in seminariis uasis imbecillitatem sequitur. Si uero intento pudendo contigerit, cōuulsioni quodammodo similis erit affectus. Non solum uiris, sed & mulierib. accidit, & in foeminis sanè ægrè tollitur. Cura communis est cum ea quæ in omni fluxione adhibetur. Primū igitur in q̄te, paucō cibo, ac aquæ potu egros adseruare oportet. Deinde etiā lumbos & pubē cōregere lanis rosaceo, aut melino madefactis. Neque uero ineptę sunt spōgię posca imbutę. Sequētib. uero dieb. cataplasmatib., emplastris, & unguentis ex palmis, cotoneis, acacia, hypocisthide, rhoē, & similib. suprā sæpe cōmemoratis, utendū est. In fessib. quoq; adstringentib. ex rubi, plantaginis, myrthi, & similiū decocto, uel etiam aquis. Cibis aut utendum qui ægrè corrumpuntur, & difficulter pmutantur & reficcādi uim habent. Dandum etiā cum potu ac cibis, agni seu uiticis ac cānabis semen præsertim tostum, rutę item semen & folia, lactuce semen & caules, ac nymphę (nenuphar hodie appellāt) radix. In potu uero

Curatio.

uero quotidie pro aqua communi, aqua in qua fer-
rū sepe extinctū est prębeatur. Quid multa? Omnē
acrium rerū esum, et multū uini potum, et olerū exhi-
bitionem uitare oportet. Viſtus uero ratio uniuersa
resiccatoria et adstringens constituenda est. Ea et
medicamenta quę semen extinguunt, propinanda:
Deluti est agni seu uiticis semen, tostū et perfrictū.
Folia item eius, et flores, uenerem cohibere credun-
tur, non comesta tantum, sed et in potu sumpta, et sub-
strata. Portulaca comesta, et lactucę semen potatū, et
nymphę radix et semen in cibo accepta, semē refrige-
rando extinguunt. Ruta uero comesta calore suo
semen corrūpit. Calaminthā autē assidue edentes ge-
nerandi potētia priuantur. Ex iis atq; aliis eius fari-
næ medicamētis uaria cōponi possunt remedia, hoc
potissimū, quod R. Specierū diacumini, diacalamin-
thę añ. 3. i. s. seminis agni, rutę añ. 3. i. calaminthę añ.
3. ii. seminis lactucę, portulacę. 3. i. sacchari æquali
oium pōdere, misce, fiat tragea, de qua detur. 3. i. aut
3. i. s. in uino austero diluto. Optimū etiā censetur,
laminā plumbeā lūbis supponere; multū. n. refrigera-
re cōsuevit. In his uero qui plumbi duricię ferre nō
possunt, cōsulere oportet, ut ex p̄dictis herbis quędā
arefactę substernātur. Potissimū uero ad hūc usum
cōferūt uiticis folia, et modica ruta ac calamintha: ma-
xime uero ipsę rosę. Profunt. n. hęc, citra renū læsio-
nē. Vehementes naq; refrigerationes eorū quę lūbis
subdūtur, renes iniuria afficiūt. Ipsū etiā stratū non
ualde molle sit. Decubitus porro ut plurimum in la-
tus fiat, uitata forma decubitus supina, ne lumborū
arterię in de calefiant. Post prima autē morbi tempora
exercitiis egrum committere oportet, quib. totū cor-
pus, et p̄sertim partes patientes cōfirmētur. Bonū
fuerit etiā, si nihil phibuerit, ad frigidā lauatiōē de-
fugere, quę omnē morbū ex fluxione obortū depelle-
re cōsuevit, maximē si medicamentaria qualitate

Semen
extinguit
tia.

Tragea

O iiii aqua

aqua sit prædita. Conuenit item per interualla quædam iis quæ rubefacere, atq; ea quæ in profundo sunt ad superficiem transferre possunt, uti. Ceterum omnem de rebus ueneris cogitationem excludere oportet.

De exulceratione pudendi. Cap. XLIII.

Pulvis.

Naturalium ac pudendorum ulcera citra inflammationem oborta, medicamentis indigent, quæ uehementer resiccant: cuiusmodi sunt ex charta combusta, anetumustum aridum, aloë arida in puluerem redacta, præiens sanè remedium: et pistolochiæ (quæ aristolochia rotunda uocant) radix. Inter composita is pulvis potissimum conuenit, qui R. Aloës. 3. ii. gallæ. 3. i. s. sanguinis draconis, boli armenicæ, pöpholygis, id est, thutiæ añ. 3. i. radice pistolochiæ. 3. s. myrrhæ. 3. i. gummi arabici nominati. 3. ii. aluminis usti. 3. s. misce, fiat pulvis. At si humidiora ac sordidiora ulcera euenerint, primùm dilutiore mulia, mox lacte caprino ulcus abstergendum. Dein puluere iam dicto utendum, aut lapide hæmatite, aut thure, aut malicorio, aut Iemnia terra in puluere redactis utendum. Quod si simul inflammatio affuerit, hæc ipsa primùm remouenda, erit, linteis in aqua stillaticea roiarum, aut solani, aut portulacæ, albo oui adiecto madefactis, et loco patienti admotis.

De ramice. Cap. XLIII.

Ramex.

Eternoccele

Bubonoccele

Hydrocele

KΗΛΗ Græcis, rames et hernia Latinis, rupturæ Barbæ aris scriptoribus dicta, uariis fit modis, et per adiectionem uarias accipit appellationes. Si enim peritongo rupto intestina in scrotum deuoluuntur, ἐντεροκήλη græcè, latinè autem ramex intestinorum dicitur. Quando uero intestina supra in inguinibus hærent, βουβωνοκήλη Græcis, Latinis autem ramex inguinis uocatur. Quod si humor aliquis lentus in scroti parte colligitur, ὕδρωκήλη Græcis, aquosus uel

sus uero ramex Latinis appellatur. Quum autem
 caro dura intra testium tunicas increlcat, σαρκωδης
 ἢ græcè, carnosus uero ramex Latine dicitur.
 Quid multa? nomen semper à rebus opplentibus, ra-
 micis genera accipiunt. Hinc si omentum in scrotum
 descendat, ἐπιπλοκή, id est ramex omenti nuncupa-
 tur. Sic ubi ueng ultra modum repletę glomerantur
 ac dilatantur, κυρσοκήλη, hoc est uaricolus ramex no-
 minatur. Ramices intestinorum & inguinis gene-
 rantur, uel quod peritonęum plus equo extenditur,
 uel quod frangitur. Vtrunq; uero ex uiolenta quæ-
 dam occasione præcedente, nèpe ictu, aut saltu, aut
 clamore, aut ingētis molis sublatione accidit. A quo
 sus uero ramex quandoq; ex occulta, quandoq; ex
 manifesta causa contingit. Ex occulta quidem, quā-
 do adauētis uasis in scroto cōtextis, aquosa materia
 propulsa, & sanguini admixta, ad eas partes decubue-
 rit. Ex manifesta autem causa, quādo propter percus-
 sionē collisis aut fractis uasis, sanguis subinde deflu-
 ens ad aquosam substantiam trāmutatur. Carno-
 sus ramex itidem ex latente causa nascitur, testiculo
 fluxionem expeito, induratoq; aut ex ictu, aut impe-
 rita post ramicis succissionē curatione. Notæ utriq;
 ramici & intestinorū & inguinum communes. Cōspi-
 cuus enim in scroto aut inguine tumor, qui in exer-
 citiis, itinere, spiritus retētiōe, aliisq; occasionibus
 maior quā prius euadit, cōpressus tardē quidem re-
 currit, celeriter autem rursus deuoluitur. Peculiaria
 ramicis ad extensionem relati indicia sunt, quod nō
 uniuersim, sed particulatim tēporis spacio, & ob cau-
 sas quaslibet intestinum deuoluatur, tumor equabi-
 lis & profundus appareat, intestino quod deuolutū
 est peritonęo constricto. Ex ruptura facti ramicis si-
 gnum est proprium, quod uniuersim ab initio intesti-
 norū deuoluatur, idq; ob causas uiolētas dūtaxat:
 tumor immensę magnitudinis, inęqualis, & p summa
 protinus,

Sarcom-
cele

Epiplo-
cele,
Cyrso-
cele

Signa

Ramicis
intestino-
rum & in-
guinum
curatio.

Ceratum.

Victus.

protinus in cute emineat, quod scilicet intestina ex-
tra peritoneum elabantur. Aquosus ramex ita di-
gnoscitur, quod tumor sit dolore uacans, firmus, ac
stabilis in scroto, quacunq; tandē occasione nō eua-
nescens, sed in iis qui modicū continent humorē ce-
dens: in illis qui copiosū habēt, nō item. Et cū aquo-
sus humor extiterit, tumor cōcolor pellucet: quū fœ-
culentus, aut sanguineus, aut rubicundus, aut liui-
dus apparet. Carnosum ramicem color ubiq; sui si-
milis cū duritia cōsequitur. si aut tumor in scirrū
coalescat, nullus nec color nec sensus adest. si mali-
gni referat naturā, dolor urget punctorius. Ceterū
ramicem intestinorum & inguinū curamus hunc in-
modū. Aegro resupinato duduētis cruribus, intesti-
na sensim reducere, ac reducta deinceps idoneis liga-
mentis retinere oportet. si uero reductiōi minus ob-
temperent intestina, emollientia, ac inflāmatiōē do-
loremq; leuantia & flatus dissoluentia fomenta, lini-
menta, balneaq; adhibenda: qualia sunt quę ex mā-
ua, chamemelo, anetho, seminibus lini, fœnigręci, ca-
rei, anisi, cumini & similibus cōponuntur. lana etiam
succida, uino & oleo madefacta, loca dolentia fouen-
da sunt. reductis intestinis, conandū ut intestina ido-
neis ligamentis retineantur. In quem usum cerata &
emplastra sunt adhibenda, potissimū uero hoc, quod
℞. Picis naualis, mastiches añ. 3. iiii. thuris. 3. ii. hypo-
cisthidis, sarcocollę, acacię añ. 3. i. s. lapidis hematitis,
sanguinis draconis, aloës añ. 3. ii. s. boli armenię, sym-
phyti radicis, gallarū, malicorii añ. 3. iiii. uisci querci-
ni. 3. i. s. aristolochię utriusq; 3. ii. rhois, balaustiorū
añ. 3. i. sepi hircini. 3. ii. terebinthine & cere quod sa-
tis est, gūmi antea in aceto aut uino dissolutis, for-
metur ceratū quod in pelle arietis impositū allige-
tur, nec ante septimū aut nonū diem soluatur. Inte-
rea eger in lecto maneat diebus triginta, & à cibis in-
flantibus abstineat, uino copiosiore, uehementi mō-
tu, nem-

tu, nempe cursu, saltu, clamore & id genus aliis: bibatq; decoctum, quod & pedis leonis, saniculæ, herbæ fortis, (quâ consolidâ sarracenicam uocant) eupatorii an. M. i. cynoglossi officinarum, polygoni, clematidis daphnoidis, plantaginis an. M. s. radices symphyti. 3. s. radices symphyti petregi. 3. v. seminis myrthi. 3. iii. balaustiorū. 3. ii. foliorum lauri. 3. i. s. bulliant in uino & aqua iustę quantitatis, quoad tertia pars absumpta fuerit: dein colētur, & cū saccharo fiat potio delectabilis, de qua singulis diebus matutino tēpore dentur. 3. iii. Ceterum maxime etiam annitendum: ne alius indurescat; ne scilicet si nimio conatu stercora excernantur, simul intestina iterū deuoluantur, Utendum quoq; conuenienti, ut antea diximus, deligatura, præcipue si occasio motum præciperet. Porro aquolus ramex per ea quę calefaciunt & exiccāt medicamēta curandus, ut est farina fabarū, bacce lauri, semen lini, dauci, altheę: & id genus alia, de quibus Cap. de Ascite, & reliquis aquę inter cutē generibus abunde dictum est. Chirurgicam prædictarum, omniumq; aliarum ramicum specierum curandi rationem lib. 6. capi. 62. & sequentibus copiosissimè tradit Paulus: quam ut hic tractemus, non est nostri instituti. Quæ ad uterī pathemata, p̄grediemur.

Decocto
gluti-
nans

Ramex
aquosi
curatio.

De suppressis mensibus. Cap. XLV.

Mulieribus quibusdam menses supprimuntur, uel naturaliter, uel præter naturam. Si naturaliter: hinc colligere licebit quod mulier nulla inde molestia uel totius corporis, uel uterī afficiatur ætatis itaq; ratione plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt: paucissimis ante tertium decimum: aut duodecimū: plerisq; autem post quartum decimum erumpunt. desinunt uero aliis anno quinquagesimo. paucis autem usq; ad sexagesimum durant, steriles etiam mulieres; in utero habentes, & sal-
trices

Causæ.

Quibus
naturaliter
mens
se sup-
primatur.

Quibus
præter
naturam
menses
de-
nuntur.

Signa.

trices naturaliter non purgantur. Nam quicquid in eis recrementi est, nimia exercitationis uehementia absumitur. & ut summam dicam, mulieres calidioris temperature, ualidisq; exercitiis utentes, & agrestes, parum aut nihil per menstrua purgantur. Nonnunquam autem præter naturam menses nimia uel pinguedine uel gracillitate supprimi solent. Pingues enim exanguiore reliquis sunt, minimasq; uenulas habent: quicquid illis inest paucissimus sanguis, ferè in pinguedine transit. Graciliores uero ob diuturnum quem morbum extenuate, nihil prorsus superuacui sanguinis continent. præterea menses non defluunt, quibus sanguis uel crassus, uel lentus, uel per alia loca delatus fuerit: sicuti per nares, aut sedem. aliis etiam, quod è thorace sanguinem eiecerint, aliis quod è dissecta uena ultimam sanguinis inanitionem tolerauerint, menses suppressi sunt. sed & reliqua excretionum genera idem sepe effecerunt: ut sudoris multitudo, assidui uomitus, alui profluvia, ac pustularum omne genus quod in cute efflorescat. sic præter has omnes causas menses supprimuntur, ob acutos maximosq; morbos, & ob alimenta, quæ uel paucitate, uel multitudine sua exceßerint. A paucis enim alimentis paululus quidpiam confestim expirat, a multo uero meatus obstruuntur, & excretio intercipitur. sæpe etiam in ore uteri calli oborti, aut carnis excrescentiæ, aut pinguedinis copia purgationem menstruam impediunt. Quibuidam etiam cicatrices ulcerum, quæ in utero processerunt, uasorum ora a quibus sanguis in uterum ferebatur, obstruxerunt. Nonnullis post abortum uteri ore exulcerato, ac deinceps ad cicatricem ducto, obstructio ac coactio superuenit, quæ sanguinis per uterum excretionem aufert. Curæ quoq; pertinaces, formidoseq; immodica, & ingens moeror menses intercipiunt. Frigida deniq; aut alia uteri intemperies menses remoratur. Suppressa menstrua totius corporis graui-

grauitas, nausæ, fastidia, et horror inequalis conser-
 uuntur. dolores præterea circa lumbos, fœmora,
 collum, sinciput: et fundamenta oculorum existunt:
 item febres ardentes, et urina nigricantes, cum rubra
 quadam sanie: perinde ac aquæ, ex qua nuper maeta
 te carnes ablute fuerunt, fuliginem quis miscuisset.
 quibusdam etiam urina aut difficulter redditur, aut
 omnino supprimitur. Causarum uero diuersitas ma-
 gna ex parte de sermonibus egri cognosci potest. fri-
 gidioris autem temperaturæ fœminas ex iis potissi-
 mus dignoscemus, quod somnolentiores: ad oëmque
 motum segniores sunt, ac colore cãdidiore: seu plu-
 be, urina aquosa, et aliis quæ iam sepe dicta sunt, pi-
 tuitam quoque iugiter excreant, et interdum etiam pi-
 tuitosos humores euomunt. Calidioris autem tem-
 peraturæ notæ, iam commemoratis prorsus contra-
 riæ sunt. Plenitudinis uero, quam obstructio conse-
 quitur: notæ: ex aliis Capitib. colligendæ. quæ enim
 hac ipsa laborant mulieres, menstruum tempore
 magis grauantur, doloresque circa lumbos et pubem
 percipiunt, uenæque illis in tumorem insignem eleua-
 tur. Cæterum si à frigidis ac crassis humoribus me-
 ses supprimuntur, cibos calidos et extenuantes, de quibus
 iam sepe est dictum, exhibebimus. Vinum etiam
 fuluum, odoratum: et antiquum ut bibant præcipie-
 mus. exercitia quoque, et alia quæ corpus calefacere,
 crassosque ac lētos humores incidere et extenuare pos-
 sunt, præscribemus. Si plenitudine laborauerit mu-
 lier: et nihil aliud prohibeat: à sanguinis missione cu-
 randi ratio inchoanda erit. Secunda uero uena mal-
 leoli aut poplitis, idque non ante statum mensium te-
 pus. neque inutile erit, cruribus cucurbitulas affigere.
 Sin plenitudo nulla fuerit, purgatione utendum, hu-
 moribus tamen antea ad expulsionem preparatis. In
 quem usus hoc decoctum exhibeatur: qđ R. Radicum
 acori, iridis, oreoselini, asparagi añ. ʒ. i. seminū apii,
 fœni-

Frigidioris tem-
 peraturæ
 notæ.

Calidioris
 Plenitudi-
 nis.

Frigidioris tempe-
 raturæ cu-
 ratio.

Decoctum

fœnicul: rusci: anisi, dauci, ammi, urticæ añ. 3. l. cala-
 minthę: absinthii añ. M. s. origani: abrotani: artemi-
 się, pulegii: asari añ. M. l. hyssopi. M. l. s. cinamomi e-
 lecti. 3. i. s. buliant singula in aqua iustę quantitatis
 quoad tertia pars absumpta fuerit. dein excolentur
 et saccharo sufficienti adhibito, adiciantur syrupi de
 calamintha: de hyssopo: de marrubio añ. 3. i. s. misce
 fiat potio: qua hausta, purgatorium sumatur medica-
 mentum aliquod, nimirum hiera picra ecligina diaphœ-
 nicon, indi: catapotia de agarico, de benedicta, aut si-
 milia. à purgatione exercende mulieres potissimum ob
 ambulationibus, et inferiorum frictionibus. Fomenta-
 tiones denique, inunctiones, et balnea ex chamemelo,
 artemisia tenuifolia, mentastro, et aliis quę in deco-
 cto paulo ante memorata sunt oleis de lilio, rutaceo
 et similibus parata: adhibenda. Post hæc medicamen-
 ta, quę suppressos menses euocant protinus: ut sci-
 licet adhuc calido et soluto corpori occurrentia ui-
 res suas ostendant: exhibenda. in quem usum confe-
 runt myrrha: castoreum: baccę lauri: rubea tinctor
 piper: saluia: ruta: sauina: casia, et alia quę supra com-
 memorata sunt. Vnice autem hoc confert, quod ʒ.
 castorei. 3. l. mentastri in puluerem reducti. 3. s. uini
 antiqui aut mulsi. 3. iij. misce, et à balneo calido, p-
 pinato. Benefacit etiam decoctum pulegii, artemisię
 rutę, cumini: dauci, saluię, aneti, ammeos, fœniculi,
 inulę, et similium. Calaminthę etiam in puluere re-
 ductę. 3. ii. aut sauinę. 3. i. in uino aut mulla pota. m-
 rifice conducunt pastilli de myrrha. Absinthites au-
 tem uinum per totius curationis decursum bibendum.
 Pessis etiam in uterum demissis, necessitate sic exigē-
 te, utendum: ex quorum numero hic est, qui ʒ. trise-
 re magnę citra apium. 3. i. farinę erui, nigellę, rubę
 tinctorum, artemisię, pulegii añ. 3. l. s. succi rutę. 3.
 ii. misce, fiat pessus: qui cum lana uel gossipio suppo-
 natur. Et hic qui ʒ. Myrrhę, bdellii, styracis añ. 3. l. ca-
 lamin-

Menses
 euocanda.

Pessl.

aminthe: abrotoni, absinthii añ. 3. i. s. radicum aco-
 ri, rubeg tinctorum añ. 3. i. seminis nigelle: rutę ari-
 de, baccarum lauri añ. 3. 2. sauing. 3. 1. castorei. 3. s.
 Redigantur singula in puluerem, & cuz melle, aut tri-
 phera, aut methridati antidoto quod satis est formē-
 tur pelli. Metrenchytis etiam utendum, in quę usuz
 utero infundimus olea calida: irinum nimiruz, lilia-
 ceum, laurinum: & similia. Suffitis etiam ex styrace,
 chalbano, thure: bdellio, radice aristolochię, artemi-
 sia, nigella, garyophyllis, cinamomo, & similibus pa-
 ratis utendum erit. Fouendus quoq; uterus odora-
 tis fomentis maiorana, serpillio, calamintha chamæ-
 melo, pulegio, artemisia, radice iridis: & similibus in
 olla decoctis: quam operculo perforato operire oꝝ,
 arundinemq; aut alium canalem foramini insertuz
 undiq; circumlinere, ut deinde sedens mulier exce-
 pto canali foueatur. Proderit etiam, ut mulier hinc
 decocto usq; ad umbilicum insideat, & inde pessos
 paulo antea memoratos sibi admoueat. Cæterum
 calidiores & plurimuz exercitatę mulieres curantur
 si quàm maxime humectentur uberiore humidio-
 req; cibo ac potu: quales sunt qui è carnibus agni,
 hœdi, è piscibus teneras carnes habetibus, auib; al-
 tilibus, & similibus parantur. uino utendū candido,
 non admodum antiquo & diluto: balneis item dul-
 cium aquarum. & ut in pauca rem contraham, uictus
 ratione ea utendū, quę hecticis adhibetur. Reliquę
 curationes ex suis petantur Capitibus.

Metren-
 chitæ.
 Suffitus.

Fomenta.

Inseſſus.

Calidior-
 teperatu-
 re curatio

De redundantibus mensibus. Cap. XLVI.

Redundare menses in mulieribus dicimus, quā-
 do ultra consuetum tempus purgationis ma-
 gna copia effluxerint. Tempus autem unicuiq;
 purgationi statum & ordinatum nō est, multis enim
 ad duos tresuē dies, haud paucis usque ad quintum
 profluit, aliis etiam ad septimuz usq; rard ad duode-
 cimum

Causa.**Signa.**

cinum purgate sunt. Fit ob fracta aut aperta uasa, uel magna, uel parua. Amplioribus uasis ruptis aut apertis: confertim sanguis profluit. minoribus uero apertis: sensim: nec magna copia promanat. Ab erosione si accidit: tum non solum paulatim, uerum et cum maximo dolore effluit. Porro quum immodi-

Curatio**5 Aph. 50****Medica-
menta me-
ses con-
stringe.****Pluie.**

ce promanant: menses color fædus consequitur, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur prostermitur, uiciatur ciborum tum appetitus: tum concoctio: atque in totum omnia, quæ immoderatam sanguinis uacuationem siue ex hæmorrhide, siue alio quopiam sanguinis fluore euenientem sequi consueuerunt. In primis igitur artus et extrema corporis ab alis et inguinibus, uinculis excipere oportet. Cucurbitulas etiam leues magnas subter mammillas, iuxta Hippocratis sententiam: affigere conuenit. Cibis et potionibus austeris et adstringentibus utendū. Assis autem potius quam elixis uescatur ægra: carnibus potissimum: quibus suapte natura desiccandi facultas inest, ut auium montanarum, et agrestium animalium. motu et uino abstinendum, et pro eo adstringenti potione utendum. Medicamenta adstringentia simplicia in potu propinanda, hæc sunt. balaustrum, hypocisthis, acacia, coralli, lycium, terra lemnia, galla, polygonum, symphyrum utrumque, hæmatites, calyces glandium, plantago, oxyacantha, et similia. Composita, syrapi rosaceus, myrthinus, pastillide succino, et terra lemnia. Item hæc catapotia, quæ ex terræ lemnis, boli armenis, thuris, mastiches, galla um añ. 3. 2. sanguinis draconis, hæmatitis añ. 3. 1. cornu cerui usti. 3. 1. hypocisthidis, acacis, corallorum rub. añ. 3. 5. balaustrorum, rosarum rub. añ. 3. 2. succini. 3. 1. cum syrupo myrtino formetur catapotia, de quibus. 3. 1. aut. 3. 1. s. propinabimus. Extrinsecus unguenta, emplastra, cerata, et epithemata adstringentia, utero adhibeantur: qualia multa supra in Capi. de Disenteria,

ria, diarrhoea, & lienteria dicta sunt. Infessus etiam ex decocto predictorum medicamentorum parati conueniunt. item quod utero iniiciuntur: in quem usus plantaginis succus mirifice confert. Succus item polygoni, aut solani, aut hypocistidis, aut acacie, & similes. pessi quoque utiles sunt, qualis est quod. Thuris, balau. gallarum ann. 3. i. gummi arabici, acacie, succini, cornu cerui usti ann. 3. ii. boli armenii. 3. 2. singula redigantur in pollinem tenuissimum, & lana rosaceo intincta excepta, in mulieris pudendum immitatur. Porro fluores alii uteri diuturni, *ῥευματισμοὺς* uocant Greci, quod interdum rubri, interdum albi, interdum pallidi, sepe etiam aquosi sunt, eodem ferè modo curantur: nisi quod in rubro fluore primū, si etas & alia permiserint, ad sanguinis missionem uertimur. Nam multa sequerentur incommoda, si confestim sanguinis impetum localibus remediis reprimere conaremur: nempe hydrops, neruorum, aut oris uentriculi, uel capitis partheniata. Ablatione uero sicut in iis qui sanguinem excreant, partiri oportet, ut paulatim prolixiori tempore auersio fiat. Secunda uero erit in cubito uena: deinde in iis quæ antea commemorauimus utendum. Fluore autem albo infestante, in principio quidem resistendum non est, ut aliena è corpore excernantur: neque præter rationem erit, si quod pituitam purgat medicamentum adhibeas. toti etiam corpori auxilia quod citra manifestum calorem exiccant, admoenda, ut frictiones, unctionesque ex melle. superiorum uero precipue partium exercitationes, ut uocis, conueniunt. medicamenta quoque crassos & pituitosos humores extenuantia, urinamque ducentia, ut asarum, fœniculū, apium & similia, danda. Vtero autem moderatè adstringentia applicanda. abstergentibus et utendum, ne scilicet ab humore transeunte ulcus inferatur. Aquam igitur calidam iugiter sanies abluenda, dein rosaceam: aut myrthinum aut melinum oleum, & alia quod predicta sunt, admoenda.

Pessulus.

Curatio
fluoris
liebris.
Rubri.

Albi.

P Deuteri

**Suffoca-
tio.**

Causa.

Signa.

Curatio.

**Quæ in
accessione
facienda.**

Strangulatus seu suffocatio uteri, ad superiora eiusdem recursus est. Grecis *ὑπερπνεῖς* dicitur superiores ac principatum obtinentes partes in passionis consensu perducit: nempe carotidas, cor, cerebriq; membranas. Fit ob retenta menstrua, cohibitum semen, ut copiose Gale. lib. 6. de patientibus locis Cap. 5. ostendit. Hæc enim flatu osam quandam refrigerationem, ut inquit Aetius: in utero excitant quæ subinde cordi & cerebro communicatur. Contingit etiã refrigerato utero, quo tempore menstrug purgationes effluunt, uel ob difficilem quempia; aborsum, uel ubi quis sanguinis eruptionem ab utero repente sistere properauerit. accidit patientibus: cum accessio propinqua est, torpor mentis, pigritia: crurum imbecillitas, faciei pallor, aspectus mœstus. Quum uero iam instat strangulatus, inclinatio ad somnum, desipientia: detentio instrumentorum sensus, uox obmutescit, cruraq; contrahuntur: pulsusq; parui & debiles fiunt, sæpe & penitus abolentur. Cum remittet, mox illæ rubescere incipiunt, oculi attolluntur & aperiri. Humiditas etiam quædam a locis muliebribus tactu perceptibilis excurrit, ac intestina immurmurant: ipseq; uterus paulatim laxatur, atq; sic ipsis mens, sensus: & motus redit. Ceteruz passio iuxta circuitum mouetur, sicuti comitialis: idq; utero, ut diximus, repleto, aut seminali, aut alia quæ in eo putrefit materia. Multæ rursus se a morbo recolligunt, nō nullæ uero in ipsis accessionibus subito pereunt. idq; accidit, ubi pulsus crebriores & inordinati fiunt, ac subinde in totum abolentur. Postremo frigidus & modicus humor superficiem irrorat. porro malum hoc hyeme & autūno magis infestat iuniores, ad uenerem procliues: steriles: præsertim si ui medicamentorum tales factæ fuerint. In accessionibus igitur extrema deligare oportet, cumq; deligationibus crura tota,

tota, totumq; corpus perficere & ueluti animo deficiente recuperare. Narib. foetida admouenda: uerbigratia, funiculus lucernę extinctus, castorium, galbanum, pix liquida, lanę, lacinięq; combustę, & alia eiusmodi. Cucurbitulas quoq; inguinibus, & imo uentri cum multa flamma & leues affigere conuenit. Qd si accessio prolongetur, etiam quę flatibus educendis utilia sunt, sedi supponere oportet. Hęc autę ex Cap. de coli doloribus petenda ueniunt, In uterum unguenta & olea odoratissima infundere oportet, ut est amaricinum, & quod spicaceū hodie appellatur, irinū, & similia. Hęc ē obstetrix digitis capiens, usq; ad os uteri immittat, leniter ac multum defricans, ut eo irritamēto crassus humor excernatur. Pręter hęc omnia mulier maximis uocibus excitetur ppriumq; nomen inelametur. Hoc tempore ea etiam sunt admouenda, quę sternutationes excitant: ut castoriū, struthiū (cōdisi barbari uocant) & piper. Neq; inutile erit, si infessiones ex decocto baccarum foliorūq; lauri, pulegii calaminthę, artemisię, marrubii, sauię althę chamęmeli, serpilli, iridis, aristolochię, & fœnogręci parentur. Infessionum tamen tempore cerebri curaz non omittemus, sed rosaceo & aceto caput irrigabimus. Vbi accessio quieuerit, ad uomitū cogantur. omnes enim uomitus leuat, sed eas pręsertim quę a cibo infestantur. In tertio die lumbis & iliis cucurbitulę cum scarificatione applicentur. A septimo die purgatione utendum ex hiera de colocynthide, aut catapotiiis de agarico. Mox ad castorii potionē ueniemus, quod iugiter potū ab hoc malo protinus liberat. dandum autem singulis diebus ad drachmę pondus, interdum cum mulla, interdum cum artemisię decocto, nunc cum uino tenui. hoc etiam tempore infessionibus & pessis mollientibus ex adipe anserino, styrace, mastiche, amoniaco, & similibus confectis uti licebit. uterus etiam iis quę calefacien-

P ii di,

Quę post
accessio-
nem agen-
da.

Suffitus.

di, statumq; educendi uim obtinent, sufficiens. Vtē dum autem hoc potissimum, qui & pastillorum gal-
liæ & alipte moschate añ. 3. i. s. styracis. 3. iii. charyo-
phyllorum, maceris añ. 3. i. ligni aloës. 3. ii. cinamo-
mi electi, foliorum lauri añ. 3. ii. ladani. 3. ii. s. redactis
singulis in pollinem subtilissimum cum stacte, quā
storacem liquidum appellant, sunt trochisci. Cibo
interea & potu paucis admodum contenta sit mulier,
totaq; uictus ratio exiccatoria sit. atq; hæc ad acces-
siones proficiunt. In totius uero corporis curatione
potissimum si malum diuturnum fuerit, plerunq; à
sanguinis missione, præcipue si menstrue purgatio-
nes detineantur, auspicandum. deinde ad purgatio-
nem ex hiera picra transeundum. peracta euacuatio-
ne cucurbitulæ leues quidem, sed cum multa flamma
affigendæ. Nec inutiliter sinapismi, & dropacismi, ex
euphorbio, pyrethro, pipere, & sinapi confecti appli-
cantur. Non parum etiam recta uictus ratio opitula-
bitur, nempe deambulationes matutine, gestationesq;
uel in curru, uel naui, uel iumeto. A gestationis mo-
tu uociferatio, & lectio clara modulata cōcinna uti-
lis est. unctio pterea, frictio, & exercitatio ex cōgruis
interuallis repetita, eisdem cōueniet. balneū aque dul-
cis rarius, & nō nisi sordidū abstergendarū gratia adhi-
bendum. Balneis uero naturalib. uti, optimum est.

*Uictus**Totius
corporis
curatio.**Uictus.*

De uteri procidentia. Cap. XLVIII.

*Prociden-
tia.**Causa.*

PROCIDERE uterum dicimus, quando ita enerti-
tur, ut exterius emineat. neq; enim uterus, ut
imperiti suspicatur, à suis solutus propaginibus
totus decumbit. nam si ita procideret, restaurari mi-
nime posset. Sunt uero procidendi uteri causæ mul-
tæ. Ab alto enim delapsa mulier, si in coxas deciderit,
membranis quæ uterū cōtinent, & uicinis partib. con-
nectunt, ruptis, hoc malo corripitur. accidit etiā ut
procidat uterus in difficili partu, propter secundæ ex-
tractionem

tractionem, quam uterus illi adherescens sequitur. item ob inertem et imperitam foetus extractionem, uel istum, uel immensi ponderis eleuationem, uel animi affectus, puta filiorum amissionem nunciatam, aut hostium accessum, uel ob periculosam nauigationem: aut eiusmodi aliquam causam, omni eo quod coactum est soluto, utero etiam simul collapsio. Aut ob resolutionem, aut partium (membranarum nimirum et musculorum) imbecillitatem, ut in senescentibus maxime accidit. Procidit sepe ob humoris plurimum ac tenacis defluxum, partuumque frequentiam laxatis ac solutis appendicibus. Procidit uero potissimum secundum os eius, et quod procidit ouo struthiocamelum simile est, maioris tantum et minoris ratione differens. Signa satis manifesta sunt, et causarum diuersitas facile de egrotantis aut assidentium sermonibus cognoscetur. Quum itaque recens adhuc malum est, studere oportet, ut uterus inseratur, ac in suum reponatur locum. In principio si quidem facile repositioni pareretur, et recte locatus perseveraret, precipue si etas conueniret. nam in prouectioribus uterus quidem reponitur, sed rursus qualibet leui causa relabatur. Conuenit igitur: duris stercoreibus primam euacuatis, urinaque in uesica collecta excreta, quo uterus undiquaque sit liber: et neque ab intestino recto, neque a uesica comprimitur, egram supinam figurare: ut coxas habeat sublimiores: poplites flexos, cruribus inuicem dilatatis ac diuariatis. deinde per lapsam uteri partem oleo tepido: uel butyro: uel malug: altheae: fenograeci: seminis lini, aut similium decocto fouentes, conuolutam lanam praeparabimus: figura et crassitudine sinui muliebri proportionalem: tenui et puro linteo exterius circumdata: ac deinceps in succum acacie: uel hypocisthidis uino dilutis mersam utero inseremus, et citra uiolentiam ac sensim totum quod procidit sursum torquebimus, quoad integer in sinu tumor excitetur: et uterus in proprium reponatur locum. Ex

Signa.

Curatio.

P iii trinfecus

trinsecus aut pubem spongia in posca expressa operiemus. mulier iacebit extensis adaptatisq; inuicem cruribus, ut alterum alteri incumbat. tutius tamen erit, pedes simul uinciri, fasciam usq; ad genua deducendo. Deinde cucurbitę cum flamma copiosiore, umbilico et utrisq; ilibus affigendę. Naribus odorata iugiter admouenda. Tertio die lana adhuc in sinu persistente, mulier in uino nigro austero modice tepido, aut in decocto myrti, rubi, malicorii, et similium inbibit. his peractis sursum supina, accliuibus coxis, locabitur: sublataq; ę sinu priori lana. altera in uicem prioris eodem medicamento madefacta imponitur. Cataplasmata et emplastra a foris imo uentri, imponentur ex palmulis, polenta, malicorio, lenticula, et similibus. Cerata etiam ex mastiche, ligno aloę, ladanio, thure, iunco odorato, acoro, nuce moschata, gumi arabico, tragacantha, et eiusmodi medicamentis parata conueniunt. singulis uero tribus diebus hæc usq; ad perfectam curationem permutetur. Toto etiam curationis tempore mulier motum, et ea quę sternutameta excitant, euitet. Ut autem naribus odoratissima sunt adhibenda, sic uterus ab infernis foetidis rebus suffundendus est. Gibi boni succi, et uina odorata offerenda. uenter quoq; leniendus, ne si cum difficultate sit egerendus, simul uterus procidat. Obseruandum tamen, ne nimium uenter subducatur. exoluitur enim, relaxanturq; propinque partes, et uteri loca procidunt. Porro si pars prolapsa diuturnitate temporis propter incuriam putruerit, ob assiduamq; urinę irrigationem et sordem inherentem exulcerata fuerit, amputandum, aut inurendum quod inutile fuerit, nullius metu periculi, erit. constat enim, totum uterum putrefactum quandoq; amputatum et ablatum fuisse, ac mulierem superuixisse.

De mola,

Videtur.

MYLA, hoc est mola, induratus est tumor, interim in uulue ostiolo, interim in toto utero ipso prominens, ad tactu ferè lapidosus. uel ut Galenus lib. 14. Ther. meth. definit, est caro informis. nome à motus difficultate et grauitate assumpsit, quam sentiunt que malo hoc afficiuntur mulieres. Fit à seminis muliebri, et plurimi sanguinis menstrui in utero retentione et affluxu, quem calor immodicus co- git ac in carnis formam transmutat. Consequitur hoc malum tumor durus cum hypochondriorum contractione corporis gracilitate, decoloratione, appetentie deiectiones, mensiumque suppressione. Item mammillæ intumescunt, ut conceptionis quibusdam per initia suspicio suboritur. Temporis uero progressu discernuntur. molam enim punctiōis sensum inferens dolor subsequitur, nec in ea motus ullus, sicut in conceptione, percipitur. Nonnullæ uero præbent aque intercutem suspensionem: à qua tamē distinguitur, quod tumor durus sit, nec sicut in hydropo manus aut digitorum impulsu cedat, aut tympani modo sonum edat. Nonnunquam tamen tempore procedente iecur refrigeratur, et hydrops superuenit. Primum omnium alimenta boni succi offerenda, ac uini potione utendum moderata mulier motu non utatur uehementi, is enim fluxionem commouet: sed gestationibus, et deambulationibus. pedes etiā decubendo elatiores habeat. Quod uero ad curandi rationem attinet, principio in plenitudine uena cubiti incidenda, ac subinde purgatione per catapotia foetida utendum. corpore uacuato cataplasmata, fometa, infusiones, pessum unguenta et cerata que relaxandi uires habent adhibenda: qualla sunt que ex althea, malua, chamemelo, meliloto fœnogræco, semine lini, et similib. paratur. Conueniet in hunc usum unguentum dialtheæ, aut emplastrum de meliloto, diachylō simplex

P. IIII adinouere

Mola.

Causa.

Signa.

Vicius.

Curatio.

Vnguentum. adinouere: uel hoc quod R. Oleorū amygd. dulciū 3.iii. liliacei. 3.ii. s. pinguedinis anseris, gallinę añ. 3. i. s. mucositatis seminis lini, fanogręci añ. 3. i. amoniaci, bdellii añ. 3. ii. radicis althęę, seminum nigellę, dauci añ. 3. ii. cereę quod satis est. fiat unguentū, gummi dissolutis prius in uino. Pessī quoq; subiciendū ex butyro, adipe porcino, medulla ceruina, passulis, caricis pinguibus, seminib. lini ⁊ fanogręci cōfecti. Post hęc quę menses euocare possunt, propinanda medicamēta. in quem usum pręter ea quę in Cap. de Suppressis mensibus commemorauimus, conuenit hęc confectio, quę R. Specierum diacinamomi, diagalāęę, diacumini añ. 3. s. specierū diābrę. 3. i. dialacę. 3. s. cinamomi electi, hyperici, calami odorati, asari, radicis acori, seminis anisi. añ. 3. i. seminis rutę, zingiberis, artemisię, marrubii, dictamni, sauię añ. 3. s. iacchari. 3. vi. dissoluti in succis artemisię ⁊ hyperici, fiat confectio in morsulis. de qua quotidie dētur. 3. ii. aut. 3. iii. Proderit ⁊ hunc pessum subicere, qui R. Radicis asari, acori, rubię tinctorū añ. 3. ii. seminum rutę, nigellę añ. 3. s. maioranę, nucis mirificę, garyophyllorum, baccarum, lauri añ. 3. i. sauię 3. i. castorei, euphorbii, añ. 3. s. Redigantur singula in puluerem, ⁊ cum terebinthina resina formentur pessī. Mirificę etiam confert uti balneis naturalibus, potissimum si malum diuturnum fuerit.

De inflammatione uteri.

Cap. L.

Causę.

Vterus plurimis de causis inflammatur, nempe ex ictu, mensium retentione, abortu, ulceratione, concubitu metas rationis excedente, sellę nimis durę in sessione, longissima intentissimaq; deambulatione, sæpe ⁊ transpiratione ob frigus prohibita. Hanc monstrant uteri, pubis, ⁊ lumborum dolores, febris acuta, dolor capitis, ⁊ radicis oculorum, brachialis, digitorum ⁊ colli conuulsio: in aduersum

Signa.

aduersum declinatio, stomachi ex consortio dolor, oris uulug conuiuentia, pulsus exigui, crebriq;. Si languida fuerit inflammatio, haud ualido uteri dolore afficiuntur. Sin uehemens, & ipse totus pulsatilem dolorem percipit. Vniuerso sanè inflammatione laborante, undiquaq; parte autem eius inflammatione obsessa, in ea dolor magis intenditur. Nam si posteriora ipsius solum laborent inflammatione, dolor lumbos magis uexabit, durumq; stercus detinetur, quoniā intestinū rectum cōprimitur. Si priora dolor pubem occupat, & urine stillicidiū, aut difficultas, uesica pressa, excitatur. Laterib. aut inflammatione correptis, inguina tenduntur, & crura grauatur. Posteriorē uero uteri parte inflammata, in umbilico dolor potissimū cum tumore infestat. Quum aut os uteri inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoq; immisso os occurrit durū rigidūq;. In principio itaq; curationē aggressi, si neq; ætas, neq; habitus corporis, neq; anni tempus obstiterit, neq; inflammatio post abortū, aut immensam sanguinis euacuationē superuenerit, uenā poplitis secabimus ex Galeni decreto, qui in Lib. de Curandi ratione per uenæ sectionē inflammationē uteri à uenis in crure sectis iuuari scribit. Aegrā in domicilio obscuro, & moderatē tepido collocabimus, quietē imperātes, ac crura eius ab omni motione, prohibentes. deinde artus & extrema perfricabimus. In cibo, qui quantitate modicus sit, utatur egra ptisanæ cremore, & ouis sorbilib. Potus sit decoctū cinamomi aut hordei. Extrinsecus lana ex oxyrhodino madefacta, pubi & lumbis imponatur. Palmulę etiam, aut mala cotonea, in uino decocta, & rosaceo admixta, applicāda. Cataplasinata quoque ex farina seminis fœno græci, lini, meliloto, plātagine, lentib. polygoni, portulaca, sedo, & similib. confecta adhibēda, idq; potissimū si erysipelatis naturam inflammatio sortita sit. Lana cum rosaceo
aut me.

Curatio.

Venæ sectio.

aut melino oleo, aut succo portulacę aut sedi made-
facta, in sinum uteri immittenda. At ubi inflamma-
tio declinare cęperit, ad ea uenimus, quę quadate-
nus remittendi discutiendiq; uires habeant. Aegro-
tam igitur in fœnogreci, althę, se. lini, malug, inter-
dum artemisę, marrubii, & saluię decocto usq; ad lū-
bos sedere iubebimus. Pubi etiam & lumbis hordea-
ceam farinam cum fœnogreco & semine lini in mul-
sa elixatam, aut caricarum decoctum illinemus. Pessī
quoq; subiiciendi ex butyro, medulla ceruina, adipe
anserino, gallinę & similib, confecti. Reliqua deniq;
quib, emolliendi facultas inest adhibenda, de quib,
iam sepe dictum est.

De sterilitate remouenda. Cap. LI.

Cause

Sterilitas aut uiri aut mulieris ratione accidit.
A uiro est: cū semen eius uel feruidum, & uelut
torrefactum, uel frigidum, tenue aquosum, lan-
guidū, quale decrepitorū est: uel crassius quā opor-
tet emittitur, uel qđ uiri semispadones sint penemq;
breuissimum habeant, ut in uulux recessum semen ia-
culari nequeant. Quod etiā interdum nimia obesi-
tate cōtingit. obesi enim tam uentricosi euadūt, ut
semen ad profundiores uteri partes iaculari nō pos-
sint. Mulier uero sua ipsius ratione non concipit,
quod uterū habeat uel calidū & igneū, uel frigidum
& humidū: uel squalentem & aridū. Nam ut Hipp. ait:

5. Aph.
62.

“ Quęcunq; frigidos & densos uteros habent, non cō-
“ cipiunt. & quęcunq; prę humidos obtinent uteros
“ non concipiunt extinguitur enim in eis genitura. Et
“ quęcūq; siccos magis & torrefactos: nā ex defectu ali-
menti corrūpitur semen. Cætetū crassę admodum
& obese, haud cōcipiunt, quod itē etiā Hippocr. iis te-
“ statur uerbis: Quęcunq; pter naturā non cōcipiunt
“ utero: iis omentum os uteri cōprimit: & priusq; exte-
“ nuentur nō cōcipiunt. Graciles deniq; & macilentę

5. Aph.
46.

non

non concipiunt: aut si concipiunt, statim abortiunt, eodem Hippocrate teste, qui sic scriptū reliquit: Quę 5. Aph. cunq; p̄ter naturam tenues existentes utero gerūt, 44. abortiunt priusq; crassescant. Quędam etiam non concipiunt, eo quod uterus earum debilis est, uel angustus, uel brevis, aut quod uasa eius obstrueta clausaq; sint, aut cicatricis superuentu excæcata, aut quod uteri ceruix in obliquum ducatur, aut quod os eius uel nimis angustum, uel nimis amplum sit. Signa quibus diuersitas causarum discernitur, hæc sunt. Calidius siquidem temperamentum uiri facile deprehenditur ex pilorum copia, potissimum uero nigrorum in partibus genitalibus, et omnibus quę circum stant, suprà quidem usque ad media femora. Petulca etiam est hæc temperatura, et ad libidinem prona: statim uero satiatur. Frigidius temperamentum monstrant partes circumpositę testib. glabrę. Neque etiam hoc temperamento p̄diti ad libidinem proni sunt. Uteri uero caliditas ex reliqui corporis caliditate cognoscitur, quodq; pauca menstrua, et cum dolore deferuntur, ut genitalia interdum mulieris exulcerentur. Sed et quę educuntur, nigriora sunt. Hanc etiam temperaturam insignis salacitas, et totius corporis siccitas sequitur. Frigidiorum uteri temperaturam monstrat menstruorum suppressio, stupor in pube, lumbis et cruribus abortus. Veneris etiam usum aspernantur, et os uteri contractum habent, hoc temperamento p̄diti. Humiditatis uero uitio fecunditatem frustrari indicat, si in coitu humore admodum perfunduntur, et si iis fuerint tenuia copiosaq; menstrua. Siccitas uteri contrariis planè deprehenditur notis. Communiter quidem ambobus congruit, et uiro et mulieri, uniuersum corpus conseruare probè temperatum, laboris, cibi, balnei, et reliquorum omnium mediocritate. Viri igitur, qui ob deprauatam

Signa.

Curatio
commu-
nis.

Pess.

aut melino oleo, aut succo portulacę aut sedı made facta, in sinum uteri immittenda. At ubi inflammatio declinare cöperit, ad ea ueniemus, quę quadātenus remittendi discutiendiq; uires habeant. Aegrotam igitur in fanogreci, altheę, se. lini, malug, interdum artemisię, marrubii, et saluię decocto usq; ad lūbos sedere iuebimus. Pubi etiam et lumbis hordeaceam farinam cum fanogreco et semine lini in mulsā elixatam, aut caricarum decoctum illinemus. Pessı quoq; subiiciendi ex butyro, medulla ceruina, adipe anserino, gallinę et similib, confecti Reliqua deniq; quib, emolliendi facultas inest adhibenda, de quib, iam sepe dictum est.

De sterilitate remouenda. Cap. LI.

Causa

f. Aph.

62.

f. Aph.

46.

Sterilitas aut uiri aut mulieris ratione accidit. A uiro est: cū semen eius uel feruidum, et uelutı torrefactum, uel frigidum, tenue aquosum, languidū, quale decrepitorū est: uel crassius quā oportet emittitur, uel qđ uiri semispadones sint penemq; breuissimum habeant, ut in uulua recessum semen iaculari nequeant. Quod etiā interdum nimia obassitate cōtingit. obassi enim tam uentricosi euadūt, ut semen ad profundiores uteri partes iaculari nō possint. Mulier uero sua ipsius ratione non concipit, quod uterū habeat uel calidū et igneū, uel frigidum et humidū: uel squalentem et aridū. Nam ut Hipp. ait: "Quęcunq; frigidos et densos uteros habent, non cōcipiunt. et quęcunq; prę humidos obtinent uteros non concipiunt extinguitur enim in eis genitura. Et quęcunq; siccos magis et torrefactos: nā ex defectu alimentı corrūpitur semen. Cætetū crassę admodum et obasse, haud cōcipiunt, quod itē etiā Hippocr. iis testatur uerbis: Quęcunq; pter naturā non cōcipiunt utero: iis omentum os uteri cōprimit: et priusq; extenuentur nō cōcipiunt. Graciles deniq; et macilentę non

non

non concipiunt: aut si concipiunt, statim abortiunt, eodem Hippocrate teste, qui sic scriptū reliquit: Quę s. Aph. cunq; p̄ter naturam tenues existentes utero gerūt, 44. abortiunt priusq; crassescant. Quędam etiam non concipiunt, eo quod uterus earum debilis est, uel angustus, uel brevis, aut quod uasa eius obstructa clauisq; sint, aut cicatricis superuentu excæcata, aut quod uteri ceruix in obliquum ducatur, aut quod os eius uel nimis angustum, uel nimis amplum sit. Signa quibus diuersitas causarum discernitur, hæc sunt. Calidius siquidem temperamentum uiri facile deprehenditur ex pilorum copia, potissimum uero nigrorum in partibus genitalibus, et omnibus quę circum stant, suprà quidem usque ad media fœmora. Petulca etiam est hæc temperatura, et ad libidinem prona: statim uero satiatur. Frigidius temperamentum monstrant partes circumpositę testib. glabrę. Neque etiam hoc temperamento p̄diti ad libidinem proni sunt. Uteri uero caliditas ex reliqui corporis caliditate cognoscitur, quodq; pauca menstrua, et cum dolore deferuntur, ut genitalia interdum mulieris exulcerentur. Sed et quę educuntur, nigriora sunt. Hanc etiam temperaturam insignis salacitas, et totius corporis siccitas sequitur. Frigidiorum uteri temperaturam monstrat mēstruorum suppressio, stupor in pube, lumbis et cruribus abortus. Veneris etiam usum aspernantur, et os uteri contractum habent, hoc temperamento p̄diti. Humiditatis uero uitio fecunditatem frustrari indicat, si in coitu humore admodum perfunduntur, et si iis fuerint tenuia copiosaq; menstrua. Siccitas uteri contrariis planē deprehenditur notis. Communiter quidem ambobus congruit, et uiro et mulieri, uniuersum corpus conseruare probē temperatum, laboris, cibi, balnei, et reliquorum omnium mediocritate. Viri igitur, qui ob deprauatam

Signa.

Curatio

et omniu

nis.

res laborib. plurimis, sudorib. uomitu: uel per infer-
 na purgatione absumere oportet, aliaq; omnia quæ
 in Cap. de Suppressis mensib. commemorata sunt.
Curatio Iam uero flatus quoq; uteri conceptionē impediunt,
flauum. quib. primo cibi paritate medebimur: dein iis quæ
 flatus discutiunt, ut est cuminum, ruta: anethus: apii
 semen, & similia, quæ sepe iā cōmemorata sunt: eaq;
 partiz. potanda, partim extrinsecus adhibenda sunt.
Curatio Clausum uterum aperiemus iniectionis clysterib. odo-
clausi ue riferis, fomentisq; & iniectionib. ex fœnogreco, semi-
ri. ne lini, malua, & id genus aliis. Postea ad ualidiora p-
Curatio a gemus, ut artemisiā: calaminthā pulegiū: & maiora-
perit uteri nam. Quibus os uteri nimium hiat: iis uictus aridus
 fomenta sicciora, medicamenta adstringentia, qua-
 lia in curatione humidioris intemperiei dicta sunt:
Curatio conueniunt. Peruersiones uteri mollientib. fomen-
peruersionis. tis dirigemus; id enim fomenta maximè possunt. Sz
 & molliētes pessuli utiliter supponentur. Castoreū
 ēē posca bibitum utero auerso conferre solet. Que
 hic desiderantur, ex aliis petendū Capitib. erit. nos
 enim hic Capita tantū rerum pstringere uoluimus.

De difficili partu.

Cap. LII.

Causa. **D**ifficilis partus, aut uitio parietis, aut foetus aut
 secundarum: aut extrinsecus aduenientium ac-
 cidit. Parturientis quidem, si crassa obesaq; sit
 aut animo pusillo: & dolorum inexperta, aut uterus
 totus exiguus: aut inflammationem uteri, aut alte-
 rius partis habeat, aut alio quouis morbo laboret:
 aut naturaliter imbecillis sit, ut foetum propellere
 nequeat: aut ante tempus pariat. Item si os ceruicis
 uteri obliquum fuerit, aut eidem caro aliqua ob ul-
 cus quod precessit adnata sit. At foetus uitio, si uel
 iuuuitate magnitudinis existat: uel exiguus: & modi-
 ce grauitatis, uel magni capitis, uel monstrosus: uer-
 bi causa, biceps: uel mortuus, qui nihil opis parturie-
 ti pre-

si præstet, aut intumescat: uel uiuus quidem: sed imbecillis, ut foras non possit progredi, uel si gemini uel plures fuerint, & repente omnes simul collo uteri impingantur, uel si figuram naturæ contrariæ obtineat. Naturalis siquidem figura foetus prodeuntis est, prima quidem in caput: manib. super fœmoribus porrectis & extensis, & caput in neutram partem declinans: sed recta ad os uteri dirigens, proxima huic, ubi in pedes manibus super utroq; fœmore extensis recta defertur. Aliæ omnes præter has duas: à natura abhorrent. ut si caput in dextram aut sinistram uteri partes inclinatur: uel si altera, aut utraq; manus exeritur, cruraq; interius a se inuicem diducuntur: aut si foetus altero pede prædit, altero interius retento: aut si duplicatus alicui uteri parti innititur. Ob secundas partus redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusq; opus sit propter tenuitatem abrumptur. humore siquidem qui in utero collectus fuit uacuato, infans præ siccitate ægrè elabitur. Ab externis et causis difficultas oritur pariendi, aut frigore, quod uterum densat, & meatus angustiores reddit: aut calore immodico, qui vires dissoluit. Causæ externæ de parientis & assistentium sermonibus cognoscuntur. Debilitas quoq; parientis: ueluti etiam pinguedo, ex habitu corporis deprehenditur. Ex morbis etiam præcedentibus facile in imbecillitatis cognitionem uenimus. Foetus imbecillitas ex debili ac tarda motione cognoscitur, qui si mortuus fuerit, à motu prorsus cessat, uetris frigiditas adest, atq; dolor iuxta umbilicū grauis. spiritus exhalatur foetidus, faciei color prauus. Magnitudo foetus ex partum corporis constitutiōe: ac uentris parientis mole coniicitur. Crassities secundæ inde colligi potest, quod prædictorum signorum nullum adsit, & parturiēs robusta facilisq; foetus motus sit. Ceterum oboclam mulierē in lectulo pronam, hoc est in caput appendentem.

Naturalis
situs foetus
prodeuntis.

Signa.

Cura.

tem, & uultu in terram deiecto figurare oportet, flectentem inclinantem uè genua ad femora, quò uterus ad abdomen tendens, è directo oris sit. Digitis uero pinguedinibus, uerbi gratia butyro, oleo, axungia anatis, gallinæ, & similium delinire os oportet, & sensim dilatare. Timidam uero hortari conuenit, inexpertem dolorum partus admonere expedit, ut ualidissime spiritum comprimatur ac contineatur, & ad ilia ualidiore conatu protrudatur. si autem ex adstrictione, foetusq; ueluti ad arctatione pariendi oriatur difficultas, laxatione opitulandum, infundendo largiter oleum dulce & calidum. item decoctus fœnigreci, aut malug, aut seminis lini, aut etiam oua, quò leniendi facultate prædita sint. Deinde & pubem cum abdomine & lumbis prædicto decocto, aut alio relaxante medicamento fouere oportet. Proderit etiam in sessionibus ex commemoratis rebus paratis uti. In super laxationes balneis aquarum dulcium moliri oportet, nisi febris, aut alia quædam occasio impedierit: mouereq; parientem gestatione in sella, in aëre mediocriter calido. Quod si inflammatio, aut alius quispiam morbus uterum infestauerit, huic etiam ex propriis capitibus succurrendum, ac prospiciendum erit. Imbecilla cum iis quæ reficiunt, & robur addunt cibis & potibus refocillanda. Vbi infans præmagnus fuerit, ea adhibenda quæ dilatare & laxare os uteri possunt. Si uero præter naturam figuratus fuerit, naturalem reddere figuram decet, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, partim in rectum agendo. Et si manum pedem uè præmiserit, non attrahere membro prehensum oportet: magis enim firmatur ac impingitur, uel luxatur, uel abrumpitur: sed digitis humero uel coxæ foetus innixis, rursus id quod prominet in conuenientem locum diducere. Porro si cuius oris uteri compressione, totius infantis indecora fuerit figura, sursum prius ipsum ab uteri ore, sublimem destrudere

rudere consilium est, deinde prehensum iterum ad os dirigere. Si autem gemini, aut terni, plures uè fuerint, ac ceruicem uteri obsederint, reliquos propellere ad fundum uteri oportet, et eum qui magis paratus uidebitur, prius educere. Verum si non procedat, quod infans mortuus sit, aut caput nimis magnus, uel alia ob causam, ad fatus extractionem seu sectionem, quam Græci ἐμμεσίονον appellant, ueniendus est. Eam autem copiosissime Aëtius lib. 16. cap. 23. et Paulus lib. 6. cap. 74. tradunt. Porro si fatus tunica, seu secunda crassior fuerit, ac solidior quam ut rumpi possit, dissecanda erit. Quibus autem humor in tunicis contentus, ante congruum tempus effluxerit, ita ut loca exaruerint, quorum albuminibus cum malum, aut foenigræci decocto excolato, aut ptisanæ cremore tepido perfundemus. Medicamentum uero quod in uniuersum omnes difficulter parientes iuuat, est hoc, quod R. Cinamomi electi. 3. 2. myrrhæ, casie lignæ uocatæ añ. 3. i. succini albi. 3. i. s. misce, fiat puluis, de quo in potu uini odoriferi de drachma una. Porro fatus excusso frequenter accidit, ut secunda in utero firmiter adherescat. quod ubi evenit, tum interdum os uteri apertum, interdum clausum reperitur, secundinaq; ipsa nonnunquam uteri fundo adhuc coniuncta, nonnunquam seiuncta est. Si itaq; os uteri diductum fuerit, et secunda quæ inibi relicta est alicui parti uteri orbiculatim ac pile modo conuoluta inhererit, facile educitur. manu siquidem sinistra calida, pinguiq; illita in fundum demissa, secundam sublabentem extrahere oportet. Si autem fundo uteri sit connexa, demissa simili modo manu calida, et pingui inuncta apprehensam secundam trahemus: non tamen in rectum, ne uterus procidat: neq; uiolenter admodum sed leniter ac placide primus in obliquum deducemus, huc atq; illuc circumagentes, deinde paulo ualidius attrahemus, hoc enim pacto ob-

Puluis op-
timus ad
difficulta-
tes partus
Secundæ
eductio.

Q sequun-

sequuntur, & à connexu soluuntur. Quod si uulua
os clausum fuerit, perfusionib. utemur, & sinistræ ma-
nus digitis leniter aperire & paulatim dilatare cona-
bimur. Quod si non successerit, mulieris pubi fome-
ta perfusiones, unguentaq; emollientia & relaxan-
tia adhibere conuenit. Si robusta, fuerit eo tempo-
re etiam sternutamenta ex castorio, pipere, & similib.
confecta narib. admouenda sunt. Hinc est quod Hip-
pocrates. s. aph. 49. sic scriptum reliquerit: Vt secun-
da procidat, sternutatorio appposito, & nares appre-
hendito & os. Potiones deniq; aliquæ earum quæ
menses prouocant propinandæ. Quæ quidem om-
nia primo, aut altero die peragenda sunt. præterea
suffitu utendum, decoctis in olla artemisia, iride, sa-
uina, pulegio, calamintha, & similibus, olla selle sup-
posita, cui mulier uestimentis undiquaq; circumse-
pta infideat. Postea si os uteri apertum inuenerimus
manu inserta, secundam, ut diximus, extrahere cona-
bimur. At si non obediât, dilaceranda non est. haud
multis enim postea diebus putrefacta, & in saniem so-
luta excidet. Quia uero grauitate odoris & caput re-
plet, & stomachum euertit, odoramenta iugiter sus-
frenda sunt, quæ possint his malis aduersari, & secun-
dam subducere. Ad quos usus excellunt cardamo-
mum, bdellium cum sauina, thus, styrax, ladanum, li-
gnum aloes, & huiusmodi. Iisdem etiam, ea quæ men-
ses ducunt propinanda.

De ischiadicis.

Cap. LIII.

Ischiadici

Causa.

I Schiadici, hoc est coxendicum dolore affecti, pro-
prie dicuntur, quibus dolor circa iuncturam
(quam Græci ἰσχίον, Latini coxam uocant) acci-
dit. Fit ob crassum pituitosumq; humorem, qui in
coxarum articulo concretus infidet. Ideoq; hoc ma-
lus assidue cruditates, & immodicus rei ueneris usus
aliquando etiam de ambulationes concitiores,
& hæmor

et hemorrhides suppressæ, et uomedi consuetudo intermissa, et purgationes menstruæ, aut etiam aliæ familiares excretiones impeditæ, et exercitiorum neglectus cōciliant. Antecedit autem, et quasi auspicatur hoc uitium aliquando quidem uicinorum musculorum dolor, et maximè lumborum: aliquando uero ab ipsa coxa initium fit. Iam uero quandoq; etiā contingit, ut coxæ dolore sublato, circa poplitem solum afflictio hereat: aliis autem iuxta talum, quibusdam uero totum crus equaliter dolore afficitur. Multis item dolor circa inguina figitur. Initium igitur curationis fiat ab affligentis humoris euacuatio-
 ne. Et si quideꝫ humoribus ex æquo redundarit corpus, præ omnibus uena secanda in poplite, aut talo interna, aut etiam cubito, Galeno lib. 10. de Compo. medica. secundum locos. Cap. 2. teste: idq; in latere affecto. Sin à pituitofo atque crasso humore malum oritur à purgatione eius humoris auspicanda curatio. in quem sanè usum clysteres crebri exhibendi erunt, in hunc uel similem modum parati. R. Centaurei minoris, saluæ, uerbasculi odorati: rutæ, iuxæ arthriticæ hodie officinis dictæ, añ. M. 1. radicis acorri. 3. i. stœchadis. 3. iii. semi. anisi: se. fœniculi añ. 3. 2. s. ngarici optimi. 3. 2. polypodii. 3. v. decoquatur in aq. iustæ quantitatís, donec tertia pars absumpta fuerit. dein. R. colature. 3. xiii. hieræ piecræ. 3. s. eclignatis. Indi. 3. 1. s. oleorum liliorum alborum. 3. ii. rutæ. 3. 1. uitellos ouorum numero. 2. salis. 3. 1. s. misce, fiat enæma. Auxiliantur etiam uomitus ischiadicis, atque magis utiq; quàm euacuationes inferne per uentrem, ut qui reuellant deorsum repentem humorem. Faciendi itaq; sunt uomitus in principio ab accepto cibo, postea uero etiam per uomitoria medicamenta, initio factò à mediocribus. In quibus autem uehemens humorum coactio densatio-
 ne, quæ egrè dissolui potest, à medicis intempestiue

Signa.

Curatio.

Clyster

Vomit.

Cucurbit.

Q ii acris

Ad strin-
gentibus
medicam-
entis nō
utendum.

Acria
quando
adhibenda.

Vnguen-
tum.

acribus pharmacis utentibus facta est, his cucurbitu-
la quā maxima cū scarificatione affixa auxiliatur.
Ceterum medicamentis fluxum reprimentibus in co-
xendicum dolore non utemur. Quum in profundo
coxa sita sit, sanguis ex vicinis & ambientibus uenis
ac musculis ad illam impellitur. Mitigatoris igitur
in principio medicamentis opus est, in hoc dolore,
quē neq; refrigerent multum, neq; fortiter calfaciat.
Ut enim ea quē refrigerant, ad coxam impellunt: sic
quē uehementer calefaciunt, aliam amplius materiā
ex adiacentibus partibus attrahunt. Porro post ue-
nē sectionem, aut per purgantia medicamenta uacua-
tionem, ad acria medicamenta, non antē, ueniendū
est. Si enim quis prius quā corpus euacuet acribus
medicamentis ad patientem particulam adhibeat,
egre curabile malum reddet, utpote multitudine ibi
dem indissolubili ter condensata. pręter alia enim
crassa & uiscosa fit, & ob acrium medicamentorum ca-
liditatem & siccitatem non dissimile quippiam assa-
tioni, perpetitur. Patientem igitur locum primum ex
oleo rutaceo irrigare oportet. postea uero efficacio-
ra admouenda medicamenta, quę scilicet sensim ca-
lefacciant, & materias ex alto ad superficiem attrahe-
re possint: qualia sunt, oleum uulpinum, de piperi-
bus, costinum, unguentum arragon, marciaton,
salvia, ruta folia, lauri, sambuci, radix ebuli, pulegiū,
sauina, opopanax, bdellium, ammoniacū, & similia:
ex quib. fomenta, unguenta, emplastra & cerata com-
poni possunt. Quare primum spongia in decocto iu-
niperi, aut saluie, aut foliorum sambuci madefacta,
loco patienti iterum atq; iterum imposita, hoc un-
guento subinde utendum erit, q̄ R. Vnguenti mar-
ciaton. 3. iiii. oleorū irini, liliacei añ. 3. s. succi rute, suc-
ci iugē hodie noiātē añ. 3. i s. mellis. 3. i. s. saluie pulegiū,
piperis añ. 3. s. pyrethri, staphysagrie añ. 3. i. cereq; ō sa-
tis est, fiat unguentum. Proderit etiam huius cerati
usus,

sus, ꝓ ꝑ. oleorum costini, uulpini añ. 3. i. s. olei de Ceratū.
 iperib. 3. s. opopanacis, bdellii, styracis añ. 3. iii. radi
 is bryonię, nitri, foliorum sambuci añ. 3. ii. pistola
 hię, (quam rotundam hodie nominant) rutę añ. 3.
 s. euphorbii. 3. i. gummi dissoluantur in acerrimo
 aceto, ꝓ cum cera ꝓ terebinthina refina quod satis
 est, fiat ceratum. quod si malum adhuc remoretur,
 clysteribus denuo utendum erit, ꝓ postea cucurbi
 ta quàm maxima cum plurima flamma coxę affigen
 da, uulnusculis etiam altioribus per scarificationē
 impactis. Quod si uero neq; sic malum finitur, ad
 purgationem, uomitum, ꝓ alia quę suprà dicta sunt
 redeundum est. His peractis, ad dropaces ueteribus
 nominatos, ꝓ ad medicamentorum adurentium
 usum ueniendum. inter quę non postremum locū.
 obtinet, herbę hiberidis radix recens,estate effos
 sa, ꝓ diligenter tusa, ac ueteri axungia modica ex
 cepta, iuncturę coxę, ꝓ uniuerso cruri imposita, ꝓ
 adalligata. Sic uero admotam incumbere finito,
 mulieribus quidem non infra duas horas, uiris au
 tem quatuor horarum spacio, si possibile sit id per
 ferre. Excitat enim tumores cum ardore ꝓ rubore,
 ueluti sinapismus facere solet. Post in balneum indu
 cito egrotantem: in quo ubi modicum exudauerit,
 in solū ob feruorē mordacius desiderare iubeto, idq;
 fortiter perferre cogito (Imorsum enim cum ardo
 re in principio inferre consueuit) deinde educito. fer
 mē enim semper, ut testatur Aētius, q; uis ab aliis fue
 rint importati, sua sponte pedib. ingredientēs exi
 bunt. A balneo ad oleum multum, paucum admodū
 uinum admisceto, ꝓ conquassata illinito: ac humo
 re cum aspero panno deterſo, crus ipsum cum leuissi
 mis lanis cooperito. Et sanē consueuit hoc ipsum
 p̄sidium nullo alio inde auxilio indigere. Quod
 si tñ aliqn uestigiū mali relinquatur, uicenis dieb. in
 terpositis, rursus eodē p̄sidio utaris. Interiectis aut
 Q iii diebus

Aduren
 tia medi
 camenta.

Vetus

diebus, cetatū supra descriptū imponi pōt. Inter adu-
rentia medicamēta hoc etiā locū non obtinet extre-
mū, q̄ R. Mellis anacardini, fermenti añ. 3. i. cantha-
ridū abiectis alis. 3. ii. aceti quod satis est, misce ⁊ hoc
quod R. Euphorbii, nitri añ. 3. ii. saponis, calcis uiuē
añ. 3. i. mellis anacardini q̄ satis est ut ad mellis cra-
situdinē omnia cōmixta redeant. Cēterum quod ad
uictus rationem attinet, cibus sit mediocriter tenuis,
⁊ cōcoctu facilis exercitia perficiantur deambulationi-
bus, continuis flexionibus, saltationibus ⁊ cursu.
Alium etiam semper probe solutam habere expedit.
Quod si uero uitium longius durauerit, uisionem
in tribus aut quatuor locis adhibere oportet, ut do-
cet Paulus lib. 6. Cap. 76.

De podagra ⁊ arthritide. Cap. LIII.

Podagra
gra.
Arthri-
tis.
Causa.

Podagra ⁊ arthritides mala eiusdem sunt speciei.
Differunt itaq; non toto genere, sed locis patien-
tibus. In utroq; enim articulorum est imbecilli-
tas, ⁊ humor à natura alienus ad hos ipsos confluēs.
Quapropter si in pedibus constiterit hęc fluxio po-
dagra appellatur. Si uero reliquos artus occupaue-
rit, ὀδὴν ἄρθρου, id est articularis morbus nominatur. Ge-
nerant autem hoc malum cruditates, immodicus re-
uenerē usus, uehemens ⁊ concitator deambulatio,
stationes diutius productæ, equitatus creber familia-
res excretionēs suppressæ ⁊ consuetorum exercitio-
rū intermissiones. mœrores autem, curę uigiliæ, ⁊ re-
liquę animi affectiones hoc malū suscitant. Nonnū-
q̄ etiam colicus dolor perperā curatus causa est, cur
arthritides sequatur: quēadmodū testantur ea quę lib.
sexto Epid. par. 4. aph. 3. scribit Hippocrates, inquiēs:
Cuidā intestinū colō, ubi articulari morbo corripie-
batur, dolore ferē uacabat. Postq̄ uero ab eo sana-
tus est morbo, plus doluit. Vt plurimū uero aptitudi-
nes ad hoc malū à parentib; in filios ac posteros trās-
feruntur.

feruntur. Sed humor superas, q̄ iūcturis sese inferit, uel sanguineus, uel biliolus est, uel pituitosus, uel melancholicus. Interdū etiam ex humorū cōmitione malū contrahitur. Humorem autem discrimina iis deprehendi notis possunt. Sanguineus siquidem humor si multus fuerit, plenitudinem efficit, et tumorem ingētem, non uenarum modō, sed totius partis patientis circa cutem, eumq; rubentem, Qui hoc modo patitur, neq; refrigerantia neq; calfactoria ualde prefi-
signa
Sanguines.
defluxus.
 dia adhiberi sustinent. Urinæ eorū fuluæ sunt, et mediocri prædite crassitudine. Venæ etiam in his copioso suscepto sanguine replentur: et in tumorem attoluntur. Aetas uero apta, iuuentutis. Edulia præcelsunt boni succi, et copiose nutriētia, neglectus exercitiorum. Tempus uero, in quo affliguntur, uer. Biliosum defluxum, color subflauus, et subrubeus testatur. Item caloris sensus, dolorisq; lancinantis modo acris. item humor in cutem subito sine euidenti tumore erumpens. Refrigerantibus medicamentis sic afflicti gaudent, et iuuantur: à calidis autem offenduntur. Febris in ipso accessionum statu accedit, ualidaq; siti conficit. Urina sic patientium subfaluā, quandoq; etiam acris. Curæ autem ingētes, et iræ, et uigiliæ, et fatigationes, et in summa uictus ratio bilem procreans, præcedere solent. Aetas, temperamentum, et tempus, calida et sicca ad eum defluxum apta sunt. At si pituitosa fuerit fluxio, ad digitorum appressionem cauius fit tumor, et subla-
Biliosi.
Pituitosus.
 xus et moderatus, et color dolentis membri albus. Aetas hoc modo magis afficitur senilis, temperamentum humidum et frigidum, consimilis ambientis status, et tempus hybernum. Urina tenuis est, et aquosa. præcedit ocium, et uictus ratio, quæ pituitosum humorem progignit. Si ex atra bile fit fluxus quod raro, tamen contingit, color tumoris nigrior, est. Aetas quæ magis hūc fluxū generat, est uigore in-
Atra bili influit.

Q̄ iiii clinante,

Carallo.
sanguis
aer.

Localia.

clinante, temperamentum frigidum et siccum, tempus
autumni, regio frigida et sicca, aeris consimilis sta-
tus, uictusque atram bilem gignens. Quum igitur san-
guinei humoris fuerit influxus, ptinus sanguis mit-
ti debet, non solum semel, sed iterum atque iterum,
detractione paulatim reperita. Si enim uene sectio-
ne omissa repellentibus medicamentis fueris usus,
magni mali autor eris. ex ignobilibus enim partibus
ad principes, et uite necessarias sanguis repulsus ire
ruet. Secunda est aut uena in brachio inferna, è di-
recto cruris influxione infestata. Quod si uero ma-
nus dextra dolore infestetur, uenam in dextro cru-
re secamus iuxta poplite autem talos. Tū uero potissi-
mum sanguinis missio tentanda erit, cum quem-
piam malum hoc primum inuadere coepit. Qui
enim sæpius huiusmodi defluxione sunt confecta-
ti, plus noxę quàm auxilii ex sanguinis detractio-
ne sentiunt, præsertim si corpore sint imbecillo ac
frigido. Post missionem sanguinis patienti parti-
culę remedia adhibere oportet, quę neque ualde re-
frigerant, hæc enim humores cogunt, ac conden-
sant: neque immodicę calefaciunt, hæc si quidem calo-
ris ratione ad partes patientes plus attrahunt. Qua
propter aceto ueteri cum rosaceo partem patientem
rigare oportet, præsertim si in alto herere dolorum
causa uideatur. Etenim acetum propria sua tenuita-
te usque in altum progressum, expeditam rosaceo uiā
exhibet, quod natura sua dolores lenire potest. Si in
superficie dolor consistat, per uini et olei usum ma-
gnopere iuueris, æstate quidem tepidorum, hyeme
uero calidorum. Deinde etiam cataplasmatibus uten-
dum, quę dolores lenire possunt, ex farina foeni-
græci, hordei, fabarum, lupinorum, chamæ melo,
et similibus. Oportet autem ea omnino semper es-
se calida: quod commodè fieri potest, si assidue per-
mutentur, et lana forinsecus contegantur. Non pa-
rum

rum proderit et hoc, quod & Lactis caprini .3. vi. uir-
tellos ouorum numero ii. olei rosacei. 3. i. croci 3. s.
medullę panis quod satis est, ut medicamentum cata-
plasmatis formam accipiat. Hęc itaq; terantur do-
nec uniantur, et unita tandem imponantur. Po-
test etiam fieri ceratum ex oleo rosaceo, aceto, re-
sina, cera, galbano, ammoniaco, thure, croco, et
similib. tale enim repulsoriam uim propter crocum
et acetum obtinebit: concoctoriam uero, discusso-
riam, et moderatę resiccantem, rursus ob crocum,
et aliorum commixtionem. Cæterum cibos eis exhi-
bere oportet, qui extenuant, et minus nutriunt: qua-
les sunt olera. Carne autem, nisi sit uolucrum mo-
tanarum, abstineant: piscibus perosis utantur. Vi-
num, si fieri potest, ex toto circumcidendum: nam
hec ferę una ratio est, qua sanitas consequi potest.
Quam cum ex milibus uix unus sequatur, nihil mi-
rum paucos admodum esse qui ab hoc morbo ho-
die liberentur. In uicem uini uti oportet decocto ci-
namomi, anisi, et similium: aut potione ea quę ho-
diernis temporibus Hippocras corrupta uoce nomi-
natur, cuius preparationem pete ex Cap. de Resolu-
tione. A fructib. et uenere abstineant. Alium etiam
facile subeuntem habere oportet. Et si quidem offi-
cio suo sponte sua non fungatur, simpliciori aliquo
clysteri eluatur. Quod si uero ob bilis influxum do-
lores excitentur, tum his communis scopus, humo-
ris affligentis est euacuatio, quę tum per uomitum,
tum per uentrem fieri debet. Per medicamenta itaq;
bilem ducentia confidenter purgandi sunt sic affli-
cti. dein usq; ad uigorem apponenda medicamenta,
quib. refrigerandi et adstringendi facultas inest. qua-
lia sunt quę ex semperuiuo, rosis uiridib. rumice
acuto, solano, plantagine, et similibus iam sæpe
commemoratis apparantur. In hoc influxus gene-
re interdum ob doloris uehementiam, iis quę stu-
porem

Cataplas-
ma.

victus.

Cur pau-
ci hodie
a podag-
ra libera-
rentur.Bilis si flu-
xus.

*Stupefa-
cientia.*

porem inducere possunt medicamentis utendū erit. In quem usum conuenit adhibere medicamentum quod supra descriptum est, ex lacte caprino, medulla panis, croco, et oui uitellis, cui seminis papaueris. 3.iii. aut. 3.iiii. aut opii. 3.i. admixta sit. Pro sunt hac ratione cicutæ folia, et hyoscyami adhibita. Sed animaduertendum erit, ut quum in feruentibus dolorib. fuerimus ad stupefacientium usum coacti, postea resoueamus partes per ea quæ calefacere possunt. Nisi enim hoc fecerimus, debiles et in in-temperatas redditas partes perpetuo fluori obnoxias reddemus, et quæ in actionibus facile offenduntur. Calorifica uero sint origanum, satureia, sinapi, piper, et eiusmodi. Porro adiuuare etiam oportet sudorum exclusionem, corpus calefaciendo et fricando: ita tamen, ne patientes locos contingamus. Præbenda quoq; in potu ea quæ urinam cient. talia enim bilem per lotium euacuare consueuerūt. Soporem quoq; inducentia, quod fluores ab ipsis resiccentur: atque id maxime, si post corporis purgationem exhibeantur, conferre solent. Cibi iis dandi refrigerantes, non tamen humectantes: humiditas enim auget fluxionem. Famem et inediane tolerant: nam bilem acriorem reddunt. Ex fructib. pomis adstringentibus et mespilis et aliis quæ refrigerant, et simul fluxus cohibent utantur. A uino prorsus abstineant, ut priores. Qui ob pituitæ influxum laborant, horum curationem à pituitæ euacuatione auspicanda. Euacuatur autem humor pituitosus per uomitus quidem, nihilominus tamen et per uentrē infernē. Vtilior uero in hoc malo per inferna purgatio, siue iuxta manus, siue iuxta pedes hæreat morbus: et multo magis, si iuxta omnes corporis articulos fluxus constiterit. familiarior enim pituitæ uia, et minus periculosa per intestina existit. Si enim in superiorē uentrem uiolenter attracta nō uacuetur,

Visus.

*Pituitosi
fluxus.*

cuetur, periculum inducit. Quapropter tutius est, ut ad infernam excretionem ducatur. Ante tamen purgantia medicamenta, ea quibus incidendi et extenuandi facultas inest, exhibenda, ut hac ratione ad purgationem crassi humores præparentur. Si euacuatio per purgationes fieri non potest, tum inedia et fame utendum est ad plures dies. natura enim pituitosi eam bene tolerare possunt, iuxta hoc Hippocraticum: Corporibus carnes habentibus humidas, famem adhibere conuenit fames enim corpora ficcet. Neque absurdum erit, si illi clysteribus, et medicamentis urinam cientibus uacuentur. Cæterum extrinsecus medicamenta quæ dolores leniunt, et quæ discutere et moderatè resiccare possunt adhibenda, de quib. paulo suprâ diximus. His uero in morbi principio aliqua quæ adstringendi potentia prædita sunt, commiscere oportet. Post principium autem, solis discutientibus utendum. Mansuetissimum uero hoc est: Althææ nimirum folia cocta, tritatum per se, tum cum polline, aut hordeacea farina imposita. Radix etiam cocta in aqua mulsa, trita, et imposita confert. Et hoc unguentum quod R. Olei laurini, irini añ. 3. i. adipis suilli ueteris, butyri añ. 3. ii. medullæ ceruinæ. 3. ii. resinæ rebinthinæ. 3. v. galbani in aceto dissoluti. 3. i. hyssopi, radicis althææ, semine fœnogræci añ. 3. ii. cæteræ quod satis est, fiat unguentum. Porro quæ ratione nutrimenti præbentur edulia natura ficciora sint, et minus nutrant: ut est oryzæ succus, et eiusmodi. Carnes tñ auiū montanarū assæ haud incōmodant. Cappares ex aceto mulso mirificè p̄sunt. Vinū p̄beatur quàm minimū, tenue, suluū, et uetus. Qui atræ bilis fluxionibus molestatur, si uenę sectiōe, aut purgatione sunt euacuādi. uenę sectiōe, qñ sanguis atrabile infectus ē purgatione uero, qñ ad atrā uergūt bilē egrotantes. Si uero ambo hæc simul redundarint, non

7. Aph.

60.

66

66

Vnguentum

Vetus ratio

Atræ bilis fluxionibus

Tophorū
Curatio

An balnea
um condu
cat podag
gricis.

Quomo
do quis a
podagra
le tueatur

non unum aliquid ex prædictis adhibere suffecerit, sed præfecta uena, deinde purgante medicamento utendum: quod ipsum et in aliis passionibus duplici euacuatione indigentibus erit faciendum, ut lib. 2. Paradoxorum abunde monstrauiamus. In principio autem morbi, et in ipso uacuationis tempore, reprimentibus, et sensim simul calefacientibus utendum est. Post euacuationem uero his quæ sensim calefacere, attenuare, et discutere possunt utemur, de quibus supra abunde est dictum. Ceterum quoniam topi et duri tumores subinde in articulis creantur, modo ob humorum qui ad eos decubuit crassitiem, terrestremque duriciam, modo propter immodicum discutientium et resiccantium medicamentorum usum, sine earum quæ molliendi facultate pollent mistura. Ad quos certe depellendos ea quæ in Cap. de Lienis duricie ducta sunt, conferunt. Item uetustissimus acerrimusque caseus cum suille carnis præpinguis et ueteris decocto contritus, et superius positus. Ad hoc malum conducunt etiam ficus triti, et impositi. Item althea bis cocta, auena, urtica, bryoniæ radix, bulbi, anethi, abrotoni, buphthalmi, marrubiique folia: ita ut singula prædicta cum pice, et sulphure uiuo permisceantur. Admiscendi etiam adipēs suillus, caprinus uitulinus, et anserinus. Medullæ item omnes, et alia quæ emolliendi ui prædita sunt. Balneum sanè ne si lentio transeamus, post inflammationum remissiones omnibus podagricis commodissimum existit. Dum lauant, spongiæ aceto et sale permixtis madefactæ, locis patientibus circumponendæ, ut à fluxione immunes permaneant. Lauare autem eos non semel tantum, sed iterum atque iterum in aëre per omnia modo rato opus. In aqua tamen calida non diutius morandū. Consultissimū itaque, ut aqua calida perfundantur. utile est, ut totum corpus lintheis siccis pfricetur. Præterea curati à podagra, hac se ratione à podagra deinceps

inceps tuebuntur. Si primum bis in anno, modo nihil sit quod id ipsum prohibeat, sanguinem largè detraxerint, uere nimirum et autumno. Dein si iisdem temporibus, et crebrius etiam, medicamentis purgantibus usi fuerint. Cibus etiam ut demant, et à satietate sibi caueant necesse erit. Utendum quoque cibus concoctu facilibus, et qui prompte in partes corporis distribuantur, et excrementis uacant. Vino aut prorsus abstinendum, aut parcè utendum. Exercitiorum creber sit usus, idque ante cibum. Labores enim, Hippocrate nostro teste, cibos præcedere debent. Et ut rem in pauca contraham, hoc perpetuo secum mullerent Hippocratis, ut breuissimum, ita saluberrimum præceptum: ἀσκησις, ὡς γίγνεται, ἀκοσίη τρυφῆς, ἀκοσίη πόνων: hoc est: Sanitatis studium est, non satiari cibus, et impigrum esse ad labores. Somnus etiam et uenerea, ut idem docet, sint mediocria. Quod ad præsidiorum partem attinet, sal minutim in oleo tritus, et articulis affricatus, omnes qui se ab hoc malo uindicare uolunt, magnificè iuuat: nisi præter modum sicca intemperie sint præditi. eoque illitu et mane et uesperis per totum uitæ curriculum, utendum est.

6. Epid.

Par.

4 Aph. 23

6. Epid.

Par.

4 Aph. 20

6. Epid. 6

Par.

Aph. 5.

LIBRI TERTII FINIS.

LEONHARTI FUCHSI

DE MEDENDIS

FEBRIBVS.

LIBER QVARTVS.

De Diaria. Cap. I.

Diaria fe-
bris quæ.Tria pri-
ma febrili

Causa.

Signa.

DIARIA Febris, Græcis ἐφ' ἡμέραν dicitur, quod eius unica sit accessio, uno magna ex parte die, ex ipsius saltem natura, circumscripta. Nec ab re adiectum est, magna ex parte. sunt enim febres aliquæ ut sunt quæ ex densatione meatuum oriuntur, quæ etsi in tertium usque diem extendantur, ut Cap. secundo latius dicemus, nihilominus tamen diariæ nominantur. Quamuis enim de substantia ipsa talium febrium diariæ uocabulum non sit, tamen clarioris simul breuiorisque doctrinæ gratia, cum natura eadem his sit quæ aliis diariis, non obstante quod nomen non sit idem, diarias etiam appellare licebit: ne scilicet præter tria prima febrium genera, quorum unum est in quo spiritus plus iusto incalescit, alterum in quo humor putrescit, et tertium in quo corpus et solidæ eius partes febrilem calorem ut habitum susceperunt, quartum excogitare necessesse sit, ut copiosius Gale. lib. 9. Ther. meth. Cap. 1. docet. Fit cum absque ulla prorsus putredine spiritus præter naturam incalescit atque succenditur. Id quod fit ob densitatem cutis, uigiliam, cruditatem, tristitiam, timorem, iram, curas animi uehementes, uisionem à sole, refrigerationem, lassitudinem, famem, ebrietatem, et inguinum tumores. Signa uero quibus deprehenduntur diariæ febres, duplicia sunt, quæ enim communia

munia omnium diariarum, & hæc numero sex sunt. Primum quidem pulsus. omnes enim diariæ, Gal. lib. 3. de Prædictione ex pulsibus autore, in magnitudinem, celeritatem, crebritatemque pulsus, quantum in ipsis est, mutant. Exquisitè autem seruant eam quæ secundam naturam est equalitatem, mollicitem, & ordinem. Alterus, urina: prima siquidem statim die urina concocta apparet, & benè colorata. Tertium, caloris qualitas: quæ in omnibus suavis & mitis existit. Quartus, de clinatio: quæ in singulis cum sudore, rore, aut omnino cum aliquo optimo uapore accidit. Quintum, defectus malignorum symptomatum. Sextus, quia omnes a causa extrinseca, (quæ præmitiuam uocant) oriuntur. Quæ singula copiosius recēset Gal. lib. 1. ad Glauc. Cap. 2. Et lib. 1. de Diff. feb. Cap. 7. necnon lib. 2. de Crisib. Cap. 13. Quædam etiam sunt signa quibus particulatim quæuis diaria dignoscitur, quæ traduntur a Gale. lib. 1. de Diff. feb. Cap. 11. & lib. 2. de Crisibus Cap. ulti. lib. 1. ad Glauc. Cap. 2. Quare consulto iis omnibus. omissis, ad curandi generalem rationem descendamus: quæ primum per uictus rationem perficitur, cuius quidem in omnibus diariis simpliciter appellatis communis intentio est, ut cibi boni succi, & concoctu faciles, ac distributioni idonei præbeantur: uictis a sole quidem & iratis, qui refrigerent & humectent: refrigeratis, qui minus nutriunt, & moderate calefaciunt. uigiliis, aut tristitia, aut nimia cura pfectis, qui humectant pariter ac somnum præciliant: defatigatis, qui maxime nutriunt. Ceterum in quibus corporis intemperies calidior & siccior est, hos in primo statim accessionis insultu cibare oportet. nisi enim quis hanc naturam statim cibat, ocysime in ea diaria febris mutatur in acutam. Vicinum omnibus diariis simpliciter nominatis aquosum, album, & tenue conuenit. nam præter id quod concoctionem iuuat, urinas et sudores prouocat. Sed uigiliis, aut curis, aut tristitia maceratis uberius concedendum.

uictus.

defati-

Curatio

defatigatis, quantum conficere possunt, itatis tamē, nisi omnino ab affectu quieuerint, uinuz non tuto datur: ut fufius Galen. lib. 1. ad Glau. cap. 3. docet. Porro curare oportet omnes diarias simpliciter dictas balneis, sic tamen ut eos qui ob lassitudinē aut inguinum tumore febricitant, prius dulci tepidoq; ac multo oleo suauiter perfricatos, ad dulciuz aquarum balneum ducamus. Si uero eos qui inguinum tumore febricitant, in aēre balnei immorari iusseris haudquaq; nocebis. Reliquos omnes q; citiss. oportet ab aēre semouere. Qui ob uigilias, curas, tristitiā atq; iram febricitant, eos quidem plurimum lauare subinde non oportet. ueruz oleo magis nihil adstrictionis habente affatim perfundendi, parceq; fricati pro consuetudine lauandi sunt. A solis uisione febricitantes, statim initio refrigeratione, & crebriori. balneis aque dulcis, solaq; exigui. olei perfusione citra frictionem curare oportet. Sint autem quæ refrigerant capiti admota, rosaceum q; salis expers sit, aliaq; eiusmodi que lib. 1. Cap. 3. dicta sunt. Hec autem frigefacta deinceps lana excipienda sunt, ac suspensa in sublimē manu exprimēdo syncipiti instillanda, idq; assidue donec febris inclinauerit. postea in balneum eger ducendus. Si quis ex frigore febriat, is quoq; ad balneuz in febris declinatione est ducendus, caputq; ante & post lotionē irino oleo aut nardino aut simili fouendus. Qui ob famem febricitat declinante accessione ad balneum ducendi sunt, plurimoq; oleo dulci ac repente perfusi molliter perfricandi, diutiusq; in solii calidi aqua cōtinendi. egressis uires reficiendę, inde rursus ad balneū ducendi. Vbi denuo egressi fuerint, sedata balnei pturbatiōe aqua calida propinanda, tum ptisanę cremor exhibendus, & interdum ex albo iure pisces saxatiles. Si ob cruditatem febris diaria oritur, considerandum erit, an aluus lubrica sit, an adstricta, ubi lubrica est,

7 ca.

et ea tantum quæ corrupta fuere, uacuata esse uidentur, tum lauandum tum nutriendum in remissione febris: sed iis quæ sunt circa uentriculum prius consulentes. Sin ita multa inanitio aut prius facta sit, aut nunc etiam in homine duret, ut uirtus iam defessa sit, satius est omissa lauatione cibare, sed consulentes prius iis quæ circa uentrem sunt. Consuletur autem laborantibus, si modo uacuatio amplius non dureret, irrigatione uentriculi ex oleo et absinthio, et aliis quæ supra lib. 3. Cap. 1. de Imbecillitate uentriculi dicta sunt. Sint autem ea quæ uentriculo imponuntur abunde calentia: quippe quæ tepida sunt, omnia uentriculi firmitudine dissoluunt. Si uero omnino uenter adstringitur, contrectatis hypochondriis, mox toto uentre, considerandum nunc cibis in gracile intestinum, aut in colon descenderit. Si alimenta in uentriculo adhuc persistant, conetur eger plurima tepida aqua epota, immisso digito aut penna, totum quod infestat euomere. deinde fouendo hypochondria quiescere. At ubi iam ad intestina alimentum descenderit, iubendum ut declinui facie ac uentriculo recumbant, uenterque fouendus, ac somnus conciliandus. Post somnum ad educenda excrementa glans supponenda, aut leui clysteri aluus mouenda. Qui ex inguinum inflammatione febrem conceperunt, ne medicum quidem interrogant quid sit faciendum, sed ulceri tantum ob quod inflammatio euenerit intendentes, declinante exacerbatione lauantur. Arcendi uero à uino omnes qui sic febricitant, tenuisque illis uictus quousque liberentur adhibendus. Hactenus quam breuissime potuimus febrium diariarum curationem prosecuti sumus: quam copiosius tradit Galen. libro octauo. Ther. meth. et in primo ad Glauconem.

Tepida
uentriculi
robur dis
solvunt.

R De

De diaria ex obstructione meatuum. Cap. II.

Causa. **F**ebriſ que ex ſtipatione meatuum oritur, ei uſde nature eſt cum diariis, Gal. lib. 9. Ter. meth. teſte deſiſtit enim poſt primā acceſſionem, ſi quis eaſ recte traſter: ideoq; inter uerē diarias non obſtante quod eius acceſſio interdum ultra unum diem porrigatur, recte cōnumeratur. Dicitur alio nomine ſynochus citra putredinē, aut diaria plurium dierum, ut ex loco Galeni iam citato ſit euidentiffimū. Accidit autem ſtipatio uel obſtructis exilib. meatib. uel conuenientib. uel et corpore ipſo immoderatiuſ deſato, id q; à frigore, aut q̄litate uel balnei, uel medica menti acerbā & adſtringente, ſole feruente, & aliis que cutim ſiccare poſſunt euenit. Quia uero propter ſtipationē intra corpus ſumida fuliginōſa q; excrementa detinentur plurima, foras autē quod de iis effluit exiguum eſt, ſit ut febrem accendat. Deprehenditur primū tactu: neq; enim denſitas tactū exercitatuſ latere poteſt. Dein motu caloris, qui primo quidē inſuſtu mitis apparet, poſtea tñ ubi p̄durauerit acrior euadit. Tertio ex urina, que neq; craſſitudine, neq; colore a naturali multum eſt aliena. Quarto ex tumore corporis, qui manet, nec collabitur. Oculi etiā non ſunt concaui, ſed prominenciores, & humidiores quā ſecundū naturā. Quinto ex pulſu qui q̄lis maximus, celer, frequens, & uehemens exiſtit. Qui ita laborant, ſi recte curabūtur, iis ſanguinis miſſio eſt adhibenda, tantumq; ſanguinis eſt detrahendum, quantū uires tolerant. Pro certo quoq; habendum (niſi iis quī hoc per naturā ſunt habitu, id adhibeatur p̄ſidium) fore ut uel ſuffocentur, uel certe ſyncope omnino periclitentur. Corpore uacuato, poſt aut nutrimentum, aut medicamentum ex iis quæ de tergeant, exhibebis. Quæ aut hoc in febrib. p̄ſtant in alimentorum ratione ſunt ptiſana & mulla: in medica-

dica.

dicamentorum, oxymeli, & quęcunq; incoquere in
 mulsa licet, ceu calamintha, & hyssopum, & origanū,
 & serpillū: & iris: & apium. Verū hęc omnia iusto cali-
 diora sunt, ideoq; febres accendunt, ita utiq; ut ui-
 num. Oxymeli uero solum nec febres accendit, & stre-
 nue deterget, sic ut ea quę glutinosa crassaq; sunt dis-
 soluat, & meatus obstructos liberet. Tertio die mane
 si uideris minimū esse quod de febre relinquitur, ac
 neq; putredinis humorū in pulsu nota subsit, neq;
 in urina cruditatis: suspecta uero hora, qua primo
 die febris occupauit, extra meridię sit ac præterierit
 audacter hominē quā ocyssimē lauabis, longe an-
 te sextam horam. Abunde tamen sit, si intra tertiam
 horam lauationem cōpleueris. Ad eundem modū
 si decimaz horam suspectam habueris, usq; ad septi-
 maz laues licet, quū tres æquinoctiales horas, qua-
 tuoruē inter balneū accessionisq; tps interponi, abū-
 de sit satis. Vbi in balneo corpus icaluerit, oleo pus-
 dulci tepido unctum, ac moderatiss. frictū mox deter-
 geri extrinsecus abluīq; debet. Moderatiss. autē deter-
 gent erui farina, tū hordei, tum fabarū. Post balneū
 præter aquam q̄ parum apii incoctū in se habuerit,
 nihil his est offerendum. Licet quod inter balneū &
 suspectas horas spacium erit, triū ferē horaz cōiicia-
 mus. Si uero circa uesperā aut duab. horis citius ac-
 cessio inuadet, tū lauissē mane licebit, tum cibasse,
 sed tm̄ ptisanę cremore. Deinde si suspectę horę ni-
 hil afferāt, & lauare rursus si uelit licet: & cibare. Sin
 aliquid eueniat, & conferendum id est cum accessio-
 ne quę primo die inciderat, & tum urinę consideran-
 de sunt, tum etiam pulsus. Quę omnia profecto me-
 diocria apparebunt, ubi exigua relinquitur obstru-
 ctio. Quare ipsum & lauabis. 4. die: & cibabis: ad iam
 dictas considerationes spectans: sperabisq; nihil qn-
 to die superuenturum. At si magna obstructio facta
 sit, ea febris ex diariarum genere non erit.

R ii De

Detergen-
 tia, citra ca-
 lefactio-
 nem

Synochus.

Continens febris.

Differentia tres.

Synochorum.

Acmaestici.

Epacmaestici.

Paracmaestici.

Causa.

Qui synochis maxime corrumpuntur.

Σύνοχος Græcis, febris est in qua una accessio ab initio ad finem perpetuò manens, in multos porrigitur dies. uel est, quæ omni mutatione magna usq; ad iudicium caret. Latinis potest dici continens. Huius autem febris duplex est natura. quædam nãq; notam putredinis prorsus nullam habet, & hæc ex diariarum februm est genere, ut diximus Cap. prox. & synochus non putrida uocatur: de ea hic nobis sermo non erit, quædam autem manifestam obtrinet putredinis notam: hæc est, de qua hic agitur, & dicitur synochus putrida. Februm uero quæ synochi seu continentes dicuntur, tres sunt differentiæ. nã quædam earum à principio usq; ad finem equali magnitudine perdurant, & dicuntur græcè ὁμότροποι καὶ ἀκμαστικοί, hoc est in eodem uigore permanentes. quædam semper augentur, & adiiciunt exiguum aliquid, Græci αἰναστικοὶ καὶ ἐπακμαστικοί, id est in clementum succipientes nominant. quædam paulatim diminuuntur, παρακμαστικοί Græci uocant: hoc est decrescetes, quemadmodum fufius tradit Gal. li. 9. The. meth. & lib. 2. de Diff. feb. Cap. 2. & lib. 2. de Crisib. Cap. 6. Putrida synochus fit ab iisdem causis, à quib. non putrida, nempe à uehementi stipatione quæ intra corpus febrilem calorem cohibet, & efficit ut in omnib. uasis, ac potiss. maximis equabiliter humores putrescant. quæ cunq; enim calida & humida sūt, difficilēq; trāspirationē habēt, ea facile quoq; putrescūt. Hinc est q̃ hoc genus febris nec in gracilib. uel q̃ raro sunt corporis habitu, nec in frigido corporis tēperamēto, nec in frigida estate excitetur: sed estate & tēperamēto calidis: ac præcipuē si & carnosus, & bono ac multo sanguine affluens, & denso corpore eger sit, aut etiam calidis excrementis refertus. Ex his itaq; constat, q̃ sanguis qui in uniuersis uasis, præsertim maxima

maximis circa alas & inguina existentib. equabiliter exuberans putrescit, synochi putridę causa existat. Qui ita febricitat, iis & pulsus maximus est, uehemēs, celer, creber, & æqualis, haud secus ac in synocho nō putrida, & uehemens. constitutio etiam arterię nec durior quā pro natura est, nec mollior: celeritatis tamen & frequentię eō peruenit, quō febris ipsa magnitudinis. Atq; hęc quidem (ut diximus) ambarum communia. alteri uero de qua nunc agimus priuatim putredinis insunt notę, idq; tum in urina, tum pulsu, tum caloris higrata qualitate. Curandi ratio ut in synopa non putrida, à sanguinis missione au-
ingratu
 spicanda. Et ualida existente uirtute, nulloq; alio in signiter repugnante, sanguis usque ad animi deliquium auferendus. Maximum enim hoc, Galen. lib. 9. Ther. metho. autore, ubi ualentes uires sunt, synochi febris remedium est. Primum namq; in cōtrariū statum agitur corpus, celerrimē ex animi defectu refrigeratum. Hoc uero nemo inuenire potest, neq; q̄ ipsis egris neq; quod naturę quę animantes gubernat, iucūdius utilius uē sit. Postmodum in eiuimodi corporib. necessario superuenit alui deiectio, nōnūq; etiam bilis uomitio. quas res statim à toto corpore sudores excipiunt. Quod si uero curare aliquando egrotum cogeris, cui non solum antea secundæ uenæ remedium prætermisum est, sed nunc quoq; uel per medicorum ignorantiam, uel ipsius laborantis propinquorumq; eius timiditatem, procedente tēpore mittere sanguinem prohiberis, ad frigidā exhibendam accedes: sed diligenter antē discernens, quātum ex ea nocumentum contingere possit. Nam si id aut exiguum erit, aut nullum, offerenda potui est q̄ prorsus sit gelida, quantum bibere egro libet. Quin-
 imo magis id audebis, si frigide potioni insueuerit. Sin magnum timetur incommodum, ab hac quidē abstinendum, atq; aliis auxiliis quib. obstructio exi-

R iii matur,

Curatio

Sanguinis
missio.

Quando
frigida
adhibenda

*Frigida
quibus in
comodat.*

matur, et abundantia uacuetur, et febris feruor deferebat, ut edū. Quę singula è suis locis tibi petēda erūt. Porro incōmoda q̄ frigidā potionē intēpestiuē, imo diceq; exhibitā sequūtur, hęc sunt. Primū, quia lentos crassosq; humores, siue obstructiones, siue putredinē, siue phlegmonē, siue erysipelas, aut scirrū, aut oedema creauerint, attenuari digeriq; phibet. Quoties igitur ex iis febris accēditur, ad eorū uacuationē frigida data non cōducit. Ad pręsens tñ non parū adfert leuamē, propterea quod iā accensā febrē extinguit: uerum quū causa eius adhuc permaneat, aliā de nouo accendi febrē est necesse, atq; ea quę pręcessit nonnunquam difficiliorem: propterea quod densatum ex frigida corpus est. Alterum incōmodum est, quod multas laborantis imbecillas particulas, siue ita se ex naturali intemperie habeat siue ex uitio adscititio, lēdit. Sic cōpertū est aliis gulā adeo uehementer esse lēsam, ut uix deglutirent. Aliis uentriculū, ut uix cōcoquerent. Aliis ipsum uētriculi os, aut iecur, aut colōn, aut pulmo, aut septum transversum, aut renes aut uesica, aut tale quippiam aliud à frigido percussū, ad propriam actionem infirmum est redditū. Nonnulli autem ex intempestiua immodicaq; eius potione non multo interposito tēpore, nec postmodum, sed illico difficultate spirandi, et conuulsione, et tremore correpti sunt, ac toto (ut semel dicā) neruoso genere lēsi. Vt itaq; in pauca rem cōtrahamus quibuscūq; in ptincipe particula tumor aliq; phlegmonodes, aut oedematodes, aut scirrhus constiterit, iis frigidam offerre non oportet: sed nec iis quibus obstructio putridusue humor non concoctus incōmodat. Quod si uero euidentes percipis absq; iā dictis tumoribus cōcoctionis notas, neq; pars aliqua temperamento adeo frigido fuerit prędita, ut in hęc noxā procumbat, audacter frigidam dabis. quippe solidarum animalis partiū natura roborata, prętenua-

lis

tis iam humoribus opponitur: ita ut qui utiles sint, atq; ad nutriendum habiles, hos quidem ad se trahat inutiles uel per uentrem, uel per cutim eiiciat. Quod si etiam frigida assuetus eger fuerit, maiori cum fiducia frigidam exhibebis, ipsa scilicet experientia iam edoctus omnia uiscera eius occursum familiariter tolerare. Omnino namq; si quod frigidum adedum esset, ut ab hac offenderetur, per sanitatis id tempus euidenter offensam suam ostendisset. Ex his perspicuum fit, continentium febrium maxima remedia esse hec duo, sanguinis detractione, et potionem frigidam. Verum illa nullo non tempore, modo uires sustineant: hec quum et in pulsu, et urinis coctionis euidentes cernuntur notae, febris autem est maxima. Vietus ratio hec potissimum fit. His quibus secta est uena, post duas a sectione horas priusque cremorem exhibebis, quietemq; imperabis. Vbi a somnio excitati fuerint, rursus potius sanum cremorem prebendus. In hac uetus ratione usque ad tertium diem persistendum. Animaduertendum tamen in synochis febribus tum alendos esse egros, quo tempore sani consueuerant, et ubi maius leuamen sentiunt: ita enim alimentum facilius ferent. Quod si uires robuste fuerint, et uigor morbi, statim expectetur, tenuissimo uictu, et eo qui iam dictus est utendum erit: sin contra uires imbecillae fuerint, haud sine ingenti dispendio uictus tenuis exhibetur. ergo in cibis offerendis uirium robur diligenter perpendendum. Hec de curatione febris continentis putride sufficiant, plura si desideras, nemo desiderio tuo rectius satisfaciet preter Galenum, qui lib. 9. Teraph. methodi hac ex professo et copiosissime docuit.

Epilogus
curatio
nis.

Viētus ratio.

De continuis febribus. Cap. III.

Continuae febres sunt quae non desinunt ad intermissionem, remissionem tamen in singulis accessionibus habent. Differunt igitur a synochis.

Continuae
febris
quidam

R. IIII chis,

*Causa.**Signa.**Differen-
tię tres fe-
brium cō-
tinuarum.**Curatio.*

chis, quod scilicet he nullam prorsus feruoris remis-
sionem obtineant, unicaq; illis sit accessio, que ab
initio ad finem usque perpetuo manet. Fiunt pro-
pter humores qui intra uasa putrescunt: hacq; ratio-
ne ab intermittentibus differunt, in quibus humo-
res eas excitantes per singulas corporis partes disper-
guntur, quo fit ut delationis impetu ipsę per se ipsas
expurgentur. Nullum certius inditium febrium cōti-
nuarum est, quàm quod nulla illarū ad infebricitati-
onē perueniat, donec ex integro desierint. Atq; à si-
nohis facile discernuntur per remissionem, quā in
singulis accessionibus obtinent. Sunt autē febrium
cōtinuarum tres differentię, quę iuxta humoris in-
uenis putrescentis diuersitatem procreantur. Si enī
flaua bilis putrescat intra uasa, tertiana cōtinua, quę
alio nomine καύσος Grecis, ardens uero latinis no-
minatur. Si pituita, quotidiana cōtinua ueluti si atra
bilis, quartana cōtinua nascitur. unde liquet, cōtinu-
as febres idem habere genus cū intermittentibus. cū
tertiana quidem exquisita, exquisita ardens: cū quo-
tidiana uero ea quę quotidie quidē facit accessionē,
sed nunquam desinit ad infebricitationē. Cū quar-
tana illa quę quouis die inuadit, sine ulla intermis-
sione. Porro quum continuę febres ex putridarum
sint genere, necesse erit ut qui illas curare uolet, pu-
tredinem inhibeat. Ita duę statim se indicationes
exhibent, quarū altera à febrī, altera uero à putredi-
ne sumitur. Atq; à febrī rursus duę, scilicet ut portio
febris quę iam accensa est, percuretur: quę uero in
generatione est, inhibeat. Alięq; duę à putredine,
ut quod putredinis iam factū est, sanemus, & quod
in generatione adhuc est, sistamus. Porro quod in ge-
neratione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac
quoq; alię duę indicationes nascētur, tum ut quod
retentū est uacuetur, tū quod retinendū est prohibea-
tur. Sanē prohibebitur iis præsidiis, quę obstructio-
ni me-

ni medentur. Huius rursus obstructionis quod iam occupauit, sanandum est: quod futurum est, propulsandum. At curabitur quidem obstructionis quod iam factum est, per ea quae obstructa liberant. propulsabitur quod futurum est, si affluxum obstructuentium succorum compescamus. unde satis liquet, quod ultimum in ipsa resolutione methode est inuentum, id primum omnium in curatione est peragendum. Quum itaque particulae rem expendentibus, quinque sint in febribus continuis à quibus indicationes colliguntur, febris nimirum, putredo, perspiratio impedita, obstructio, humorum destruuentium copia, à postremo curandi ratio auspicanda erit. Copia itaque humorum requirente uacuationem, principio, si ualida fuerit uirtus, tempus et aetas, atque alia consentiant, sanguinem mittere oportet. Vacuata multitudine ad alterius, puta obstructionis, curationem accedendum, medicamentisque iis quae obstructiones tollere possunt utendum. Verum quoniam horum pleraque calida sunt, metus est ne tum putredinem, tum febrem augeant. Itaque iis quae citra calorem liberare ab obstructionibus ualeant, utemur. Qualia uero haec sint diximus supra, capite nimirum secundo huius libri. Vbi autem quae obstructuunt deterfa dissectaque sunt, per aluum, urinas, et sudorem ea uacuare tentandum. Quum uero materiae quae haec efficiant etiam calidae sint, necesse est interea tum putredinem tum febrem augeri. Quare quoad licet, id agendum, ut quae minus calefaciat materia deligatur. aut si qua inueniri potest quae non calefaciat, quae admodum in hoc casu balneum, utique ea petenda est. balneum uero id posse Galenus lib. tertio de tuenda ualitudine iis uerbis docet: Dulcium calefactum aquarum, sit tepidiores sint, uis humida et frigida est. Et paulo post: Balneum si probe adhibeas, duras et tensasque partes emollit, excrementum, putremque si quod intus ad cutem heret, euocat. His itaque peractis, et deterfis iis quae

Vena se
ctio.

quæ cuti impacta fuerunt, atq; adeò obstructione ac impedita perspiratione amota, ad putredinis curationem ueniendum est. Hoc itaq; tempore etiam uires roborare, quo & putredinem superent, & succos concoquant, studebimus. Putredinem etiam sanabimus. si id quod iam corruptum est, omni ratione uacuabimus, quod reliquum est, moderatis motibus & refrigerante perspiratu, ad exactam mediocritatem reducemus, ac uacuationem eorum per urinam, deiectiones, uomitum, ac sudores moliemur. Vltimo ad febris curationem progrediendum, quæ quidem per refrigerantia fieri solet. Omnis. n. febris, qua febris est, humectatio refrigeratioq; remedia sunt. Quæadmodum aut horum quodq; recte fieri debeat, partim antea dictum est, partim etiam in sequentibus commemorabitur.

De ardente febre.

Cap. V.

Ardens
febris.
Causa.

4. Aph.
18.

Signa.

Curatio

Ardens febris est, quæ Græcis (ut supra quoque dictum est) καὶ ὄρος uocatur. Estq; ex genere continuarum. Fit, quando flaua bilis in uenis putrescit atq; adeo cum tertiana intermittente, eo quod ab eodem procreetur humore, comunicat. Differt autem, quod in hac per totum corpus bilis defertur, in ardente autem febre flauæ bilis humor in nasus una cum sanguine continetur. atq; ob eam etiam causam in adurente febre singulæ accessiones ad infebrecitationem non perueniunt. Quando uero in iis bilis etiam uehementius agitatur, & à natura inualecente compellitur, tunc rigor superuenit, & febris soluitur. Id quod Hippocrates in Aphorismis iis innuere uerbis uoluit. A febre ardente habito rigore superueniente, fit solutio. Dignoscitur uero iis notis. Lingua eorum qui hac febre affliguntur, arida fit crassa, aspera, & nigra: uentriculi erosio, fitis intolerabilis, uigilia, nonnunquam etiam delirium eosdem infestat. Deiectiones etiam pallidæ sunt. Quod ad curandi rationem

nem attinet, prima febre ardente laborantium præfida sunt, ut decumbant in frigido loco ad suauem auram exposito, à qua purus diffletur aer, culcitra etiā molli, quæ frequenter sternenda est. Stragula tenuissima sint, et minime sordida. quæ assidue mutantur, habeatq; lectus insignem latitudinem, ut ad diuersas subinde partes membra calefacta transferri commodè queant. Tum aer ignauior flabello excitetur, pectus ac stomachus foueantur palmulis cum rosaceo, aut oleo cotoneorum tritis. Conueniunt et alia refrigerantia medicamenta, ut sunt palmites, intybum polygonum, plantago, ramenta cucurbitæ, lactuca, oxalis, folia uitis, et similia. Sudariolum quoq; tenue cōplicatum, oleoq; et aqua calentibus madefactum, stomacho et pectori applicetur: id enim febrium ardorem mirum in modum sedat. lana quoq; quantum manu capitur aq̃ et oleo rosaceo calefactis imbibita è sublimi in pectus expressa, feruoris uehementiam facile obtundit. Hec autem calida esse oportet. nam tepida membrorum uigorem exoluunt. Nec frustra in ardentissimis febribus etiam acetum admiscebis. Cibi offerendi sunt, quibus refrigerandi et humectandi uis inest: qualis est lactuca, cucurbita, cremor ptisanæ, et similes. Potus sit decoctum cinamomi, aut omphacium: et si asueuerit æger, post cibum frigidam deglutiedam dato, quantum est cochleare unum aut duo. Vel cū decocto hordei misceantur iuleb. ut uocant, uiolarū, rosarū, et iis similia. succo præterea solarū rosarum stomachū recreabis: atq; alias refrigeratiōes machinaberis, uirentibus uitis, rosarum, nymphæ, uiolarū foliis et floribus, solum sternendo, et aquam frigidam sæpius irrigando, riuulosq; aquarum moliendo, quæ ex propinquo suauiter instrepant. Inter initia uero statim, si ætas tempus, uirtus, et alia eiusmodi permiserint, uenam incidere oportet, ut ex Capite præcedente etiam satis liquet. Epithemata uero et reliqua

Tepida
membrorum
uigorem
exoluunt.

et Elixir
lib. 5. cap.

Vena se
ctio.
Epithema
ta quo tē
pore adhi
bendi.

⁊ reliqua refrigerantia in principiis ⁊ incrementis accessio-
 num non sunt adinouenda: hoc enim tempo-
 re corporis affectus adhuc ambigit, ⁊ calor uiscera
 obsidet: quapropter adhibita calorem in profundū
 repellendo, maioris nocuenti occasionem præstāt
 igneus enim calor intus repressus, uehementiori rur-
 sus ardore excitatur: sed in uigore, calore iam per
 uniuersum corpus explicato. tum enim residuum ca-
 loris præter naturam circa uiscera derelictum, prom-
 pte extinguetur. Hinc egri melius spirare incipiunt,
 ⁊ leuiori siti infestantur. Quidam etiam rorido efflu-
 te uapore deliniri, somnum capeffunt. Sint autem epi-
 themata eiusmodi, quæ ꝑ. succi rosarum, lactucę añ.
 3. iiii. s. succi intybi domestici. 3. ii. s. aceti optimi. 3. i.
 s. santalorum omnium añ. 3. i. caphurę gr. iiii. misce,
 fiat epithema. Porro instante totius morbi uigore,
 ⁊ nullo eorū quę dicta sunt Cap. 3. prohibente, dā-
 da sincera frigida. In curatione siquidem febrium
 ardentium horum alterum fieri necessarium est, si p-
 fecte morbus solui debet: aut biliosos humores ex-
 cerni, aut eosdem extingui. Excernuntur itaq; per
 uenę sectionem, sudores, uomitiones, ⁊ aluū. Ex-
 guuntur autē frigide potu, quo ardentissime febres
 non raro ex toto curantur. Ceterum balneū his
 solum usui est, qui citra tumores inflammationi aut
 erysipelati consimilem, ardenti febre laborāt, in uri-
 nisq; apparuerint coctionis signa. Aeger qui lauacro
 frigido uti uult, sit iuuenis, carnosus, tps quoq; est
 uum ac constitutio anni calida ⁊ sicca, nec eo utat
 nisi in febris uigore: idq; maxime faciat, si frigide lo-
 tioni assueuerit. Moderetiori uero existente febre, ro-
 bustaq; uirtute, sinui cū coctionis notis, conferunt
 dulcis tpatęq; aque balnea: hæc. n. refrigerant ⁊ hu-
 mectant, ut diximus. Exunctionibus chamemelini
 oleū ē, si plinens aer frigidus sit, puenit. Mag ex q
 remedia ardētū feb. cōponūt, copiā, ex seq. petes ca.
 De

Epithema

la.

Aqua fri

gida quā

danda

Balneum.

De exquisita tertiana intermittente. Cap. VI.

Tertiana quidem febris intermittens exquisita est, quæ ex flaua bile per sensiles corporis partes delata oritur, et sui ipsius naturam puram atque synceram seruat, et dignoscitur iis notis. In biliosis corporibus natura corporibus consistit, et uigenti ætate, tempore æstiuo, et calidis et siccis regionibus, similiq; æris constitutione, uita etiam laboribus, uigiliis, curis, ac solis feruori addicta. Ad hæc in eo quoque facile tertiana exquisita accenditur, qui cibis ac potionibus calidis et siccis antea usus est. Hæc etiam statim ab initio inq; singulis accessionibus rigorem uehementem affert: qua una ratione ab ardente febre, ut antea commemoratum est, differt. A quartana uero rigore in hoc distat, quod corpus pungeret, ac ueluti ulcerare uideatur: cum quartana refrigerationem habeat simillimam ei quæ hyberno tempore sentitur. Tertianam itaque febrem non contingit fieri sine rigore uehementi, pungente ac uulnerante carnem. Quartana uero, neque primo die statim cum rigore inuadit uehementi, nam progrediente ipsa atque augetur, una etiam rigor augetur: sensusq; egrotantium non est quasi eorum qui punguntur, sed potius qui refrigerantur, et ueluti ad ossa usque molestantur. Est quoque in tertianis pulsuum exactus ordo et equalitas, qui tamen ad uehementiam, magnitudinem, et frequentiam in accessionum incremento excitantur. Præterea et sitim in uigore inuehit, ac hominem exurit ut abiectis uestibus eger denudetur, ampleq; et frequenter spiret, exuffletq; ueluti flammam, frigidamq; potandam flagitet. Calor equaliter subinde per totum corpus extenditur, nihiloq; magis thorax quam extrema calent. Et si manum injeceris, occurrit primum plurimus ac mordax calor, et cum aliquo ueluti uapore elatus, non multo tamen postea à manu euincitur. Et
iam

Causa.

Tertiana

exquisita.

Signa.

Quarta

na rigor

quo distet

a rigore

tertiana.

Tertianæ
exquisite
Curatio.

Potus.

iam bibendi tempus adest egrotanti. Vbi uero potione fuerit recreatus: statim copia uaporis calidi per cutem emergit: sudoris nuncia. Bilis etiam uomitio superuenit: aluusque soluitur: et biliosum mingunt. Preterea ad integritatem in febricitatione uenit desinit: ubi accessionis tempus horarum non plurimum duodecim expedierit. Nam hoc tempus longissimum est in ueris tertianis. Quæ singula fusius explicat Gale. lib. 2. de Crisib. Cap. 3. Tertianam autem exquisitamque ex flaua bile commota inualescat quam maxime fieri potest: refrigerare ac humectare oportet. is enim humor inter omnes qui in corpore sunt, calidiorque; sicciorque; existet, Aeger itaque decumbat in loco frigido ad auram suauem, ut Cap. 5. etiam dictum est, exposito. Solum etiam spargatur frequenter aqua frigida, aqua stillaticia rosarum, uolarum, et similium. Humi etiam sternantur folia salicum, uitis, flores rosarum, uolarum, nenupharis ac eiusmodi. Cibis utantur aegri, quibus humectandi et refrigerandi facultas inest. Ex oleis quidem attriplici, blito, malua, lactuca, cucurbita: lapathum, intybus, et similibus. Ex aliis uero ptisanis succo et piscibus saxatilibus. Ex uolatilibus, quæ mollibus præstat carnibus. Quæ uero talia non sunt, eorum alis: testiculis quoque gallorum, suillisque pedibus, et cerebro. Porcello etiam si dederis carnem liquescentiam, nihil nocebis. Sed et oua ad sorbendum sunt offerenda, præsertim uitelli eorum: nam hi facilius quam pars alba concoquuntur. Ex fructibus permittendum, ut illos degustent qui non omnino ad concoquendum difficiles sunt. Abstinentium autem à melle, sinapi, salitis, omnibusque acris. A uino uero, antequam morbus concoquatur, omnino arcendus est. Interim bibat decoctum cinamomi, aut hordei, aut hoc quod est. Zulapii uiolacei. 3. iiii. decoctionis cinamomi lib. 1. misce, fiat potio. Cæterum ubi concoqui coeperit morbus, dandum est ab initio uinum

num tenue, aquosum: & paucum: ubi uero iam prope est ut morbus solvatur, amplius est offerendum. Quod ad somni rationem attinet, in accessione non est dormiendum, sed uigilandus potius, ut sanguinis, spiritus & caloris naturalis ad interiora motio impediatur, atq; adeo in contrarium & ad exteriora retrahatur. alias enim febres uix dissoluuntur, & ad consistendum tempus tardissime perueniunt, fluxionesq; multiplicantur. Finita accessione somnus non improbatur. Exercitia & omnes uehementiores motiones cauenda, ne cum Herodico, cuius Hippocrates meminit, egrotantes interimamus. Animi perturbationes: ira potissimum: timor: moestitia: & similes: fugiende. Non solum uero praedicta uictus ratione, sed medicamentis etiam refrigerare & humectare conuenit. Quapropter haec aut consimilis potio haurienda erit, quae R. florum uiolarum, boraginis rosarum an. M. i. florum nymphaeae. M. s. intybi hortensis utriusq; (endiuiam & scariola hodie uocat) lactuce utriusq; an. M. i. s. pasfularum purgatarum. 3. i. prunorum damascenorum, an. nume. xi. seminum intyborum, lactuce, portulacae cucurbitae an. 3. iii. radicum cichorii. 3. vi. Decoquantur singula in duabus libris aquae fontanae, donec tertia pars consumpta fuerit. dein colentur, & colatus humor saccharo dulcescat, & cum oui candido clarificetur, atq; adiiciantur syrapi de intybo domestico latifolio, zulapii uiolacei an. 3. ii. s. fiatq; potio. Aut si potio egrotati displicet, detur hoc ecligma, quod R. Coseuae uiolarum, boraginis rosarum: nymphaeae, cichorii an. 3. s. diapruronum non solutorum. 3. vii. diarrhodon abbatis. 3. i. Specierum diatria santalorum. 3. ii. cum zulapio uiolaceo quod satis est, fiat ecligma. Non neglige da praeterea biliosi humoris, si res ita exigat, uacuat: sed etiam sanè qui ad stomachum confluit, per uomitum educere oportet. Qua uero ratione fit ciendus, in superioribus libris est annotatum. Euz autem quod ad inferiora repetit,

In accessione non dormiendum.

Decoquantur alterans.

Ecligma.

Euacuatio.

alui

Clyster.

Absyn-
thum.Sudorem
prouocās

Bainem.

alui defectionibus elicere oportet: hoc quideꝝ ꝛ spō-
te fieri solet in tertiana exquisita. Alius itaqꝝ mol-
lientibus clysteribus exinanienda est: qualis est qui
ꝛ. Maluꝝ utriusque, herbe uiolarum, Mercurialis,
intybi domestici, angusti folii, hoc est scariole, añ.
M. i. seminum portulacę, melonum añ. 3. 2. s. Deco-
quantur in aqua iuste quantitatis, quoad tertia pars
absumpta fuerit. Colaturę adiciatur casie fistula-
ris recens extractę. 3. i. olei uiolacei. 3. iii. salis com-
munis. 3. i. s. misce, fiat clyster. Per urinam quoqꝝ ꝛ su-
dore diuertere oportet. Vrīna igitur potionibus,
in quibus apium aut anethum maduerunt, prouocā-
da. Et si coctionis notę apparebunt, iam tuto absyn-
thium dabis: ꝛ alioquin summum est uentriculi re-
medium ubi bilis hunc infestauerit, si pꝛesertim ex
ipsum coma quantum sufficiat accipiens, melicrato
intinxis. Sudorem uero hoc uel consimili medica-
mento euocabis, quod ꝛ. Radicum apii, asparagi, ci-
chorii, añ. 3. s. seminum oreoselini, fœniculi, rusci,
smyrni añ. 3. ii. cicerum nigrorum. 3. iii. anethi. M. s.
Decoquantur singula in aqua fontana iuste magni-
tudinis, colentur subinde, ꝛ colatus humor saccha-
ro dulcescat, ꝛ adiciantur oxymelitis compositi. 3.
ii. ꝛ fiat potio. Aut singula iam dicta redacta in pul-
uerem exhibeantur, qualibet uice. 3. i. aut. 3. i. s. cum
oxymelitis. 3. iii. Idipsum uero in declinatione acces-
sionis, aut die qua eger à febre liber est, faciendum
erit. In hunc usum proderit inunctio ex oleo chamę-
melino, ꝛ anethino, ac similibus. Balnea quoqꝝ cali-
da ex aqua potabili prosunt, tum quia aliquid bilis
educunt, tum et quia sua qualitate plurimū iuant.
Naz huiusmodi balnea humectant, ꝛ potētia refri-
gerant. Marine autę aque, ꝛ salse, nitrose, aqꝫ sulphu-
reę, plus quidem bilis educunt: sꝫ multo minus quāz
potabiles prosunt. Pꝛestat uero neqꝫ ipsas utiles dice-
re, qñ quideꝝ plus qualitate nocent, quāz euacuatiōi-
bus

bus iuuent. Semper autem oportet contrarias quali-
tates illis quę præter naturam inualuerunt oppone-
re: quum hoc multo plus iuuet, quam quomodolibet
bet euacuare. Hęc igitur in balneis intetio fit, ut cor-
pus madeat & humectetur: atque idcirco neque ni-
trum, neque salem, neque sinapim inspergere oportet.
at plurimum oleo calido perfusos egros ad aquam
perducere, ac madefacere. Et si in ea natate uo-
luerint, quamdiu potuerint, permittendum. At qui
balneis admodum delectantur, si etiam bis in die la-
uari permiseris, non aberrabis, ut Galenus peripicue
libro primo ad Glauconem Cap. 9. docet. Verum
illud semper in memoria habeto, ut id in tempore
faciant. Si uero signa iam coctionis ostendantur,
tunc etiam si sepius laueris, nihil delique ris.

De tertiana notha.

Cap. VII.

Tertiana notha fit, quando bilis maxima ex par-
te pituite miscetur. Hinc est quod non singu-
la signa, ut in exquisita, pure bilis naturę præ-
se ferant. In ea etiam accessionis tempus duodecim
horas excedit: neque etiam, ut exquisita, septenis cir-
cuitibus iudicatur. Tardius denique in hac ipsa spu-
ria tertiana coctionis notę apparent, neque tantus
etiam in uigore calor. Accedit quod non finiatur,
ut exquisita sudoris copia. *Victus* ratio non sit in
uniuersum in hac febre, quę refrigeret atque hume-
cet: sed aliquid quoq; assumat q̄ calefaciat & inci-
dat. præiacet enim crassior, neque adeo calida bilis.
Plurimum igitur ea laborantes iuuat ptisanę cre-
mor, adiecto piperis modico, uel hyssopi, uel origa-
ni. Sorbitiones etiam concoctu faciles dandę sunt.
Porro cū accessionis tempus longius sit, atq; adeo
integrum diem duret, non sanè quotidie, sed alter-
nis tantum diebus cibum exhibere oportet. hac enī
ratione ne morbus augeatur cauebimus. Verum cū

S randum

randum etiam unice, ne egrotantis vires, quæ longiori tempore debent laborare, prosternantur. Quapp difficile admodum est seruare utrunq3. quoniam inedia quantum prosunt, ad morbi coctionem, tñ, uel plus efficiunt uiribus: cibi uero quantum egroti robur adaugent, tantum coctiones impediunt. Quare inedia quidem, ubi ualētiores fuerint vires, et morbus cōcoctu difficilis fuerit, utendū. largiori uero cibo, ubi vires sint imbecilliores, neq3 morbus concuctu cōtumax. Potus sit decoctus cinamomi, aut hordei, in quod (ut dictū est) aliquid hyssopi aut origani iniectū sit. Quies etiam conducit. Quod ad curandi rationez attinet, si sanguinē mittere opus est, neq3 hoc omittendum, sed ab initio statim adhibita etatis, temporis, regionis, habitus corporis, et similitum distinctione: tantumq; sanguinis detrahendum, quantum præsens exigit status. Clysteres quoq3 non admodum molles iuuant, qualis est qui &. Maluē, mercurialis, foliorum uiolarum, origani, hyssopi añ. M. i. cartami p. ii. coquantur singula in aqua iustę quātitatis. colaturæ adiciantur benedictę laxatiuę uocatę, hierę picrę añ. 3. iii. mellis rosacei. 3. vi. oleorum uiolacei, chamæmelini añ. 3. i. s. salis communis. 3. ii. fiat clyster. Ceterum danda etiam decocta, quibus ea insunt quę citra plurimam calefactionem et exiccationem incidere et urinam ciere possunt. cuiusmodi est id, quod &. Radicum apii, fœniculi, cichorii añ. 3. i. intybi domestici utriusq3, origani, hyssopi añ. M. i. lactucę. M. i. s. seminum quatuor frigidorum communium añ. 3. i. seminū fœniculi, apii añ. 3. i. s. Decoquantur in aque lib. ii. donec tertia pars absumpta fuerit. Colatus humor dulcescat saccharo sufficienti, et oui albuminibus purificetur, ac subinde adiciatur sirupi acetosi simplicis, mellis rosacei colati oxy melitis simplicis añ. 3. i. s. et fiat potio. Posthęc ea quę uentre3 placide subducunt sunt exhibenda, ut dilu-

tuna

tam rhabarbari, ecligma de psilio, indi appellatur: & alia eiusmodi, quæ bilez cum pituita educere possunt, qualia multa in superioribus libris sunt annotata. Post septimū diem iugiter decoctū comæ absynthii dandum est. Multos quoq; iuuat oxymeli se solo potum. Vomitus autē à cibo adeo iis quibus hæc feb. p. durauerit utilis est: ut multi, Galeno lib. i. Metho- di medendi ad Glauco. teste, hoc uno presidio statim fuerint curati. Hypochondria quoq; calidis fouenda sunt medicamentis, ut scz flatus, qui ea distendunt, discutiantur. Conuenit uero hoc potissimū fomen- tum, quod R. Florū chamemeli, meliloti, anethi. M. i. absynthii. M. s. rosarum rub. p. i. seminum fœnigræci, lini añ. 3. iii. Buliant singula in aqua sufficienti, donec tertia pars cōsumatur. Dein spōgia in hac ma- defacta, hypochondria foueantur. Poterit etiā uen- triculus hoc aut simili unguento inungi, quod R. Olei mastichini, rosacei, chamemelini añ. 3. iii. Pul- ueris charyophyllorum. 3. i. s. cerę quantum satis est, fiat unguentum. Ceterum in tertianis non exquisi- tis, neq; statim circa initia balneare expedit, s; quum primum notæ coctionis apparuerint.

Vomitus.

Fomentus

Vnguentum.

Bainum.

De quartana.

Cap. VIII.

Signa.

Causa.

Alterū genus febriū intermittētū est exquisita q̄r- tana, q̄ ex solo atre bilis hūore putrescēte gñat. Hęc qdē nō primo statiz die cū rigore inuadit uehe- menti, s; talis est qualis iis q̄ uehementi gelu frigescūt. Progrediente autem ipsa atque aucta, unam etiam rigor augetur, inualescitq; quotidie usque ad totius morbi incrementum, sensusq; eius non pungentis sti- mulantisuē cutem, sicut in tertiana, sed uehementem algorem inducentis, & tanquam ossa frangentis est. Pulsus in ea satis tardi sunt ac rari. Caloris motus, incrementum & uigor tertianis febribus contraria snt. In ea enim humor paulatim ueluti sapis aliquis

S ii aut

aut testa, aut os, aut tale aliquod huiusmodi corpus frigidum & siccum succenditur. Vbi uero aliqua ex eo flamma fuerit accensa, nihil fumidum, aut à se incombustum in accessione relinquit. Atque idcirco in hoc humore longiores sunt cessationes, quàm in pituita, atque intermissio exquisitè pura uidetur: quoniam hic quicquid atræ bilis fuerit accēsum, exhauritur, atque dispergitur. Bilis præterea flauæ uomitus quartanam non comitatur. Vring, tanquam per crassiorem materiam excolatæ, sunt tennes, albæ, & aquosæ. Adhuc in autumno potissimū incipit, erraticis superueniens febribus. Ceterum in spicienda & laborantis natura seu temperamentum, uictus ratio quæ antecessit, regio, ætas & alia eiusmodi. Si enim frigida & sicca fuerint, tunc certius quartanam futuram sperabimus, potissimum ubi eo tempore quartanæ febres populariter uagabuntur. Porro quod ad curandi rationem attinet, quartana laborantes initio moderatè & leniter tractandi sunt, neq; ullo fortè medicamento, aut euacuatione irritandi: nisi forte sanguis uehementer exuperare uideatur, tū enim sanguis auferendus. Et si uena incisa, defluens sanguis niger ac crassior fuerit, audacius mittendus est. Quod si uero flauus aut tenuis apparuerit, statim suprimendus. Venam uero secare oportet lienarem uocatam, aut quæ est in sinistro cubito, mediam. Vinctum instituere conuenit optimum, eum nimirum qui minime flatuosus sit. A suillis itaque carnibus arcendi sunt æ gri, atque ab omnibus eduliis quæ uiscida ac tenacia sunt, & tardum habent exitum, atque ab omnibus quæ refrigerant & exiccant corpus. Utendum uero est uolatilibus montanis, quæ boni succi sunt, & non in paludibus degunt. piscibus etiā qui molli carne tenacitate carente præditi sunt. Salsa etiam, & sinapi in cibo, ut incidantur & extenuentur humores, adhibenda sunt. Vino utendū est albo ac tenui

Curatio

Venæ sectio.

Vinctus ratio.

nui, & mediocriter calido. A frictionibus autem & de ambulationibus, & aliis hominum consuetis studiis, non sunt penitus prohibendi. A balneis tamē si pos sunt, omnino abstineant, frictionibus dūtaxat adhibitis. Et si brevis, nec admodum uiolenta quartanæ accessio fuerit, nihil nocebit si diebus inter accessio nem mediis ad consueta exercitia se transferant. Ceterū clysteribus quoq; utēdū, à principio quidē mol libus postmodū uero acrioribus. Molles ex precedē te Capite petes. paulo acrior hic est, q̄. Maluē. cha memeli, mercurialis, foliorū uiolarum añ. M. 3. i. fol liculorum senē, polypodii añ. 3. v. hæmionitidis M. i. s. Decoquantur in aqua iustę quantitatis. colati hu moris accipe lib. i. & adice casę fistularis. 3. i. ecligma tis diasenæ. 3. s. olei cōmunis. 3. iii. mellis rosacei. 3. s. salis gēme nominati. 3. i. fiat clyster. certis ēt diebus dandum medicamē quod diatrium pipereō uocatur. Imò recte fecerint egrotantes, si quotidie piper cum aqua biberint, Galeno lib. i. ad Glauconem autore. Hęc quidē in principio & augmēto potissimū sunt fa ciēda. si uero in uigore morbi egrotus esse uideatur, tūc tenuiorē uictus rationē adhibere cōuenit, quā ante uel postea. statim uero præcipiendū, ut in longū tēpus quiescat, ac uisceribus prouidendū unguendo, illinendoq; his quę mollire ac laxare possunt, qua lia sunt quę ex farina hordeacea, semine apii, iride, cu mino, ruta, & iis similibus cōponuntur. Inter cetera uero hypochondriū sinistrū hoc unguento erit un gendū, quod ʒ. olei de capparibus. 3. iii. oleorū irini amygdalarū dulcium añ. 3. ii. Seminis apii, cumini, ra dicis iridis añ. 3. i. cerę quod satis est, fiat unguētum. Post hęc utendū medicamētis quę ciendi urinā uim obtinent. In quę sanē usum mulla propināda, in qua anethū, aut ruta, aut apiū decoctū sit. Mox si coctio nis notę apparuerint, purgandū medicamentis, quę atrā bilem euacuāt, idq; nō semel tātum, sed sepius, si S iiii fuerit

Clyste
res.

Unguen
um.

Urinam
cientia

Vomitus.

Theriaca.

fuert necessariū. Qualibus aut medicamentis purgantibus utendū sit, libro primo in Cap. de Melancholia expositū est. Laudat tñ præter alia Aëtius, uinū dulce infusū in colocynthidis cavitatē, sic tñ ut illi admisceatur quidpiam apii, aut dauci, iucunditatis gratia. Utendū quoq; uomitu à cibo. Et si nihil prohibuerit, elleborus albus est exhibendus, primū quidē permixtus raphanis: ut in superioribus ostensum est libris. quod si nihil fecerit, elleborus ipse. Quod si qf piā ab elleboro abhorruerit, hoc aut simili uti poterit, quod ℞. succi raphani. ℥. iiii. oxymelitis simplicis ℥. ii. misce, ac tepidū bibendū exhibe. Qui uero nequeunt euomere, hi p inferiora purgādi. A purgatione dādū medicamentū ē uiperis, qđ theriacā uocant: aut illi facultate simile. Quicūq; inter morbi initia, aut omnino ante uigorē, aliquod ex iis medicamē exhibent, qrtanā quē simplex erat, sæpius duplicē faciūt, aut oino maiorē difficiliorēq;. Ex duplici aut triplicē, uel prorsus ambas maiores difficilioresq; reddūt.

De quotidiana. Cap. IX.

Causa.

Signa.

Quotidiana febris intermittens ex pituitæ putredine, per sentientes corporis partes à natura detrusa, ortum habet. Dicitur Amphimerina Græcis, qđ amborū diei scilicet ⁊ noctis particeps sit. singulis. n. diebus accessiones facit, q̄ ad infebricitationē ac integritatē nō desinūt, occupantq; ferē de cē ⁊ octo horarū spaciū. His uero potissimā signis dignoscitur. Haudquaquā cū rigore primo statim die inuadit, sed progressu temporis refrigeratio potius quā rigor occupat. Pullius, quā primū accessio fit, ordinatus est, ⁊ inequalis, tardus, paruus ac debilis. Neq; uero in augmēto motus uelocitas, magnitudo, atq; uehementia quotidianis adsunt. Calor nō tā acris ac uehemēs, ut in tertiana: neq; n. adurit egros, neq; multū ⁊ crebro spirare cōpellit, ac ueluti flāmā ex ore

ex ore efflare, uel frigida expetere: sed humidus ac fu-
 mosus cum multo uapore comixtus. Aegre quoque ac-
 ceditur. ac longum consumit tempus, dum inualescendo perue-
 nit ad summum. Minime denique sic febricitat, sicut: quod
 non duntaxat lingua, imò totum corpus in hac febre hu-
 midissimum sit. Urinae in quotidianis uel albae, tenues
 et aquosae: uel crassae, aut turbulente. Nullus omnino
 sudor in primis diebus erumpit, neque unquam exacta
 febriendi quies attingitur. Vomitus etiam pituitosi iis
 accidunt et quae per aluum excernuntur, frigidiora et
 humidiora, crudiora, aquosiora, et pituitosiora sunt.
 Uniuersum quoque corpus in hisce febribus plenum
 crudis humoribus inuenitur. Ceterum quotidiana fe-
 bris humidas pituitosas uel naturas maxime infestat.
 Hyemis quoque tempore, humida et frigida constitutio,
 senili, aetate, et puerili, his denique qui ocio plurimo
 dediti sunt, crapulis, ebrietatibus, balneis, assiduus,
 post cibum praesertim utuntur, quotidiana febris facile
 accidit. Quae singula indicia Galenus fusiùs lib. 1. ad
 Glauconem Cap. 7. et lib. 2. de Diff. feb. cap. 4. atque li.
 2. de Crisibus ca. 5. prosequitur. Victus ratio in hac *Victus ra-*
 febre in uniuersum sit incisoria, ideoque ad ea Capita *tio.*
 recurrendum erit, in quibus qualis sit ista victus species,
 a nobis in superioribus libris saepe traditum est. Primis
 quidem diebus aluus clysteribus, mollientibus eluenda
 est. Dein oxymelite utendum, et aliis quae urinam elicere
 possunt. Conuenient igitur decocta ex radice apii, oreo
 selini, iridis, faeniculi, et similibus antea saepissime com-
 memoratis, cum syrupis acido composito, melle rosa-
 ceo, de duabus radicibus, et aliis quibus incidendi et
 extenuandi facultas inest. Circa statum uero de uentri-
 culo est habenda sollicitudo, praesertim de eius ore.
 Quare ante cibum hoc utendum unguento, quod igitur. Oleo
 rum mastichini, absinthini, nardini an. 3. ii. s. mastiches, *Unguentum,*
 garyophyllorum, ligni aloes an. 3. s. cinamomi. 3. i. cum *tum.*
 cera quod satis est: fiat unguentum, quo uenter inungatur.

S iiii Dein

Vomitus.

Deinceps iubendum est, ut egri à raphano ⁊ cibis asumptis uomant. His et utendū medicamentis, quæ puitā subducūt: qualia multa in præcedētibus libris cōmemorauimus. Hęc pro curatione febris quotidianę, quę raro admodū accidit: sufficiant. Nam quę hic desiderātur, in præcedētibus abunde docuimus.

De hectica febre. Cap. X.

Hectica

quid.

Hectica

cur dicta.

Hectica

cor ports.

Causa.

μαλακός

μὲν

HECTICA febris appellatur, qñ calor præter naturā non solū in spiritibus, ⁊ humoribus, sed iam in partibus etiā solidis consistit. Hectica uero dicitur, uel quod firma ac fixa sit, ac difficulter soluatur, quemadmodū habitus: uel quoniam habitum corporis comprehendat. Sic enim uocare cōsueuerunt, solidas partes humidis distinguētes. Hecticę aut febres duplici modo generātur. primum magna quidem ex parte, ex ardentibus febribus, quę tm protrahuntur, ut lōgitudine temporis humorem in corpore cordis contentum absument: uel fieri potest, ut eius adhuc magna portio reseruetur. Ille uero non tm hecticę sunt, sed etiā μαλακός, hoc est, tabidę. Quę aut manente adhuc humanitate generantur, ubi corpus cordis occupauerint, hinc maxime accēduntur, haud secus quā lucernę flāma ex ellychnio. Atq; hęc una quidem febrium hecticarū generatio. reliqua est quā statim inuaserint, similem primum sui ortum diariis facientes, aut ex morore, aut ira, aut lassitudine nimia, unā cum solis feruore natę. Hasce igitur febres non est admodū difficile curare. Atq; ex ipsis in tabem marcorē, qui Gręcis dicitur μαλακός, ex inscitia medicorum peruenerunt, ubi iam exquisitē consistunt, ⁊ non adhuc incipiunt, has non modò curare difficile, imò etiam impossibile. Earum enim naturā calida ⁊ sicca est, ut tale aliquid patiatur cor quale lucernę funiculus, quū plurimū perustus fuerit. Nam qui ita torrefactus est, frāgitur ⁊ dissoluitur, atq; ex ari-

ariditate continentatem amittit adeò ut etià si copio-
sum oleū superinfundas, flamma abundantior non
possit accendi. Semper enim parua & imbecilla in ip-
sa palpitat, ac continue fit minor, donec ex toto ex-
tinguatur. Talis quidē est febris quæ omnino ^{αφαισ}
^{μειν} hoc est tabida existit. Hæctica uero quæ in ma-
rasmū icidit, cognitu pròptissima atq; facillima exi-
stit. Nā priusquā pulsū atq; calorē tactu perpēdas, ui-
debis oculos immodice cōcauos: ueluti quibusdam
q̄si scrobibus recōditos, exhausta iā uniuersa in ipsis
humida substātia, ita ut ossium quibus palpebrę co-
herent eminentię cōspiciantur. Sordes quidē in ipsis
aride apparent, & quidā squalidus affectus, qualis ma-
xime inest his qui toto die sub solis ardore iter lōgū
per puluere fecerunt. Flos etiam ille uitalis periit, cu-
tisq; in fronte arida distensaq; est. Palpebrę frequen-
ter ueluti somnolentę conuiuent. Verū passio eorū
somnia nō est, sed potius uigilandi impotentia. Con-
tabuere quoq; carnes quę in temporibus sunt, ut col-
lapsa uideantur, & concaua loca. Quid enim aliud p̄-
ter ossa & cutem solam habent? nam si denudatum
uentrem inspexeris, neq; intestinum, neq; uiscus ul-
lum superesset tibi uidebitur. Hypochondria sursum
ad thoracē cōuelluntur. Quod si eos tangere libeat,
cutis quidē apprimē arida est: quam si digitis apprehē-
dens extenderis, instar corii cuiusdā cōstitit. Pulsus
tenuis, durus, debilis, & frequens. Caliditas quum pri-
mum manus admouetur debilis est, paulo pōst acris
& rodens erumpit: & magis, quum amplius tangendo
immoraberis. Maxima quoq; erit hæc & minime an-
ceps nota: adhibito cibo calor incēditur, pulsusq; ma-
gnitudine ac uelocitate intenditur. Tandiu autē hæ-
ctica febris dicetur, quandiu natiua humiditas reser-
uatur. Vbi uero ambi gitor, ne nihil amplius humo-
ris susperfit, absoluta iam tabes est. Hæcticas uero fe-
bres priusquā ad tabem deueniant, omni conatu re-

signa.

Caract.

frige.

frigeramus. Sūma itaq; curationis in refrigerādo ac
 humectādo collocatur, tā his quę extrā admouētur,
 quā iis q̄ intra sumūt. Aēr igitur inspiratus fri-
 gidus sit ⁊ humidus. Et si natura talis nō sit, arte pa-
 retur, ut dictū est suprā Ca. 6. de Curatione tertianę.
 Cibis utendū iisdē uiribus p̄ditis: ptisanæ nimirū
 cremore, pane modico in aqua frigida macerato: car-
 nibus hodi, phasianorū. uolucrū montanarū, testi-
 culis gallorū, carnibus caponū ouis sorbilibus, ca-
 seo recēti salis experte. piscibus petrosi, lactuca, inty-
 bis, cucurbita, spanachia, malua, ⁊ similibus. Cerasis,
 prunis, malis, punicis melonibus, ficubus, ⁊ eiusmodi.
 lac ē mirifice iis p̄dest, mō alia febris ab humorū pu-
 tredine orta nō cōplicetur. Quę uero ad huius exqui-
 sitā exhibitiōē sunt necessaria, ut alia multa huic in-
 stituto cōueniētia, tradit Galenus lib. 7. Ther. meth.
 Potus sit aq̄ frigida moderate sumpta, aut decoctum
 cinamomī, aut uinū aquosū, tenue. Cōuenit deniq;
 hec̄ticis sēpius die cibū accipere, ut nimirū hac ratio-
 ne caueāt, ne una uice magnā ciborū copiā ingerāt.
 Motū immodicū, ⁊ quicquid uires resolvere potest,
 deuitent. Cēterū medicamēta purgātia illis qui he-
 ctica febre laborāt non sunt propināda. Sed si alius
 plus ē quo adstricta fuerit, leuib. ac alterantib. clyste-
 ribus, adiecta casia fistulari, hanc abluere oportet. In-
 tra corpus exhibēda medicamēta refrigerātia ac hu-
 mectātia: qualia inter cōposita hodie usitata sunt,
 syrupi uiolaceus, de nympha, de intybo domestico,
 acetosus, ⁊ similes. Itē cōfectiones diarhodō abbatis,
 diatragacathę frigide, diapapaueris, similesq;. Ex sim-
 plicibus succi lactucę, portulacę, intybi, ⁊ papaueris.
 Inter ea uero q̄ extrinsecus admouētur, balnea huic
 morbo obnoxiiis quouis tēpore idonea sunt. balnea
 quidē aquarū dulciū: ad quę sanē egrotus in lectu-
 lo, aut findone deportetur. Aquā uero tēperatissimā
 esse oportet: in qua etiā moderate cōmorādū, ne scilicet

Balnea.

licet quippiā è propria humiditate hauriatur. tantū
 abest ut in ea sudare debeat. Sūt quin in aqua deco-
 quēdas herbas aliquot esse putēt: uiolas nempe, mal-
 uas, lactucas, flores nymphę, & iis similes. Nonnulli
 itē pedes uitulinos, & capita agnina, quoad ossa car-
 nibus separentur. Cauendū etiā, ne perfundatur ca-
 put. Vbi itaq; satis iam in balneo cōmoratus fuerit,
 mox hinc eductus, in frigidam semel totus tingatur,
 ne nel breuissimo quidem spacio illic moratus. He-
 rtica siquidem febricitantes, qui ad balneum acce-
 dunt, Galeno lib. 10. Ther. meth. teste, nisi in frigi-
 dam sint dimissi, nihil iuuantur. Protinus autē ubi
 extractus fuerit, alter paratam habens sindonem ip-
 si insiciat, ac deinde aliam. tum in lectulo colloca-
 tus, primum spongiis derergeatur, deinde mollibus
 linteis. nec committent qui eum detergebunt, ut uio-
 lentius eum contrectent, sed quoad fieri potest blan-
 dissimē. Quid multa? eam sanē curam, si fieri potest,
 omnino in balnei usu adhibeant, quam Galen. lo-
 co iam citato requirit. Post hęc quidem oleis frigi-
 dis, & aliis humectandi facultate pręditis inungen-
 dus erit. Inter cętera uero hoc conuenit, quod R. *Linimentum*
 Oleorum uiolacei. ʒ. s. de cucurbita. ʒ. iii. butyri re-
 centis salis experti, pinguedinis porcine. ʒ. i. s. misce,
 fiat linimentum, ut uocant. Vel adiciantur musco-
 sitatis tragacanthę. ʒ. ii. medullę cruris uitulini. ʒ.
 iii. cere quod satis est, & fiat unguentum. Valet etiā
 oleum nymphę, de papauere, & rosaceum, quod Ga-
 leno lib. 3. de Simpl. med. facul. Cap. 16. arentia cor-
 pora mirificē humectare potest. Vbi unctus fuerit,
 tum uestibus amictus rursus super lectulo, aut sindo-
 ne in locum ubi cibatur reducent & nutrient. Prode-
 rit etiam cor atq; iecur epithematis refrigerare & hu-
 mectare: qualia sunt hęc, quę R. Aquę stillaticię uio-
 larum, nymphę, lactucę añ. ʒ. iii. aceti optimi. ʒ. s. ro-
 sarum rub. iantalorum omnium añ. ʒ. i. specierum
 diamar. *Epithema.*

Pollio Ro
mulus.

diamargariton. 3. s. caphurę gr. iiii. croci. 3. s. misce, fiat epithema, quod cordi adhibeatur frigidū. Aliud quod ꝑ. Aquę stillaticę, intybi domestici, rosarum an. 3. iiii. lactuce. 3. ii. acetii. 3. i. specierum diarhodon abbatis. 3. i. s. ralurę eboris. 3. s. caphurę. 3. s. misce, fiat epithema, quod iecori admoueat. Conferunt hec eticis etiam medicamenta quę odore suo refrigerāt et humectant, ut sunt flores nympheę, caphura, uiolę, rosę, et similia. Plura etiam ad institutum facientia reperiet studiosus in Cap. de Phthisi seu tabe. Et certe in hec tics curatiōe unice studendū, ut corpus nō solum per ea quę intra corpus sumuntur refrigeremus et humectemus; uerum etiam per ea quę extrinsecus admouentur, olei potissimum inunctionem. Quantum enim hoc ipsum foris adhibitum ad corporis ac uirium conseruationem conducat, celebri Pollionis Romuli exemplo docemur. Hunc enim ceterum iam annum excedentem. Plinio lib. 22. Cap. 24. teste, quum Diuus Augustus hospes interrogaret, qua nam ratione maximē uigorem illum animi corporisq; custodisset, ille respondit: Intus mulso, foris oleo. Hęc quidem ad recte curandas febres sufficiunt. præclare enim officio nostro defunctos nos esse putamus, quod methodum quam breuissimē potuimus indicauerimus. Remedia autē parcissimē attigimus, quod ea nullo labore medicinæ non prorsus rudes, ex superioribus libris tribus, si plura desiderant, petere possint.

LIBRI QVARTI ET
VLTIMI FINIS.

HIPPOCRATIS COI DE ME-
DICAMENTIS PURGATORIIS

libellus, nunquam prius in
lucem editus.

IVNIO PAVLO CRASSO
INTERPRETE.

Cur medicamenta purgantia non temere exhibenda. Cap. I.



Medicamentorum Purgantiū opera non ōlia censentur existūt. ab eodē enīz medicamēto aliq modo purgātur, mō nō purgantur. interdum ⁊ alia: q̄s quæ p̄sueuerit: educit. inter dū imodicē purgat, nōnūq̄s ⁊ q̄ op̄s p̄stat. Quare nō p̄t q̄spīā hīsce fret⁹ medica. ea temere p̄pinare: siqdē ⁊ cibi nos alētes, medicamēta existimādi sunt: minus tñ q̄s antedicta. hoīes nāq̄s hīsce rectē uescētes, scōa ualetudine fruūtur: minus rectē, laborāt: int̄panter, ceu sinceris à medica. euacuantur. Igitur iā p̄s, ⁊ cibos ipsos eē purgātia medica. minus tñ, signiusq̄s, q̄s syncera medic. cæterū his signiores, nobisq̄s familiares, ⁊ quotidie in corpus intrātes, temere ac negligēter exhibiti, hoīes p̄turbant, in morbosq̄s p̄cipitāt: atq̄, ut semel dicā, q̄ inconsiderate cibos dederit, nihil commodi, nihil opis est allaturus.

Quæ quibus medicamenta danda. Cap. II.

Igitur ab initio biliosis, medicamētū bilis purgatoriū est p̄pinandū. pituitosis qđ pituitā: hydropīcis, qđ aquā: melancholicis, qđ atrā bilē educat. at si alia ab iis purgas q̄ purgare cōuenit, nō purgas: q̄ at non cōuenit, euacuabis. quare utrunq̄s peccaueris.

Quæ præmittendæ interrogationes. Cap. III.

Itaq̄s aliquē aut sup̄rā, aut infrā purgaturus, eum prius interrogato, nū aliās medi. purgatoriū accēperit?

perit? nū alius subducentibus medic. facile soluatut
 uelociterq; obediat: aut ptra, adstricta sit, egreq; sol
 uatur? Qd si facile esse aluū, subricamq; rñderit, mol
 lioribus minoribusq; medic. indigebit: sin alius sic
 ca pclusaq; sit, ualētiora medic. postulat. Idē pceptuz
 ⁊ in uomitoriis medic. obseruandū est. uerū si neuti
 quā uomitoria subducentiaue medicamēta sumpsis
 se se affirmauerit, tū demū scire opz, quō sanitatis tpe
 se habuerit: nūq; subducentibus facilis alius patue
 rit, nūq; uomitoriis stomachus libenter morē gesserit
 num a crapula quapiāz in alui pfluuiū inciderit. oīa
 hęc sciscitari debes, ut recte ipsi possis p̄sulere. Fōda
 est enim calamitas, eū cui purgatoriam medicinam
 dederis, interficere.

*Quibus morbis, quoue tempore exhibendā medi
 cine purgatoria. Cap. III.*

Q Vicunq; sane ualidis febribus corripiuntur,
 his usq; ad febris remissionē purgatoria medi
 ne dato. sin id nolis, saltē ne citra quartū deci
 mū diē: calidæ enim carnes ipsorū, ⁊ uentres, medic.
 retrahūt, nihilq; purgatur. Tunc plane febris magis
 exardet, color pmutatur auriginosi q; fiunt. agitata
 nanq; bile, ⁊ nō detracta, neq; sorbere p̄t, neq; bibē:
 sz anersatur oīa, ⁊ plerunq; moritur. Ceterū si med.
 uincit, ante meridiē nulla fit purgatio, a meridie fit
 immoderata deiectio atq; cōmoritur. qd si diez hūc
 superstes sit, simulq; cū purgatione febris tollatur,
 p̄ualescit. Quāobré purgatoria medi. in magnis feb.
 ne ore sumantur, præcipimus. at si ipsis opus fuerit,
 p clysteria iniicere, quoties uolueris, expediet: id enī
 tutius erit. Hac itidē rōne, estiuo tpe post canis ortū
 quinḡginta dierū spacio medicinā purgantē ne p̄pi
 nato, sed clysteriis utitor. idem nanq; discriminē est.

Defensio medicine contra calumniatores. Cap. V.

Dicent aut aliqui, qui medicinā calumniantes ar
 tem esse negāt, pridē multos nō iplo rata medici
 ope

Clysteres

ope ex morbis euasisse. Atq; ego istorū orationi fides habeo. simul tñ fieri posse arbitror, ut q̄spia nō utens medico, ex medicā fructū pcipiat: haud ita tñ, ut qd in ipsa rectū, qd nō rectū sit, agnoscat. nā forte q̄das i ta seipsos curare pnt, ac si accitis medicis curati essent. Id uero pclarū indicium est, medicinā nō solū artez, uerumet̄ eximiam esse artē: qñquidē ⁊ ipsaz funditus tollentes, p ipsaz illā seruari uideantur. Illud. n. nouisse summa est necessitas, eos qui ex languoribus ad sanitatē restituti sunt, aliqd facientes aut nō faciētes pualuisse. aut eniz ieiunio, aut ciborū copia, aut largiore potu, aut siti, aut balneis, aut ab eis abstīnētia, aut exercitationib⁹, aut ocio, aut sōno, aut uigilia, aut oībus his p̄fute utētes, incolumes euasere. At qui ⁊ ex auxilii p̄ceptione infuisse auxiliās, eos cognoscere necesse est: p̄ ex noxa accepta, rē nocentem affuisse. nā q̄ iuuādi, q̄ ledēdi ingenio p̄dita sint, nō cuiusq; est dinoscere. Itaq; si qd in rōne uictus, p q̄ sanatus fuerit eger, laudare aut uitio dare cognouerit, oīa hęc medicīne esse cōperiet. Et mehercule offēfiones nō deterius, q̄ adiuuenta, artē hāc esse testantur. iuuantia siquidē, recte administrata iuuerunt: nocentia ip̄erite adhibita nocuerūt. at ubi rectū, nō rectumq; utrunq; modū hñt qūo id ars esse negādū est: Illud nāq; ego arte carere existimo, in quo nihil rectū est, neq; nō rectū: ubi aut utrunq; inest, qūo id nō artis opus, s; artis imperitię putandū est?

Medicm
eximiam

Hippocratis de Medicamentis Purgatoriis.


F I N I S.


R E G I S T R V M


✱ A B C D E F G H I K L M N O P Q R S

Omnes sunt quaterni.

Venetiis per Bernardinū de Bindonis. M. D. XLI.







mi. M. H. T. ...
Lino

~~A. m. ...~~

~~A. ...~~

A. m. ...

... G. M. f.

... bucrone

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...